

Fiyat ve Detaylar: <https://www.ilacprospektusu.com/ilac/30/virupos-4-5-gr-goz-merhemi>

ATC Kodu: <https://www.ilacprospektusu.com/ara/ilac/atc/S01AD03>

KULLANMA TALİMATI

VIRUPOS 30 mg/g göz merhemi

Yalnızca göze uygulanır.

Etkin madde: 1 g merhem içeriğinde 30 mg asiklovir

Yardımcı Maddeler: Beyaz vazelin

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

- 1. VİRUPOS nedir ve ne için kullanılır?***
- 2. VİRUPOS'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler***
- 3. VİRUPOS nasıl kullanılır?***
- 4. Olası yan etkiler nelerdir?***
- 5. VİRUPOS'un saklanması***

Başlıkları yer almaktadır.

1. VİRUPOS nedir ve ne için kullanılır?

VİRUPOS belli virüs türlerinin çoğalmasını önlemektedir.

VİRUPOS, herpes simpleks virüsü tarafından meydana getirilen göz korneası iltihaplanmasının lokal tedavisinde kullanılır.

2. VİRUPOS'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

VİRUPOS'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Asiklovir, valasiklovir veya VİRUPOS'un bileşenlerinden birisine karşı aşırı hassasiyet (alerji) göstermeniz durumunda ilaç kullanılmamalıdır.

VİRUPOS'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Kontakt lens kullanıyorsanız, herpes hastalığında doktorunuza bilgi veriniz. Korneada meydana gelen herpes hastalığının VİRUPOS ile tedavisi esnasında lens takılmamalıdır.

Enfeksiyon sürecine karşı yüksek etki sağlamak maksadıyla gözde meydana gelen herpes hastalıklarında tedaviye mümkün olduğu kadar erken başlanmalıdır. VİRUPOS ile tedavi esnasında haftada 2 - 3 defa doktorunuza görünmelisiniz. Eğer başka göz damlası veya göz merhemi kullanıyorsanız, ilaçların uygulanmaları 15 dakika arayla gerçekleştirilmelidir.

“Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.”

VİRUPOS'un yiyecek ve içecek ile kullanılması
Herhangi bir bilgi mevcut değildir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Gözüne günde birkaç defa asiklovir verilen hastaların kanında asiklovir mevcudiyeti kanıtlanamamıştır.
Hamilelik döneminde VİRUPOS doktor talimatı doğrultusunda kullanılabilir.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme döneminde VİRUPOS doktor talimatı doğrultusunda kullanılabilir.

Araç ve makine kullanımı

Bu ilaç uygulandıktan sonra birkaç dakika için görme yeteneğini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle trafiğe çıkmadan veya güvenliği alınmamış ortamlarda çalışmadan veya makine kullanmadan önce bulanıklığın geçmesini bekleyiniz.

VİRUPOS' un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bulunmamaktadır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Etkileşim bilinmemektedir. Ancak başka göz damlası veya göz merhemi kullanıyorsanız, ilaçların uygulanmaları 15 dakika arayla gerçekleştirilmelidir. Göz merhemleri daima en son olarak uygulanmalıdır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. VİRUPOS nasıl kullanılır?

- **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:**

VİRUPOS daima doktorun önerdiği biçimde kullanılmalıdır. Kullanım hususunda emin olmadığınız durumlarda doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doktor tarafından farklı bir biçimde önerilmedikçe:

Günde 5 defa yaklaşık 1 cm uzunluğundaki merhem şeridi alt göz kapağının içine uygulanır.

VİRUPOS gündüzleri her 4 saatte bir uygulanmalıdır.

Tedavi süresi doktor tarafından belirlenir. Kornea iltihaplanmasının iyileşmesi sonrası tedavi en az 3 gün daha devam ettirilmelidir. Lütfen bu süreye kendinizi daha iyi hissetmeniz durumunda dahi uyunuz.

- **Uygulama yolu ve metodu:**

Göz merhemleri genel olarak tüp ucuyla göz veya cilde temas etmeyecek biçimde kullanılmalıdır. Koruyucu başlığı çıkarınız, başınızı hafifçe arkaya atınız, alt göz kapağını gözün üzerinden biraz kaldırınız ve tüpe hafif bir basınç uygulayarak konjunktiva kesesine şeridi uygulayınız. Sonra göz kapaklarınızı yavaşça kapatınız. Kullandıktan sonra tüpü sıkı bir biçimde kapatınız.

- **Değişik yaş grupları:**

Çocuklarda kullanım: Çocuklarda ve yetişkin hastalar arasında ayrıntılı bir güvenilirlik ve etkililik farkı saptanmamıştır.

Yaşlılarda kullanım: Yaşlılarda ve yetişkin hastalar arasında ayrıntılı bir güvenilirlik ve etkililik farkı saptanmamıştır.

- **Özel kullanım durumları:**

Özel kullanımı yoktur.

Eğer VİRUPOS'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuza veya eczacınıza ile konuşun.

Kullanmanız gerekenden daha fazla VİRUPOS kullandıysanız:

Özel önlemlere gerek yoktur. Gözde yüksek doz uygulanması sonrası bilinen yan etkisi bulunmamaktadır.

VİRUPOS'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

VİRUPOS'u kullanmayı unutursanız

Tatbik edilmesi gereken dozun iki katını uygulamayınız ve olağan biçimde uygulamayı en kısa sürede gerçekleştiriniz. Daha sonra da yukarıda belirtilen veya doktorunuzun belirttiği döngüde/zaman aralığında uygulamaya devam ediniz. Çok sayıda uygulamayı unutmanız durumunda gerektiğinde ilave önlemler alabilmesi için doktorunuzu bilgilendiriniz.

İlacın kullanımına ilişkin başka sorularınız olması durumunda doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

VİRUPOS'la tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Herhangi bir bilgi mevcut değildir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi 'VİRUPOS'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

'VİRUPOS'un uygulanması sonrası hemen kaybolan hafif bir yanma meydana gelebilir. Uzun süreli kullanımlarda (14 günden fazla) nadiren alt kornea kenarının yüzeyinde ve korneada iltihabi reaksiyon ve kısmi kornea sorunları meydana gelebilir. Bu bulgular genelde tedavinin erkenden bırakılmasını gerektirmez ve iyileşir. Çok nadir durumlarda asiklovir uygulamasında anjiyoödem (alerji sonucu yüz ve boğazda şişme) olmak üzere aniden ortaya çıkan aşırı hassasiyet tepkimeleri meydana gelebilir.

Meydana gelen yan etkiler sebebiyle tedaviyi yarıda kesmek istediğinizde lütfen başka bir ilaç vermesi için doktorunuza bilgi veriniz.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. VİRUPOS'un Saklanması

VİRUPOS'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 °C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambajındaki/kartondaki/şişedeki son kullanma tarihinden sonra VİRUPOS'u kullanmayınız/son kullanma tarihinden önce kullanınız.

Açıldıktan sonra kullanım süresi

VİRUPOS açıldıktan sonra sadece 4 hafta kullanılabilir.

Ruhsat sahibi: BİEM Tıbbi Cihaz ve İlaç San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Turgut Reis Cad. No:21 06570 Tandoğan- ANKARA

Üretici: URSAPHARM, Industriestr., D-66129 Saarbrücken, Tel.: 06805/92 92-0,

Faks: 06805/92 92-88, Email: info@ursapharm.de

Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.