

KULLANMA TALİMATI

SİCCAPOS 2,0 mg/g göz jeli **Göze uygulanır.**

- **Etkin maddeler:** 1 ml jel içeriği 2 mg Poliakril asit (Carbomer 980) içerir.
- **Yardımcı madde(ler):** Sorbitol, setrimid, sodyum hidroksit, sodyum edetat, enjeksiyonluk su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

1. ***SİCCAPOS nedir ve ne için kullanılır?***
2. ***SİCCAPOS'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler***
3. ***SİCCAPOS nasıl kullanılır?***
4. ***Olası yan etkiler nelerdir?***
5. ***SİCCAPOS'un saklanması***

Başlıkları yer almaktadır.

1. SİCCAPOS nedir ve ne için kullanılır?

SİCCAPOS suni gözyaşıdır ve gözyaşı eksikliği ve göz kuruluğunda kullanılır.

2. SİCCAPOS'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

SİCCAPOS'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

- Eğer etkin madde veya SİCCAPOS formülünde bulunan diğer bileşenlerden herhangi birisine karşı aşırı hassasiyetiniz (alerji) varsa,

Aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

- Kontakt lens takarken kullanmayınız.
- Aynı zamanda başka bir göz damlası/merhemi kullanıyorsanız, uygulamalar arasında en az 15 dakikalık bir süre olmalıdır.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

SİCCAPOS'un yiyecek ve iecek ile kullanılması
SİCCAPOS yemeklerle birlikte veya a karna alınabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduėunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Ara ve makine kullanımı

SİCCAPOS kullandıktan hemen sonra ara veya makine kullanmayın. Bu ila, ara ve makine kullanırken grme yeteneėini dolayısıyla da tepki kabiliyetini geici olarak etkiler.

SİCCAPOS'un ieriėinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında nemli bilgiler

İeriėinde sorbitol ve sodyum ierir. Ancak gerek kullanım yolu gerekse de miktarlarından dolayı zel bir nlem gerekmemektir.

Diėer ilalar ile birlikte kullanımı

Diėer ilalarla bilinen bir etkileřimi yoktur.

Not: Bařka gz damlaları veya gz merhemleri kullanıyorsanız, ilaların uygulanmalarını 15 dakika arayla gerekleřtirmelisiniz. Bazı durumlarda, SİCCAPOS en son olarak uygulanmalıdır.

Eėer reeteli ya da reetesiz herhangi bir ilacı řu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandımsa ltfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. SİCCAPOS nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklıėı iin talimatlar:

SİCCAPOS'u daima doktorunuzun size sylediėi řekilde kullanın. Eėer emin deėilseniz doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Gz kuruluėunun tedavisi kiřisel dozaj gerektirir. Semptomların yoėunluk ve řiddetine gre, gnde 3-5 kez ve uygulamaların bir tanesi uyumadan nce olmak kořuluyla, konjuktival kese iine uygulanır.

SİCCAPOS uygulaması gn ierisine eřit biimde yayılmalıdır.

Kesin tedavi sresi klinik tabloya baėlıdır ve doktor tarafından belirlenir. Genelde uzun vadeli tedavi gerektirmesinden dolayı kuru gz tedavisinde bir gz doktoruna danıřılmalıdır.

Uygulama yolu ve metodu:

Gz jellerini kullanırken daima, tp ucunun gze veya cilde temas etmesinden kaınılmalıdır. Koruyucu bařlıėı ıkarınız, bařınızı hafife arkaya atınız, alt gz kapaėını gzn zerinden biraz kaldırmınız ve tpe hafif bir basıncı uygulayarak konjunktiva kesesine jelin bir damlasını

uygulayınız. Sonra göz kapaklarınızı yavaşça kapatınız. Kullandıktan sonra tüpü dikkatlice kapatınız.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı: Veri yoktur.

Yaşlılarda kullanımı: Veri yoktur.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği: Veri yoktur.

Eğer SİCCAPOS'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla SİCCAPOS kullandıysanız:

Özel önlemlere gerek yoktur, olağan dozuyla uygulamaya devam ediniz.

SİCCAPOS'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

SİCCAPOS'u kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

SİCCAPOS ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Doktorunuzun size tavsiye ettiği süre zarfında kullanın.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi SİCCAPOS ' in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkilerin değerleri aşağıdaki detaylara dayanmaktadır.

Çok yaygın: 10 kişide 1'den fazla

Yaygın: 100 kişide 1'den fazla

Yaygın olmayan: 1000 kişide 1'den fazla

Seyrek: 10.000 kişide 1'den fazla

Çok seyrek: 10.000 kişide 1'den daha az veya bilinmiyor.

Çok seyrek olarak içeriğindeki maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık reaksiyonları bildirilmiştir.

SİCCAPOS sık ve uzun kullanımlarda gözde tahrişe (yanma, kızarma, yabancı madde hissi) yol açabilen ve kornea epiteline zarar verebilen bir koruyucu madde olan setrimid içerir. Bu sebeple kronik kuru göz tedavisinde koruyucu madde içermeyen ilaçlar tercih edilmelidir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuza veya eczacınıza bilgilendiriniz.

5. SİCCAPOS'un Saklanması

SİCCAPOS'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25 °C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra SİCCAPOS'u kullanmayınız.

Açıldıktan sonra kullanım süresi

SİCCAPOS açıldıktan sonra sadece 4 hafta kullanılabilir.

Ruhsat sahibi:

BİEM Tıbbi Cihaz ve İlaç San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Turgut Reis Caddesi No:21 06570 Tandoğan -ANKARA

Üretici:

URSAPHARM, Industriestr., D-66129 Saarbrücken, Tel.: 06805/92 92-0,
FAKS: 06805/92 92-88, EMAIL: info@ursapharm.de

Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.