

KULLANMA TALİMATI

CLINDOXYL® Jel Cilt üzerine uygulanır.

Etkin maddeler : Klindamisin fosfat olarak 10 mg/g klindamisin
Sulu formda benzoil peroksit olarak 50 mg/g susuz benzoil peroksit içerir.

Yardımcı maddeler: Karbomer, dimetikon, disodyum lauril sülfosükinat, disodyum EDTA, gliserol, koloidal sulu formda silika, poloksamer 182, sodyum hidroksit, saf su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

1. **CLINDOXYL® nedir ve ne için kullanılır?**
2. **CLINDOXYL®'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **CLINDOXYL® nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **CLINDOXYL®'in saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. CLINDOXYL® nedir ve ne için kullanılır?

CLINDOXYL®, anti-akne preparatları olarak isimlendirilen ilaç grubuna dahildir. Klindamisin, aknedeki bakterilere karşı etkinliği olan bir antibiyotiktir. Benzoil peroksit komedonların (siyah nokta ve beyaz nokta) azaltılmasında etkilidir. Aynı zamanda aknedeki bakterileri öldürücü etkiye de sahiptir ve cildi daha az yağlı yapar.

CLINDOXYL® akne tedavisinde kullanılıp, aşağıda belirtilen hususlarda yardımcı olur:

- Aknelere sebep olan bakterileri azaltır.
- Akne sayısını azaltır.
- Siyah nokta, beyaz nokta ve akneli bölgelerin oluşumunu durdurur.
- Cildi daha az yağlı yapar.

CLINDOXYL® , jel formunda olup, 25 ve 50 g'lık tüplerde bulunmaktadır.

2. CLINDOXYL®'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CLINDOXYL®'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

- İlacın formülasyonunda bulunan etkin, yardımcı maddelerden herhangi birine ve/veya linkomisin'e karşı alerjiniz var ise.
- Bölgesel enterit, ülseratif kolit veya bir antibiyotiğin neden olduğu kolit geçiriyorsanız veya geçmişte bunları geçirmiş iseniz, CLINDOXYL®'i kullanmadan önce doktorunuza danışmalısınız.

CLINDOXYL®'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

- CLINDOXYL®'i göz, dudak, ağız, diğer mukoz membranlara ve cildinizdeki kesik, yara, güneş yanığı ve ekzema gibi tahriş olmuş alanlara uygulamayınız.
- CLINDOXYL® kullanımı esnasında güneş ve yapay güneş ışınlarına (UV) maruz kalmayınız.
- Cildinizdeki hassas bölgelere çok fazla CLINDOXYL® uygulamayınız.
- Atopik hastalığı olan hasta iseniz, ciltte daha fazla kuruma görülebileceğinden, dikkatli kullanınız.
- Aşırı tahriş veya kuruluk gördüğünüz takdirde uygulama sıklığını doktor kontrolü altında azaltınız.
- Birlikte kullanıldığında, tahriş edici bir etki ortaya çıkabileceğinden, topikal antibiyotikler, tedavi edici veya "peeling" özellikli sabun ve temizleyiciler, güçlü kurutucu etkisi olan sabun ve kozmetikler, yüksek konsantrasyonda alkol ve/veya astrenjan (doku sıkıştırıcı ilaçlar) içeren ürünler ile dikkatli kullanınız.
- Kazara göz ile temas olursa, bol su ile yıkayınız.
- Belirtilen dozun üzerindeki dozlarda kullanmayınız.
- CLINDOXYL® renkli kumaştan yapılmış kıyafet, havlu ve yatak çarşaflarının rengini açabilir.
- CLINDOXYL® saçları beyazlatabilir.
- CLINDOXYL®'in tam etkisini görebilmeniz 4-6 hafta sürebilir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

CLINDOXYL®'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

CLINDOXYL®'in yiyecek ve içecekler ile bilinen bir etkileşimi yoktur.

Hamilelik

- *İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- Hamile olmanız durumunda CLINDOXYL®'i kullanıp kullanmayacağınıza ancak doktorunuz karar verebilir.
- *Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

Emzirme

- *İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- Emziren annelerde CLINDOXYL® kullanımı önerilmemektedir.

Araç ve makine kullanımı

CLINDOXYL®'in araç ve makine kullanımına etkisi yoktur.

CLINDOXYL®'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

CLINDOXYL® cilt üzerine uygulanan bir ilaç olduğundan, Disodyum Lauril Sülfosükinat, Disodyum EDTA, Gliserol ve Sodyum Hidroksit'e bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

CLINDOXYL®'i;

- A vitamini türevlerini içeren topikal akne ilaçları ile aynı anda kullanmayınız.
- Gentamisin ve eritromisin ile beraber alırken dikkatli olunmalıdır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. CLINDOXYL® nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz: günde bir kez akşamları cilt ılık su ile yıkanıp kurulandıktan sonra, akneli bölgelere yaygın olarak ince bir tabaka halinde uygulayınız. Jel'i uyguladıktan sonra ellerinizi yıkayınız. Eğer jel cildiniz tarafından emilmiyorsa çok fazla kullanıyorsa olabilirsiniz.

- CLINDOXYL® ile tedavinizin ne kadar süreceği konusunda doktorunuz size bilgi verecektir.
- Tedaviyi erken kesmeyiniz, çünkü bu durumda tam etkisini gösteremez.
- *Eğer CLINDOXYL®'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.*

Uygulama yolu ve metodu:

CLINDOXYL®'i parmak ucunuzla cilt üzerine uygulayınız.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanım: 12 yaşın altındaki çocuklarda etkinlik ve güvenilirliği incelenmemiştir.

Yaşlılarda kullanım: Yaşlılar için özel kullanım önerisi yoktur.

Özel kullanım durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği: Özel kullanımı yoktur.

Kullanmanız gerekenden daha fazla CLINDOXYL® kullandıysanız:

CLINDOXYL®'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

CLINDOXYL®'in aşırı kullanımı ile ilgili bilinen bir olay yoktur.

CLINDOXYL®'i kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için iki defa üst üste uygulamayınız. Bir sonraki uygulamayı normal zamanında yapınız.

CLINDOXYL® ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, CLINDOXYL®'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

CLINDOXYL®'in genel olarak vücut tarafından iyi kabul edildiği bildirilmiştir.

Aşağıdakilerden biri olursa, CLINDOXYL®'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Uzun süreli veya şiddetli ishal veya karın bölgesinde kramp.

Bu çok ciddi bir yan etkidir.

Eğer bu durum sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Ciltte uyuşma veya karıncalanma hissi (parestezi)

Bu ciddi bir yan etkidir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Uygulama yerinde meydana gelen

- Yanma
- Kızarıklık
- Kaşıntı
- Kuruluk
- Soyulma
- Pullanma

Bunlar CLINDOXYL®'in hafif yan etkileridir. Bu etkiler birkaç gün içerisinde geçmezse ve sizi belirgin bir şekilde rahatsız ederse, doktor kontrolü altında ürünü daha az sıklıkta uygulayın veya birkaç gün uygulamaya ara verip tekrar başlayın.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. CLINDOXYL®'in saklanması

CLINDOXYL®'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Eczanede: 2°C-8°C arasındaki sıcaklıklarda (buzdolabında) saklanmalıdır. Dondurmayınız.

Hasta ilacı satın aldıktan sonra: 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihi geçmemiş olsa dahi, ilacı satın aldıktan 2 ay sonra atınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CLINDOXYL®'i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz CLINDOXYL®'i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

Stiefel Laboratories (UK) Ltd.-İngiltere lisansı ile Embil İlaç Sanayii Ltd. Şti.
Bomonti Birahane Sok. No:40 Şişli-İstanbul

Üretici:

Stiefel Laboratories (Ireland) Ltd.
Finisklin Business Park, Sligo-İrlanda

Bu kullanma talimatı 25.09.2008 tarihinde onaylanmıştır.