

KULLANMA TALİMATI

SEREBİL FORT 80 mg Film Kaplı Tablet

Ağızdan alınır.

- **Etkin madde:** Her film tablette 19.2 mg Ginkgo glikozitleri içerecek şekilde standardize edilmiş 80 mg *Ginkgo biloba L.* yaprakları kuru ekstresi bulunur.
- **Yardımcı maddeler:** Mikrokristalin selüloz PH 101, laktoz, nişasta, koloidal silikon dioksit, magnezyum stearat, polietilen glikol 400, polietilen glikol 6000, talk, titanyum dioksit, sarı demiroksit, hidroksipropil metil selüloz, simetikon emülsiyon

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

1. **SEREBİL FORT nedir ve ne için kullanılır?**
2. **SEREBİL FORT' u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **SEREBİL FORT nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **SEREBİL FORT'un saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. SEREBİL FORT nedir ve ne için kullanılır?

- SEREBİL FORT, içeriğindeki *ginkgo biloba* yaprağı kuru ekstresinin gösterdiği birçok etkiye bağlı olarak (sinir dokusunu koruyucu, antioksidan, antitrombositer gibi) beyin damarları ve çevresel damarlar üzerinde etkili bir ilaçtır.
- SEREBİL FORT, kutuda, 30 film tabletlük blister ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır. Tabletler, sarı renkli, bikonveks, oval ve film kaplı tabletler şeklindedir.
- SEREBİL FORT, aşağıda belirtilen durumların tedavisinde kullanılır:

- Organik beyin sendromuna baęlı unutkanlık, dikkat ve konsantrasyon bozukluęu, ruhsal uyum bozuklukları, bař dnmesi, kulak ınlaması ve bař aęrısı gibi beyin iřlev bozukluklarında,
- Alzheimer tipi bunama, damarsal nedenli bunama ve karma formlardaki bunama sendromları,
- Bař dnmesi, denge bozuklukları ve kulak ınlaması,
- Bacak atardamarlarında tıkanma ile seyreden hastalıklarda aęrısız yrme mesafesinin iyileřtirilmesi.

2. SEREBİL FORT' u kullanmadan nce dikkat edilmesi gerekenler

SEREBİL FORT, 12 yařından byk hastalarda kullanılır. 12 yařın altında kullanılmamalıdır.

SEREBİL FORT'u ařaęıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eęer;

- *Ginkgo bilobaya* veya SEREBİL FORT'un ierisindeki herhangi bir maddeye karřı alerjiniz varsa (ařırı duyarlıysanız),
- Nbet hikayeniz varsa veya nbet eřięini dřrdę bilinen bir ila kullanıyorsanız,
- Doktorunuz tarafından sizde bir kan hastalıęı olduęu sylenmiřse,
- 2 hafta iinde sizin iin bir ameliyat planlanıyorsa ameliyat ncesinde ve sonrasında (SEREBİL FORT, kanama riskini arttırabilir),
- Hamile iseniz veya bebeęinizi emziriyorsanız.
- 12 yařın altındaysanız.

SEREBİL FORT'u ařaęıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

- Beyin ile ilgili kullanım alanlarında SEREBİL FORT ile tedaviye bařlamadan nce, hastalık belirtilerinin zgn bir tedavi gerektiren herhangi bir nedene baęlı olup olmadıęının doktorunuz tarafından belirlenmesi gerektięini dikkate alınız.

SEREBİL FORT'un yiyecek ve iecek ile kullanılması

SEREBİL FORT'u yemeklerden sonra kullanınız.

Hamilelik

- *İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*
- SEREBİL FORT hamilelerde kullanılmamalıdır.
- *Tedaviniz sırasında hamile olduęunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

Emzirme

- *İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*
- SEREBİL FORT, emzirme dneminde kullanılmamalıdır.

Araç ve makine kullanımı

SEREBİL FORT'un araç veya makine kullanma yeteneğiniz üzerine etkisi bilinmemektedir.

SEREBİL FORT'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

SEREBİL FORT, laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Aşağıdaki ilaçlar ile birlikte SEREBİL FORT'u kullanımından kaçınınız:

- Antikoagülan (kanın pıhtılaşmasını önleyen) ilaçlar,
- Antitrombosit ajanlar (kanda trombosit adı verilen hücrelerin kümeleşmesini etkileyen ilaçlar)
- Düşük molekül ağırlıklı heparinler (kanın pıhtılaşmasını önleyen bir ilaç grubu)
- Trombolitik ajanlar (kan pıhtısını eritmek için kullanılan ilaçlar)
- Nonsteroid antiinflatuvar ilaçlar (ağrı, ateş ve yangıyı azaltan ilaç grubu)
- Antikonvülzanlar (nöbet tedavisinde kullanılan ilaç grubu)
- Monoamin oksidaz inhibitörleri (depresyon tedavisinde kullanılan bir ilaç grubu)
- Antidepresan (depresyon tedavisi için kullanılır) bir ilaç olan trazodon
- Aminoglikozidler [bir antibiyotik grubu (örneğin; amikasin)]
- Proton pompası inhibitörü olan omeprazol (mide ülseri ve reflü tedavisinde kullanılan bir ilaç)

Aşağıdaki ilaçlar ile birlikte SEREBİL FORT'u kullanmadan önce doktorunuza danışınız:

- Nikardipin (kan basıncı yüksekliği ve göğüs ağrısı tedavisinde kullanılan bir ilaç grubu)
- Nifedipin (kan basıncı yüksekliği ve göğüs ağrısı tedavisinde kullanılan bir ilaç grubu)
- Tiyazid diüretikleri (idrar çıkısını artırarak kan basıncı yüksekliğinde ve dokuda anormal sıvı birikimi durumunda kullanılan bir ilaç grubu)
- Papaverin (iç organ spazmlarında kullanılan bir ilaç grubu)
- Buspiron (sıkıntı bozukluğu tedavisi için kullanılan bir ilaç grubu)
- Selektif serotonin geri alım inhibitörleri (depresyon, sıkıntı bozukluğu ve kişilik bozukluğu gibi hastalık tedavilerinde kullanılan bir ilaç grubu)
- İnsülin (şeker hastalığı tedavisinde kullanılan bir ilaç grubu)
- Risperidon (psikoz tedavisinde kullanılır)

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. SEREBİL FORT nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu ve tedavi süresini belirleyecektir. SEREBİL FORT'u alırken her zaman doktorunuzun talimatlarına kesin olarak uyunuz. Emin olmadığınız bir durumda doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Organik beyin sendromuna baęlı beyinle ilgili performans bozukluklarının ve bunama sendromlarının tedavisinde: Günde 1-2 kez 1 tablet (120 mg'dan 240 mg'a kadar *ginkgo biloba* yapraęı kuru ekstresine eřdeęer). Tedavinin süresi, belirtilerin ciddiyetine göre en az 8 haftadır.

Damarsal nedenli ve involüsyona baęlı baş dönmesi, denge bozuklukları ve kulak çınlaması olgularında: Günde 1 kez 1 film tablet (120 mg *ginkgo biloba* yapraęı kuru ekstresine eřdeęer). Tedavi süresi, en az 6-8 haftadır.

Periferik arteriyel okluzif hastalıklarda ağrısız yürüme mesafesinin iyileştirilmesinde: Günde 1 kez 1 film tablet (120 mg *ginkgo biloba* yapraęı kuru ekstresine eřdeęer). Tedavi, en az 6 hafta sürdürülmelidir.

Belirtilen tedavi sürelerinin tamamlanmasından sonra tedavinin devam edip etmeyeceęi doktorunuz tarafından kontrol edilmelidir. Doktorunuz, SEREBİL FORT ile tedavinizin ne kadar süreceęini size bildirecektir. Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

Uygulama yolu ve metodu:

Tabletler çiğnenmeden bir miktar sıvı (tercihen bir bardak içme suyu) ile birlikte yemeklerden sonra ağız yoluyla alınır.

Deęişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanım:

12 yaşın altındaki çocuklarda SEREBİL FORT'un kullanımı önerilmemektedir.

Yaşlılarda kullanım:

Özel kullanımı yoktur.

Özel kullanım durumları

Böbrek/Karacięer yetmezlięi:

Özel kullanımı yoktur.

Eęer SEREBİL FORT'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduęuna dair bir izlemeniz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla SEREBİL FORT kullandıysanız :
SEREBİL FORT'un aşırı dozda kullanımında, yan etkilerde artış görülür.

SEREBİL FORT'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

SEREBİL FORT'u kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozu tamamlamak için çift doz almayınız.

SEREBİL FORT ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Doktorunuz size ilacınızı kullanmayı ne zaman sonlandıracağını ve oluşabilecek etkileri söyleyecektir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, SEREBİL FORT'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa SEREBİL FORT'u kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz :

- Ciltte döküntü
- Mukozalarda değişiklik, beyin içine kanama, cerrahi sonrası kanama, Stevens Johnson Sendromu (geniş vücut alanlarını etkileyecek şekilde deride içi su toplamış kabarcıklarla kendini gösteren hastalık)
- Yüzde şişme
- Nefes almada güçlük

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin SEREBİL FORT'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

- Çarpıntı
- Kanama

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz

- Bulantı
- Kusma
- İshal
- Baş ağrısı
- Baş dönmesi
- Deride kaşıntı, döküntü
- Tansiyon değişiklikleri

Bunlar SEREBİL FORT'un hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorumuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. SEREBİL FORT'un saklanması :

SEREBİL FORT'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında ve ambalajında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra SEREBİL FORT'u kullanmayınız / son kullanma tarihinden önce kullanınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz SEREBİL FORT'u kullanmayınız.

Ruhsat sahibi : KOÇAK FARMA İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
Bağlarbaşı, Gazi Cad., No: 40
Üsküdar / İstanbul

İmal yeri : KOÇAK FARMA İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi
Çerkezköy / Tekirdağ

Bu kullanma talimatı 21/11/2013 tarihinde onaylanmıştır.