

## KULLANMA TALİMATI

**BUTİROL 7.5 mg/5 ml şurup**

**Ağız yoluyla alınır.**

- **Etkin madde:** Her 5 ml şurup, 7.5 mg butamirat sitrat (1,5 mg/ml) içerir.
- **Yardımcı maddeler:** Nipagin M, sodyum sakarin, portakal aroması, gliserin, sorbitol.

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin/çocuğunuz için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin/çocuğunuz için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size/çocuğunuza önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.*

### **Bu Kullanma Talimatında:**

1. **BUTİROL nedir ve ne için kullanılır?**
2. **BUTİROL'ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **BUTİROL nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **BUTİROL'ün saklanması**

**Başlıkları yer almaktadır.**

#### **1. BUTİROL nedir ve ne için kullanılır?**

- BUTİROL etkin madde olarak butamirat sitrat içeren, şurup formunda bir ilaçtır.
- BUTİROL, "öksürük baskılayıcı ilaçlar" olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir.
- BUTİROL şurup, vistop kapaklı, renkli 100 ml'lik şişeler ile kullanıma sunulmaktadır.
- BUTİROL çeşitli nedenlerden kaynaklanan öksürüğün şikayetlere yönelik (semptomatik) tedavisinde kullanılır.

## **2. BUTİROL'ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**

### **BUTİROL'ü aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ**

Eğer sizin/çocuğunuzun butamirat veya BUTİROL'ün bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı (yardımcı maddeler listesine bakınız) alerjiniz/allerjisi varsa kullanmayınız.

Eğer çocuğunuz 3 yaşın altında ise kullanmayınız.

### **BUTİROL'ü aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ**

Eğer siz/çocuğunuz aynı zamanda başka balgam söktürücü ilaçlar alıyorsanız, dikkatli olmalısınız. BUTİROL'ün bu tür ilaçlarla aynı anda kullanılmaması önerilir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin/çocuğunuz için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Öksürük 7 günden daha uzun süre devam ederse doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

### **Hamilelik**

- *İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- Hamile iseniz, ilk üç ay BUTİROL kullanmamanız önerilmektedir. Daha sonraki dönemde, ancak doktorunuz kesin gereklilik olduğuna karar verirse BUTİROL kullanabilirsiniz.
- *Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

### **Emzirme**

- *İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- Bebeğinizi emziriyorsanız, BUTİROL almadan önce doktorunuza danışınız.

### **Araç ve makine kullanımı**

- BUTİROL uyuklu hissetmenize neden olabilir. Bu nedenle araç ve makine kullanırken veya dikkat gerektiren diğer işleri yaparken dikkatli olunuz.

## **BUTİROL'ün içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler**

- BUTİROL sorbitol içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
- BUTİROL her 100 ml'sinde 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında "sodyum içermez".

## **Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı**

Eğer balgam söktürücü özelliği olan başka ilaçlar kullanıyorsanız doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz.

*Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

## **3. BUTİROL nasıl kullanılır?**

### **Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:**

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde kendiniz/çocuğunuz için belirtilen dozlarda kullanınız:

6-12 yaşındaki çocuklarda: Günde 3 defa 2/3 ölçek (10 ml)

Ergenlerde (adolesanlarda): Günde 3 defa 1 ölçek (15 ml)

Yetişkinlerde: Günde 4 defa 1 ölçek (15 ml)

Doktorunuz farklı bir tavsiyede bulunmadıkça, BUTİROL'ü 1 haftadan daha uzun süre kullanmayınız.

### **Uygulama yolu ve metodu:**

BUTİROL ağız yoluyla kullanılır.

İlacınızın dozunu ayarlanmak için dereceli ölçeği kullanınız. Dereceli ölçeği her kullanımda yıkayıp kurulumuz.

### **Değişik yaş grupları:**

#### **Çocuklarda kullanımı:**

BUTİROL Şurup 3 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır. 3-6 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı önerilmez.

**Yaşlılarda Kullanım:**

BUTİROL'ün yaşlılarda kullanımını araştırılmamıştır.

**Özel kullanım durumları**

BUTİROL böbrek veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda araştırılmamıştır.

*Eğer BUTİROL'ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.*

**Kullanmanız gerekenden daha fazla BUTİROL kullandıysanız:**

*BUTİROL'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor ve eczacı ile konuşunuz.*

**BUTİROL'ü kullanmayı unutursanız:**

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.*

Aşırı dozda BUTİROL alınması halinde şu belirtiler görülebilir: Uyku hali, bulantı, kusma, ishal, sersemlik ve tansiyon düşmesi. Bu etkiler doz azaltılınca veya tedavi kesilince ortadan kalkabilir. Eğer ilaç kesildiğinde bu etkiler devam ediyorsa doktorunuz veya eczacınıza danışınız.

**BUTİROL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:**

Bulunmamaktadır.

**4. Olası yan etkiler nelerdir?**

Tüm ilaçlar gibi, BUTİROL'ün içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

**Aşağıdakilerden biri olursa, BUTİROL'ü kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:**

- Ciltte döküntü

Bu çok ciddi bir yan etkidir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin BUTİROL'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etki oldukça seyrek görülür.

**Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:**

- Uyku hali
- Bulantı
- İshal

Bunlar BUTİROL'ün hafif yan etkileridir.

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

## **5. BUTİROL'ün saklanması**

*BUTİROL'ü çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.*

*25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.*

**Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.**

*Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra BUTİROL'ü kullanmayınız.*

*Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz BUTİROL'ü kullanmayınız.*

**Ruhsat Sahibi:** DROGSAN İlaçları San. ve Tic. A.Ş.  
Oğuzlar Mah. 1370. sok. 7/3  
06520 Balgat / ANKARA

**Üretim yeri:** DROGSAN İlaçları San. ve Tic. A.Ş.  
06760 Çubuk / Ankara

*Bu kullanma talimatı .../.../... tarihinde onaylanmıştır.*