

KULLANMA TALİMATI

CLEOCIN® %2 vajinal krem

Vajina içine uygulanır.

- **Etkin madde:** Her 1 gram kremde 20 mg klindamisin eşdeğer miktarda klindamisin fosfat bulunur.
- **Yardımcı maddeler:** Sorbitan monostearat, polisorbat 60, propilen glikol, stearik asit, setostearil alkol, setil palmitat, mineral yağ, benzil alkol, saf su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek** veya **düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

1. ***CLEOCIN Vajinal Krem nedir ve ne için kullanılır?***
2. ***CLEOCIN Vajinal Krem'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler***
3. ***CLEOCIN Vajinal Krem nasıl kullanılır?***
4. ***Olası yan etkiler nelerdir?***
5. ***CLEOCIN Vajinal Krem'in saklanması***

Başlıkları yer almaktadır.

1. CLEOCIN Vajinal Krem nedir ve ne için kullanılır?

- CLEOCIN Vajinal Krem, klindamisin fosfat isminde bir antibiyotik içerir ve vajinal krem şeklindedir. Bu ilaç, bakteriyel vajinozu (vajinadaki bakteriyel bir enfeksiyon) tedavi etmek için kullanılır.
- CLEOCIN Vajinal Krem, ağızı bakalit kapaklı 40 g'lık 7 adet tek kullanımlık aplikatörü ile birlikte sunulmaktadır.

2. CLEOCIN Vajinal Krem'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CLEOCIN Vajinal Krem'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer

- Klindamisin, linkomisin veya CLEOCIN Vajinal Krem'in içerdiği diğer maddelere karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz
- İltihaplı barsak hastalığı (IBD) veya antibiyotikle bağlantılı kolit rahatsızlığı geçmişiniz varsa

CLEOCIN Vajinal Krem'i ařađıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eđer

- İřhalseniz ya da antibiyotik aldıđınızda genel olarak ishal oluyorsanız, ya da mide, barsak problemleriniz varsa. Eđer ilacı kullanırken ya da tedavi sonrasında sizde řiddetli, uzun süreli ya da kanlı ishal meydana gelmiřse derhal doktorunuza bildiriniz; doktorunuza danıřmadan ishal kesici bir ila almayınız. Bu, antibiyotiklerle tedavi sonrasında oluřabilen barsak iltihaplanmasının (psödomembranöz kolit) bir göstergesi olabilir ve tedavinin sonlandırılması gerekebilir.
- 12 yařından küçük çocuklarda kullanımı uygun deđildir.
- Tüm vajinal enfeksiyonlarda olduđu gibi, CLEOCIN Vajinal Krem tedavisi sırasında cinsel iliřkiye girmeyiniz. CLEOCIN Vajinal, Krem kondom veya diyafram gibi dođum kontrol yöntemlerinin etkisini azaltabilir veya yok edebilir. Bu tedaviyi takip eden 72 saat boyunca kondom veya gebelik önleyici diyafram kullanmayınız.
- CLEOCIN Vajinal Krem tedavisi sırasında tampon, duř (vajinal yıkama) gibi diđer vajinal ürünlerin kullanımı tavsiye edilmez.

Bu uyarılar, gemiřteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geerliyse lütfen doktorunuza danıřınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

CLEOCIN Vajinal Krem'in hamileliđin ilk üç ayında kullanılmasının güvenli olup olmadıđı bilinmemektedir. Bu nedenle hamilelik döneminde doktorunuz önermedike CLEOCIN Vajinal Krem kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduđunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

CLEOCIN Vajinal Krem'in etkin maddesi süte geebileceđinden emzirme döneminde kullanmayı düşünüyorsanız doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz CLEOCIN Vajinal Krem'in size uygun olup olmadıđına karar verecektir. Emzirme döneminde etkin maddenin bebeđe süt vasıtasıyla gemesi beklenmese de bebeđinizde kanlı ishal veya bařka hastalık belirtileri görürseniz hemen doktorunuza danıřınız. Böyle bir durum gerekleřirse emzirmeyi durdurun.

Ara ve makine kullanımı

CLEOCIN Vajinal Krem'in araba ve tehlikeli makineler kullanımına etkisi üzerine özel alıřmalar yapılmamıřtır.

CLEOCIN Vajinal Krem tedavisinin araba sürme kabiliyetine bir etkisi olabileceđi düşünülmemesine rađmen, eđer bir sorunuz olursa doktorunuza danıřınız.

CLEOCIN Vajinal Krem'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

CLEOCIN Vajinal Krem propilen glikol içerir. Propilen glikol ciltte irritasyona neden olabilir.

CLEOCIN Vajinal Krem setostearil alkol içerir. Setostearil alkol lokal deri reaksiyonlarına (kontakt dermatit gibi) sebebiyet verebilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bazı ilaçlarla birlikte alındığında CLEOCIN Vajinal Krem'in ya da diğer ilacın etkisi değişebilir. Bunlar,

- Eritromisin (bir antibiyotik); iki ilaç birbirinin etkisini yok eder.
- Kas gevşeticiler (CLEOCIN Vajinal Krem bu ilaçların etkisini artırabilir)
- Klindamisine cevap vermeyen hastalar linkomisinden de fayda görmeyebilir.

Eğer reçeteli veya reçetesiz herhangi bir ilaç kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. CLEOCIN Vajinal Krem nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz CLEOCIN Vajinal Krem'i hangi dozda ve ne sıklıkta almanız gerektiğine karar verecektir.

Tavsiye edilen doz bir aplikatör dolusudur (yaklaşık 5 gram). Bir aplikatör dolusu ilaç yedi gün boyunca yatmadan önce vajina içine uygulanır.

Doktorunuzun talimatlarını tam olarak takip ediniz ve asla dozda kendiniz bir değişiklik yapmayınız.

Uygulama yolu ve metodu:

Vajina içine uygulanır.

Kremi kullanmadan önce ellerinizi mutlaka yıkayınız.

Aplikatörün uygulanması


İlacın kutusu içinde, vajina içine en uygun uygulamaya olanak sağlayacak şekilde tasarlanmış 7 adet tek kullanımlık plastik aplikatör vardır.

1- Tüpün kapağını açarak, plastik aplikatörlerden birini tüpün ağzına takınız.


2- Tüpü dibinden yavaşça sıkarak, kremin aplikatörün içine dolmasını sağlayınız.

Aplikatör içindeki itici kolun sonuna kadar dışarı dışarı itilmesi, yeteri miktarda kremin dolduğunu gösterir.

3- Aplikatörü tüpten ayırınız ve tüpün kapağını kapatınız.



- 4- Sırtüstü yatarken, aplikatörü vajina içine doğru olabildiğince derine ilerletiniz.
- 5- Aplikatörün içindeki itici kolu yavaşça en sonuna kadar itiniz.
- 6- Boşalan aplikatörü vajinadan yavaşça çıkarınız ve atınız.



Kullanılan aplikatörü klozete atmayınız.

Kremi uyguladıktan sonra ellerinizi iyice yıkayınız.

Özel kullanım durumları:

Çocuklarda kullanım:

Çocuklarda kullanım dozuna ilişkin veri yoktur. 12 yaşından küçük çocuklarda kullanılması önerilmez.

Yaşlı hastalarda kullanım:

Yaşlı hastalarda kullanım dozuna ilişkin veri yoktur.

Böbrek yetmezliği:

Herhangi bir doz ayarlaması yapılmasına gerek yoktur.

Karaciğer yetmezliği:

Herhangi bir doz ayarlaması yapılmasına gerek yoktur.

Doktorunuz başka türlü önermemişse, ilacı her gece yatmadan önce uygulamayı unutmayınız.

Eğer CLEOCIN Vajinal Krem'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa, doktorunuz veya eczacınızla konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla CLEOCIN Vajinal Krem kullandıysanız:

Eğer kullanmanız gerekenden daha fazla CLEOCIN vajinal krem kullandıysanız hemen doktorunuza söyleyiniz ve doktorunuz kullanmamanızı söyleyene kadar CLEOCIN vajinal krem kullanmayınız.

CLEOCIN vajinal krem yutarsanız

Siz veya bir yakınınız CLEOCIN vajinal krem yutarsa hemen doktorunuzla irtibata geçiniz. Krem büyük ihtimal ile herhangi bir zarara yol açmaz fakat ne yapacağınız konusunda doktorunuz size yol gösterecektir.

CLEOCIN Vajinal Krem'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacıya danışınız.

CLEOCIN Vajinal Krem almayı unutursanız:

Eğer bir CLEOCIN Vajinal Krem dozunu alacağınız saati birkaç saat geçirirseniz hatırladığımızda hemen kullanın. Bir sonraki dozun zamanı yakınsa, unuttuğunuz dozu atlayın. Sonraki dozları zamanında uygulayın.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

CLEOCIN Vajinal Krem ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

CLEOCIN Vajinal Krem'i düzenli olarak ve tam olarak doktorunuz önerdiği şekilde kullanınız. Kendinizi iyi hissetseniz dahi tedaviyi kesmeyin; çünkü tedavi erken sonlandırılırsa ilaç mikropların tamamını öldürmemiş olabilir ve enfeksiyon tekrarlanabilir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlarda olduğu gibi CLEOCIN Vajinal de yan etkilere neden olabilir; bununla beraber bu yan etkiler herkeste ortaya çıkmayabilir.

Aşağıdakilerden birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Yaygın olmayan şiddetli, uzun süreli ya da kanlı ishal (kramp şeklinde şiddetli karın ağrısı ya da ateşle birlikte seyredebilir). Bu, antibiyotiklerle tedavi sırasında ya da tedavi sonlandıktan sonra oluşabilen ve ciddi bir barsak enfeksiyonunu gösteren bir yan etkidir.
- Kurdeşen veya kızamık benzeri kızarıklık gibi alerjik reaksiyon oluşursa

Bunların hepsi ciddi yan etkidir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır.

| | |
|----------------|---|
| Çok yaygın | : 10 hastanın en az 1' inde görülebilir. |
| Yaygın | : 10 hastada birden az, fakat 100 hastada birden fazla görülebilir. |
| Yaygın olmayan | : 100 hastada birden az, fakat 1000 hastada birden fazla görülebilir. |
| Seyrek | : 1.000 hastada birden az görülebilir. |
| Çok seyrek | : 10.000 hastada birden az görülebilir. |
| Bilinmeyen | : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor. |

Yaygın:

- Vajinal kandidiyaz (kadın cinsel organında görülen bir çeşit mantar hastalığı)
- Vulvovajinit (kadın cinsel organında görülen kaşıntı ve akıntı)
- Uygulama bölgesi dışında kaşıntı
- Vulvovajinal rahatsızlık
- Havale
- Karın bölgesinde kramp

Yaygın olmayan:

- Sersemlik
- Denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi (vertigo)
- Baş ağrısı
- Mide ekşimesi
- Mide bulanması
- Kusma
- İshal
- Yaygın karın ağrısı
- Kabızlık
- Hazımsızlık
- Midede gaz
- Vajinit/vajinal enfeksiyon (kadın cinsel organında görülen enfeksiyon)
- İdrar yolu enfeksiyonu
- Bir çeşit mantar hastalığı (vücutta)
- Mantar enfeksiyonu
- Alerjik reaksiyon
- Burun kanaması
- Nefeste koku
- Döküntü
- Eritem ve ürtiker
- İdrar yaparken yanma
- İdrarda şeker
- İdrarda protein
- Vajinal ağrı (kadın cinsel organında ağrı)
- Vajinal akıntı (kadın cinsel organında akıntı)

Bilinmiyor:

- Trichomonas vajiniti (kadın cinsel organında görülen bir çeşit iltihap)
- Bir çeşit mantar hastalığı (deride)
- Bakteriyel enfeksiyon
- Üst solunum yolu enfeksiyonu
- Hipertiroidizm (vücutta tiroid hormonunun gereğinden fazla üretilmesi)
- Tat duyusu bozuklukları

- Bölgesel karın ağrısı
- Karın bölgesinde gerginlik
- Sindirim sistemi şikayetleri
- Makülopapüler döküntü
- Sırt ağrısı
- Doğum eyleminin normal seyretmemesi,
- İnflamatuvar ödem, yaygın ağrı
- Mikrobiyolojik testlerde anormallik
- Adet düzensizlikleri
- Ara kanama
- Endometriyoz (kadın cinsel organında görülen bir çeşit hastalık)
- Pelvik ağrı

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. CLEOCIN Vajinal'in saklanması

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

15-30°C arasındaki oda sıcaklığında saklayınız. Dondurmayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CLEOCIN Vajinal'i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

PFİZER İLAÇLARI Ltd. Şti.
Muallim Naci Cad. No:55
34347 Ortaköy/İSTANBUL

Üretici:

Zentiva Sağlık Ürünleri San. Tic. A.Ş.
Küçükkarıştıran 39780 Lüleburgaz

Bu kullanma talimatı..... tarihinde onaylanmıştır.