

## KULLANMA TALİMATI

### KREVAL şurup

Ağızdan alınır.

- **Etkin madde:** Her bir ölçek (5 ml) 7.5 mg butamirat sitrat içerir.
- **Yardımcı maddeler:** Sodyum sakkarin, Benzoik asit, Karboksimetilselüloz sodyum, Gliserin, Sorbitol (%70'lik), Kayısı aroması, Deiyonize su

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.*

### **Bu Kullanma Talimatında:**

1. ***KREVAL nedir ve ne için kullanılır?***
2. ***KREVAL'in kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler***
3. ***KREVAL nasıl kullanılır?***
4. ***Olası yan etkiler nelerdir?***
5. ***KREVAL'in saklanması***

**Başlıkları yer almaktadır.**

## 1. KREVAL nedir ve ne için kullanılır?

- KREVAL etkin madde olarak butamirat sitrat içeren, şurup formunda bir ilaçtır.
- KREVAL, “öksürük baskılayıcı ilaçlar” olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir.
- KREVAL şurup, 100 ml ve 200 ml bal rengi cam şişede 5 ml’lik 1.25, 2.5 ve 5 ml’ye işaretli ölçeğiyle beraber sunulmuştur.
- KREVAL çeşitli nedenlerden kaynaklanan öksürüğün şikayetlere yönelik (sempomatik) tedavisinde kullanılır.

## 2. KREVAL’in kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

### **KREVAL’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ**

Eğer sizin/çocuğunuzun butamirat veya KREVAL’in bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı (yardımcı maddeler listesine bakınız) alerjiniz/allerjisi varsa

### **KREVAL’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ**

Eğer siz/çocuğunuz aynı zamanda başka balgam söktürücü ilaçlar alıyorsanız, dikkatli olmalısınız. KREVAL’in bu tür ilaçlarla aynı anda kullanılmaması önerilir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin/çocuğunuz için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Öksürük 7 günden daha uzun süre devam ederse doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

### **KREVAL’in yiyecek ve içecek ile kullanılması**

KREVAL’i aç veya tok karına alabilirsiniz.

### **Hamilelik**

- *İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- Hamile iseniz, ilk üç ay KREVAL kullanmamanız önerilmektedir. Daha sonraki dönemde, ancak doktorunuz kesin gereklilik olduğuna karar verirse KREVAL kullanabilirsiniz.
- Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

### **Emzirme**

- *İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- Bebeğinizi emziriyorsanız, KREVAL almadan önce doktorunuza danışınız.

### **Araç ve makine kullanımı**

- KREVAL uyukulu hissetmenize neden olabilir. Bu nedenle araç ve makine kullanırken veya dikkat gerektiren diğer işleri yaparken dikkatli olunuz.

#### **KREVAL'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler**

- KREVAL sorbitol içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
- KREVAL her 100 ml'sinde 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder,yani esasında "sodyum içermez".

#### **Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı**

Eğer balgam söktürücü özelliği olan başka ilaçlar kullanıyorsanız doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz.

*Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

### **3. KREVAL nasıl kullanılır?**

#### **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:**

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde kendiniz/çocuğunuz için belirtilen dozlarda kullanınız:

3-6 yaş arasındaki çocuklarda: Günde 3 defa 1 ölçek (5 ml)

6-12 yaşındaki çocuklarda: Günde 3 defa 2 ölçek (10 ml)

Ergenlerde (adolesanlarda): Günde 3 defa 3 ölçek (15 ml)

Yetişkinlerde: Günde 4 defa 3 ölçek (15 ml)

Doktorunuz farklı bir tavsiyede bulunmadıkça, KREVAL'i 1 haftadan daha uzun süre kullanmayınız.

#### **Uygulama yolu ve metodu:**

KREVAL ağız yoluyla kullanılır.

İlacınızın dozunu ayarlamak için dereceli ölçeği kullanınız. Dereceli ölçeği her kullanımda yıkayıp kurulayınız.

#### **Değişik yaş grupları:**

##### **Çocuklarda kullanımı:**

KREVAL Şurup'un 3 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı araştırılmamıştır.

##### **Yaşlılarda kullanımı:**

KREVAL'in yařlılarda kullanımını arařtırılmamıřtır.

#### **Özel kullanım durumları:**

##### **Böbrek/karaciğer yetmezlięi:**

KREVAL böbrek veya karaciğer yetmezlięi olan hastalarda arařtırılmamıřtır.

*Eęer KREVAL'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduęuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuza veya eczacınıza ile konuřunuz.*

##### **Kullanmanız gerekenden daha fazla KREVAL kullandıysanız**

*KREVAL'in kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuřunuz.*

##### **KREVAL'i kullanmayı unutursanız**

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.*

Ařırı dozda KREVAL alınması halinde řu belirtiler görülebilir: Uyku hali, bulantı, kusma, ishal, sersemlik ve tansiyon düşmesi. Bu etkiler doz azaltılınca veya tedavi kesilince ortadan kalkabilir. Eęer ilaç kesildięinde bu etkiler devam ediyorsa doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

##### **KREVAL ile tedavi sonlandırıldıęında oluřabilecek etkiler**

Bulunmamaktadır.

#### **4. Olası yan etkiler nelerdir?**

Tüm ilaçlar gibi KREVAL'in içerięinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde, yan etkiler olabilir.

**Ařaęıdakilerden biri olursa, KREVAL'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne bařvurunuz:**

- Ciltte döküntü,

Bu çok ciddi bir yan etkidir. Eęer bu yan etki sizde mevcut ise, sizin KREVAL'e karřı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etki oldukça seyrek görülür.

**Ařaęıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:**

- Uyku hali
- Bulantı
- İshal

Bunlar KREVAL'in hafif yan etkileridir.

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

#### **5. KREVAL'in saklanması**

*KREVAL'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.*

**Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.**

*Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra KREVAL'i kullanmayınız.*

*Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz KREVAL'i kullanmayınız.*

#### **Ruhsat Sahibi:**

Recordati İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Doğan Araslı Cad. No:219

34510 Esenyurt/İSTANBUL

#### **İmal Yeri:**

Recordati İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Doğan Araslı Cad. No:219

34510 Esenyurt/İSTANBUL

*Bu kullanma talimatı .....tarihinde onaylanmıştır.*