

KULLANMA TALİMATI

CECLOR MR 750 mg film tablet

Ağızdan alınır.

- **Etkin madde:** Sefaklor monohidrat 784.6 mg (750 mg sefaklora eşdeğer)
- **Yardımcı maddeler:** Mannitol, metilhidroksipropil selüloz, hidroksipropil selüloz, metakrilik asit kopolimer Tip C, stearik asit, magnezyum stearate. **Kaplama maddesi:** Propilen glikol, talk, hipromeloz, titanyum dioksit, makrogol, indigo karmin alüminyum lak (E132)

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

1. **CECLOR MR nedir ve ne için kullanılır?**
2. **CECLOR MR'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **CECLOR MR nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **CECLOR MR'ın saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. CECLOR MR nedir ve ne için kullanılır?

CECLOR MR 750 mg film tablet mavi renkli, oval, film kaplı tabletler halindedir. Her kutuda 10 tablet vardır.

CECLOR MR, beta laktam antibakteriyellerden ikinci kuşak sefalosporinler olarak adlandırılan bir gruba aittir.

CECLOR MR sefaklora duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu akut bronşit, kronik bronşitin akut alevlenmeleri, farenjit, tonsilit (bademcik iltihabı), pnömoni (zatüree), komplikasyonsuz alt idrar yolu enfeksiyonları, deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.

2. CECLOR MR'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CECLOR MR'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

- Sefalosporin grubu antibiyotiklere veya CECLOR MR içindeki etkin veya yardımcı maddelerden birine karşı duyarlılığınız varsa bu ilacı kullanmayınız.

CECLOR MR'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:

- Böbrek yetmezliğiniz varsa.
- Penisilinlere veya başka ilaçlara karşı alerjiniz varsa

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız.

CECLOR MR'm yiyecek ve içecek ile kullanılması

Tablet kırılmadan, ezilmeden ve çiğnenmeden yutulmalıdır. Ağız yolundan aç ya da tok karnına alınabilir fakat gıda maddeleri ile alındığı zaman emilimi artmaktadır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Ürünün gebelik dönemindeki güvenilirliği henüz tam olarak belirlenmiş değildir. Hamilelik sırasında doktorunuz bu ilacı kullanıp kullanmamanıza karar verecektir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Annelere 500 mg dozlarda uygulanan sefaklor, sütte az miktarda tespit edilmiştir.

Emzirmenin durdurup durdurulmayacağına veya ilacın kullanılıp kullanılmayacağına doktorunuz karar verecektir.

Araç ve makine kullanımı

CECLOR MR'm araç ve makine kullanma becerisini etkilediğine yönelik bilgi bulunmamaktadır.

CECLOR MR'm içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

CECLOR MR propilen glikol içermektedir. Bu madde yüksek dozlarda alkol benzeri semptomlara neden olabilir.

CECLOR MR düşük miktarda mannitol içermektedir. Bu maddenin 10 g üzerinde alınması dışkıda yumuşamaya neden olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

- Bir saat içinde alınan magnezyum ya da alüminyum hidroksit içeren antiasid ilaçlar CECLOR MR'm emilim süresini azaltırlar. H₂ blokörleri CECLOR MR emilim hızı ve oranı üzerinde etkili değildir.

- Bütün dięer beta-laktam antibiyotikleri gibi CECLOR MR'ın bbreklerden atılımı probenesid (gut hastalığında kullanılan bir ilaç) ile azalır. Varfarin (kan pıhtılaşmasının tedavisi ve korunmasında kullanılan bir ilaç) ve CECLOR MR'ı birlikte kullanan hastalarda protrombin zamanı (pıhtılaşma fonksiyonlarının azaldığını gösteren bir test) uzaması görlebilir.
- Sefaklor uygulaması idrarda hatalı-pozitif glikoz reaksiyonu verdirebilir. Sefalosporinlerle yapılan tedavilerde direkt Coombs testi pozitif olabilir.

Bu ifadelerin, belirli bir sre nce kullanılmıř veya gelecekte bir zaman kullanılacak rnlere de uygulanabileceğini ltfen not ediniz.

Doktorunuz nermedike kesinlikle bařka ilaları kullanmayınız.

Eęer reeteli ya da reetesiz herhangi bir ilacı řu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise ltfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. CECLOR MR nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

nerilen doz olan gnde 2 tableti kırmadan, ezmeden ve iğnemedten alınız. İlacınızı 12 saat ara ile her gn aynı vakitte almaya alışınız.

Uygulama yolu ve metodu:

CECLOR MR ağızdan alınır.

Deęişik yař grupları:

Yařlılarda kullanım:

CECLOR MR'ın eriřkinlerdeki kullanımını ile yařlılardaki kullanımını arasında kullanım dozu ve sıklığı aısından herhangi bir deęişiklik yoktur.

ocuklarda kullanım:

CECLOR MR 16 yařından kk olanlarda kullanılmamalıdır. ocuklarda kullanım için uygun farklı doz şekilleri mevcuttur.

zel kullanım durumları:

Bbrek yetmezlięi:

Bbrek yetmezliğinde doktorunuzun doz ayarlaması yapması gerekebilir. (Durumunuza gre doz yarı yarıya azaltılabilir)

Karacięer yetmezlięi:

Karacięer yetmezliğiniz varsa doktorunuzun herhangi bir doz ayarlaması yapmasına gerek yoktur.

Eęer CECLOR MR'ın etkisinin ok gl veya zayıf olduęuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuřunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla CECLOR MR kullandıysanız:

CECLOR MR'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Aşırı doz durumunda derhal doktorunuza veya bir eczaneye başvurunuz.

Aşırı doz belirtileri bulantı, kusma, karın üst bölgesinde ağrı ve ishaldir. Bu gruptaki ilaçlar aşırı dozlarda nöbet geçirme olasılığını artırabilirler. Bu gibi durumlarda derhal doktorunuza başvurmanız gereklidir.

CECLOR MR'ı kullanmayı unutursanız:

Unuttuğunuz dozu mümkün olduğu kadar çabuk almaya çalışınız ve sonra doktorunuzun tavsiye ettiği aralıkları uygulamaya devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

CECLOR MR ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Doktorunuz tarafından belirtilmedikçe, tedaviyi durdurmayınız.

Eğer bu ürünün kullanımına ilişkin başka sorunuz varsa doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm diğer ilaçlar gibi, CECLOR MR'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, CECLOR MR'ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Nefes almada zorluk
- Deride kaşıntı, şişlik, döküntü, kızarıklık
- Deride ve mukoza mebranlarında (ağız, boğaz ve bazı iç organların yüzeyini kaplayan ve salgı üreten doku) şişme ve kabarcık oluşumu
- Kuvvetsizlik, yorgun düşme
- Yüz ve dudakları da kapsayan ödem (su birikmesinden kaynaklanan şişme)
- Vücutta karıncalanma
- Bayılma

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin CECLOR MR'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Ateş, inatçı boğaz ağrısı gibi inatçı yeni enfeksiyonlar
- Eklemelerde ağrı, kas güçsüzlüğü ile seyreden deri döküntüleri, kaşıntı (serum hastalığı)
- Şiddetli, kanlı veya sümüklü olabilen inatçı ishal
- İdrar renginin koyu çıkması, deride morluklar veya kanama gelişmesi gibi kan hücrelerinin azalmasını gösteren bulgular

- Deri ve gözlerde sarılık
- Deri altında sıvı toplanması, soyulma, nekroz (kangren) gibi bulguların eşlik ettiği ciddi deri reaksiyonları
- İdrar miktarında azalma

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

- Yorgunluk
- Uykusuzluk
- Sinirlilik
- Bulantı, kusma, hafif ishal, hazımsızlık
- Artmış kas kasılmaları
- Genital bölgede (vajinada) enfeksiyonlar
- Deride döküntü, kaşıntı
- Kaslarda sertleşme

Bunlar CECLOR MR'ın hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. CECLOR MR'ın saklanması

CECLOR MR'ı çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve orijinal kutusunda saklayınız.

CECLOR MR'ı 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Işıktan korunmalıdır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CECLOR MR'ı kullanmayınız/son kullanma tarihinden önce kullanınız.

Ruhsat sahibi:

Actavis İlaçları A.Ş.

Gültepe Mah. Polat İş Merkezi 34394 Levent/Şişli-İstanbul

Üretim yeri:

Mustafa Nevzat İlaç San. A.Ş.

Sanayi Caddesi No.66, 34350 Yenibosna-İstanbul

Bu kullanma talimatı .././.... tarihinde onaylanmıştır.