

## KULLANMA TALİMATI

### ACUITEL® 5 mg bölünebilir film kaplı tablet

Ağızdan alınır.

- **Etkin madde:** 5 mg kinaprile eşdeğer 5,416 mg kinapril hidroklorür
- **Yardımcı maddeler:** Magnezyum karbonat (E504i), magnezyum stearat (E572), laktoz, jelatin, krospovidon, opadry yellow Y-5-6330G (hidroksipropil metil selüloz, hidroksipropil selüloz, titanyum dioksit (E171), polietilen glikol, sarı demir oksit (E172iii), kırmızı demir oksit (E172ii)), kandelila mumu. Ürün, sığır kaynaklı laktoz ve jelatin hammaddeleri içermektedir.

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

### **Bu Kullanma Talimatında:**

1. **ACUITEL nedir ve ne için kullanılır?**
2. **ACUITEL'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **ACUITEL nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **ACUITEL'in saklanması**

**Başlıkları yer almaktadır.**

#### **1. ACUITEL nedir ve ne için kullanılır?**

- Her bir film kaplı tablet, 5 mg kinaprile eşdeğer kinapril hidroklorür içeren 20 tabletlik blister ambalajda kullanıma sunulmuştur.
- ACUITEL sarı, oval, bir tarafı çentikli, diğer tarafında "5" baskısı bulunan bölünebilir film kaplı tablettir.
- ACUITEL anjiyotensin dönüştürücü enzim (ADE) inhibitörleri olarak adlandırılan bir ilaç grubuna aittir. Bu tür ilaçlar kan damarlarını genişletir ve bu da damarlardaki basıncı azaltabilir.
- ACUITEL, yüksek tansiyon ve kalp yetersizliği tedavisinde kullanılır.

## 2. ACUITEL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

### ACUITEL’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

- Kinapril veya ACUITEL’in bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa (deride kaşıntı, döküntü, kızarıklık veya nefes almada zorluk oluşabilir),
- Hamileliğiniz 3 ayı geçtiyse (erken hamilelikte de kullanılmaması önerilir bkz. Hamilelik),
- Alerji sonucu nefes alma güçlüğüne sebep olan yüz, dil ve boğazda şişme durumunuz varsa (anjioödem),
- Ana atardamarınızda (aort) daralma varsa,
- Böbrek hastalığınız varsa,
- Şeker hastalığı veya böbrek fonksiyonu bozukluğu olanlarda kan basıncını düşürmek için aliskiren içeren bir ilaç kullanıyorsanız,
- Kalp yetmezliğine yönelik ilaç olan sakubitril/valsartan kullanıyorsanız.

### ACUITEL’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

- Böbrek yetmezliğiniz varsa ya da kan diyaliz makinesi (yapay böbrek) kullanıyorsanız,
- Sarılık ya da herhangi bir karaciğer hastalığı belirtisi yaşarsanız derhal doktorunuzla iletişime geçiniz,
- Kalp hastalığı ya da kalp yetersizliğiniz varsa,
- Önceden yüksek kan basıncı tedavisi için ilaç kullanımı sonucu kan basıncında ani düşüş yaşadığınız,
- Kollajen damar hastalığınız (kan damarlarınızda kollajen birikmesi) varsa,
- Kanınızın bir makine yardımı ile kolesterolden arındırılması işlemi görüyorsanız ya da görecekseniz (LDL aferezi),
- Alerji ya da astımınız varsa,
- Alerjiye karşı duyarsızlaştırma tedavisi görüyorsanız ya da görecekseniz (örn. arı sokması alerjisinin etkilerinin azaltılması)
- Şeker hastalığınız varsa,
- Başka ilaçlar kullanıyorsanız (bkz. Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı)
- Çocuk doğurma potansiyeliniz varsa (bkz. Hamilelik)
- Eğer size cerrahi ve/veya anestezi uygulaması yapılması planlanıyorsa,
- Laktoz, galaktoz gibi şekerlere karşı intolerans varsa,
- Yüksek kan basıncı tedavisinde kullanılan aşağıdaki ilaçlardan birini kullanıyorsanız:
  - Anjiyotensin II reseptör blokörleri (sartanlar olarak da bilinir – örn. Valsartan, telmisartan, irbesartan), özellikle böbrek problemi kaynaklı diyabet hastalığınız varsa
  - Aliskiren gibi direkt renin inhibitörleri

- ACUITEL ile birlikte tümör hücrelerinin büyüme ve bölünmesini önleyen mTOR (rapamisin protein kompleksinin memeli hedefi) inhibitörleri (örn. temsirolimus), belli antidiyabetik ilaçlar (DPP-4 inhibitörleri; örn. vildagliptin) ya da kalp yetmezliği ve yüksek kan basıncı için kullanılan belli ilaçlar (nötral endopeptidaz inhibitörü; örn. rasekadotril) kullanılıyorsanız, anjiyoödem (yüz, gözler, dil veya boğazda şişme) riskiniz yüksek olabilir. Bu nedenle ACUITEL kullanmakta olan hastalarda bu tip ilaçlarla tedavinin başlatılması durumunda özellikle dikkatli olunmalıdır,
- Kanınızdaki sodyum düzeylerinde azalmaya neden olabilecek ilaçlar kullanıyorsanız veya bu tip bir hastalığınız varsa,

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Doktorunuz düzenli olarak böbrek fonksiyonlarınızı, kan basıncınızı ve kanınızdaki elektrolit (örn. potasyum) miktarlarınızı kontrol edebilir.

### **ACUITEL'in yiyecek ve içecek ile kullanılması**

ACUITEL aç ya da tok alınabilir.

### **Hamilelik**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

Hamileyseniz ya da hamile kalmaya çalışıyorsanız ACUITEL'i kesinlikle kullanmayınız. Doktorunuz genellikle hamile kalmadan önce veya siz hamile olduğunuzu öğrenir öğrenmez ACUITEL yerine başka bir ilaç almanızı tavsiye edecektir. ACUITEL erken hamilelikte tavsiye edilmez ve hamileliğin üçüncü ayından sonra kullanıldığında bebeğinize ciddi zarar verebileceği için hamileliğiniz 3 ayı geçtiyse kullanmamalısınız.

*Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

### **Emzirme**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

ACUITEL kullanırken, yeni doğan bebekleri (doğumdan sonraki ilk birkaç hafta) ve özellikle prematüre bebekleri emzirmek önerilmez. Daha büyük bebekleri emzirmek konusunda ise doktorunuz, diğer tedavilere kıyasla, emzirirken ACUITEL kullanmanın yararları ve riskleri konusunda sizi bilgilendirmelidir.

### **Araç ve makine kullanımı**

ACUITEL, özellikle tedavinizin başlangıcında araç ve makine kullanma yeteneğinizi olumsuz etkileyebilir. Sersemlik veya yorgunluk hissediyorsanız araç ve makine kullanmayınız, derhal doktorunuza danışınız.

## ACUITEL'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

ACUITEL laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

### Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Doktorunuza veya eczacınıza, halen kullanmakta olduğunuz, yakın zamana kadar kullanmış olduğunuz ya da kullanma ihtimaliniz olan ilaçlarla ilgili bilgi veriniz. ACUITEL ile etkileşime girebilecek bazı ilaçlar vardır. Doktorunuzun dozunuzu değiştirmesi ve/veya başka önlemler almanızı tavsiye etmesi gerekebilir.

ACUITEL ile etkileşimi olabilecek bazı ilaçlar:

- Anjiyotensin II reseptör blokörleri veya aliskiren,
- Kan basıncını düşüren başka ilaçlar ve idrar söktürücü (diüretik) ilaçlar,
- Tetrasiklin olarak adlandırılan enfeksiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar,
- Sulfametoksazol ve trimetoprim gibi antibiyotikler,
- Potasyum destek tedavisi (potasyum içeren tuz bileşenleri dahil),
- Lityum (depresyontedavisi için bir ilaç),
- Ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar (non steroidal antiinflamatuvar ilaçlar; aspirin, ibuprofen dahil),
- Kortizon içeren ilaçlar (hidrokortizon, deksametazon ya da prednizolon),
- Düzensiz kalp atışlarını düzenlemek için kullanılan ilaç (prokainamid), kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar (sitostatik ilaçlar), bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar (Crohn hastalığı, romatoid artrit gibi bağışıklık sistemi hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar), süregelen gut tedavisinde kullanılan ilaç (allopurinol),
- Sindirim güçlüğü ve yemek borusunda yanma hissine karşı kullanılan ilaçlar (antiasitler),
- Sakinleştirici etkisi olan madde ve ilaçlar (alkollü içecekler ve uyku hapları dahil),
- Böbreküstü bozukluklarında kullanılan ilaçlar (tetrakosaktrin (ACTH)),
- Kalp yetersizliği ve şok tedavisinde kullanılan ilaçlar (sempatomimetikler),
- Böbrek kanserinin tedavisi için kullanılan mTOR inhibitörleri (temsirolimus dahil), belli antidiyabetik ilaçlar (DPP-4 inhibitörleri; örn. vildagliptin) ya da kalp yetmezliği ve yüksek kan basıncı için kullanılan belli ilaçlar (nötral endopeptidaz inhibitörü; örn. rasekadotril), anjiyoödem (yüz, gözler, dil veya boğazda şişme) riskini artırabilir.
- Enjeksiyon yoluyla kullanılan altın içeren ilaçlar (örn. sodyum orotiyomalat),
- Anestezikler.
- Enjekte edilebilir altın tedavisi

ACUITEL bazı laboratuvar testlerinin sonuçlarını etkileyebilir. Doktorunuz veya hastaneniz tarafından size bir test yapılması gerekiyorsa, doktorunuza veya hastanenize ACUITEL kullandığınızı söyleyiniz.

*Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

### 3. ACUITEL nasıl kullanılır?

- **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:**

Yüksek tansiyon tedavisinde genel başlangıç dozu günde 10 mg'dır. Eğer bu dozlarla kan basıncınız kontrol altına alınmazsa, doktorunuz günlük dozu kademeli olarak 80 mg'a kadar yükseltebilir.

Konjestif kalp yetersizliğinde, beraberinde bir de idrar söktürücü (diüretik) ilaç kullanıyorsanız, ya da böbrek yetmezliğiniz varsa genel başlangıç dozu günde 2,5 mg'dır. Doktorunuz konjestif kalp yetersizliğinde günlük dozu maksimum 40 mg'a kadar yükseltebilir.

- **Uygulama yolu ve metodu:**

ACUITEL'i günde bir ya da iki kez alınız. Size hangi doz reçete edilmiş olursa olsun, tam olarak doktorunuzun talimatlarına uyun ve dozu asla kendiniz değiştirmeyin. ACUITEL'i sabah veya akşam aç veya tok karına alabilirsiniz.

Tabletlerinizi her gün aynı saatte almaya çalışınız. ACUITEL'i bütün olarak, yeterli miktarda su ile yutunuz. 5 mg ve 20 mg'lık tabletler eşit dozlara bölünebilir.

- **Değişik yaş grupları:**

#### **Çocuklarda kullanımı:**

Çocukların ve 18 yaşın altındaki ergenlerin ACUITEL kullanması tavsiye edilmez.

#### **Yaşlılarda kullanımı:**

ACUITEL'in yaşlılarda önerilen başlangıç dozu günde 2,5 mg'dır.

- **Özel kullanım durumları:**

#### **Böbrek yetmezliği:**

Böbrek yetmezliğiniz varsa başlangıç dozu 2,5 mg'dır. Devam dozunuza doktorunuz karar vermelidir.

#### **Karaciğer yetmezliği:**

Karaciğer yetmezliğinde dikkatli kullanılmalıdır. Karaciğer yetmezliğiniz şiddetine göre doktorunuz dozunuzu ayarlayacaktır.

*Eğer ACUITEL'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.*

### **Kullanmanız gerekenden daha fazla ACUITEL kullandıysanız:**

Doktorunuzun önerdiğinden fazla ACUITEL kullanmak kendinizi kötü hissettirebilir. Derhal doktorunuza veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz. Hastane personelinin hangi ilacı aldığınızı kolayca anlayabilmesi için kalan tabletleri, ambalajı ve bu kullanma talimatını yanınıza alınız.

*ACUITEL'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

### **ACUITEL'i kullanmayı unutursanız:**

İlacınızı almayı unutursanız, unuttuğunuz dozu atlayarak bir sonraki dozunuzu her zamanki saatinde alınız.

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.*

### **ACUITEL ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:**

Doktorunuz tedaviyi kesmenizi söylemedikçe ACUITEL'i almayı bırakmayınız. Tedavi sonlandırıldığında herhangi bir etkinin oluştuğuna dair bilgi mevcut değildir, ancak doktorunuzun bilgisi dışında tedaviyi kesmeniz durumunda yüksek tansiyon nedeniyle zarar görebilirsiniz. Doktorunuzu görmeden önce tabletlerinizin bitmesini beklemeyiniz.

Bu ilacın kullanımını konusunda ilave sorularınız varsa, doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

### **4. Olası yan etkiler nelerdir?**

Tüm ilaçlar gibi ACUITEL'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde tanımlanmıştır:

Çok yaygın	:10 hastanın en az birinde görülebilir .
Yaygın	:10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan	:100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek	:1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Çok seyrek	:10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor	: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

**Aşağıdakilerden biri olursa ACUITEL'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:**

- Bu ilaca şiddetli alerjik (anafilaktik) reaksiyon; nefes alma güçlüğüne sebep olan yüz, dil ve boğazda şişme (anjiyoödem; sıvının birikmesinden kaynaklanan derinin daha derin tabakasının şişmesi),
- Bağırsak duvarının şişmesinden (bağırsaklarda anjiyoödem) dolayı hastalanmanıza neden olan aşırı karın ağrısı,
- Hastalık hissi ile gelen ve sırta yayılabilen şiddetli karın ağrısı (pankreas iltihabı),

- Anjina ya da kalp krizi belirtisi olabilecek göğüs ağrısı, göğüste sıkışma, nefes darlığı, hırıltılı nefes alma ya da nefes almada zorluk ve düzensiz veya hızlı kalp atışı (çarpıntı),
- Olası bir felcin belirtisi olabilecek kollarda, bacaklarda, yüzde güçsüzleşme, konuşma güçlüğü ya da görmede bozukluk,
- Ani şiddetli baş ağrısı, nöbet, koordinasyon ve denge kaybı (serebrovasküler olay)
- Deri döküntüsü, sıyrıklar, tahriş, kaşıntı, ürtiker, kabarıklık, soyulma ve pullanma,
- Kırmızı veya mor deri döküntüsü, deride ağrı, tahriş, deri ve ağızda kabarıklık, ateş ve grip benzeri belirtiler sonrası burun, gözler, üreme organları, yüz ve dilde şişme (Stevens-Johnson Sendromu),
- Birden ayağa kalkınca bayılma hissi. Bu tansiyonunuzun çok düştüğü anlamına gelebilir. ACUITEL ile birlikte başka tansiyon ilacı alıyorsanız, alkol kullandıysanız ya da susuz kaldıysanız veya diyalizdeyseniz bunun olma olasılığı artar. Bayılacak gibi hissettiğinizde, bu duygu geçene kadar uzanınız.
- Özellikle böbrek yetmezliğiniz veya damar hastalığınız varsa, şiddetli boğaz ağrısı ya da ciddi ağız yaraları oluyorsa bu kanınızda yetersiz beyaz kan hücreleri olduğu anlamına gelebilir ve enfeksiyon ya da ateş riskini arttırabilir.
- Göğüs ağrısı, göğüs sıkışması, nefes darlığı, nefes alıp verirken ısıklık çalar gibi ses çıkması, nefes alma güçlüğü,
- Ciltte ve göz aklarında sararma (sarılık).

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin ACUITEL'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

**Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:**

**Yaygın:**

- Kan potasyum seviyesinde artış
- Uykusuzluk
- Öksürük, boğaz iltihabı
- Burun tıkanması ve/veya akıntısı (rinit)
- İshal
- Sindirim güçlüğü
- Kendini hastaymış gibi hissetmek veya hasta olmak
- Yorgunluk, güçsüzlük, enerji düşüklüğü
- Baş ağrısı
- Sersemlik
- Deride gıdıklanma, iğnelenme ya da yanma hissi
- Sırt ağrısı
- Düşük kan basıncı
- Göğüs ağrısı
- Kaslarda ağrı
- Kanda kreatinin ve kan üre artışı
- Bulantı, kusma
- Nefes almada güçlük
- Karın ağrısı

- Kandaki sodyum konsantrasyonunda azalma

#### **Yaygın olmayan:**

- Depresyon, sinirlilik, kafa karışıklığı
- Vücutta su tutulması
- Kan damarlarının genişlemesi
- Hızlı kalp atışı (taşikardi), çarpıntı, göğüste sıkışma ve baskı hissi, kalp krizi
- Uyuşukluk
- Uykuya eğilimli olma
- Geçici ya da aralıklı meydana gelen felç
- Görmenin azalması (gözlük ya da kontak lens kullanımıyla düzelmeyen)
- Kulakta çınlama veya ses
- İç kulak problemi kaynaklı baş dönmesi ve sersemlik
- Ağızda veya boğazda kuruluk
- Gaza bağlı mide-bağırsakta şişkinlik, gaz çıkarmak
- Aşırı terleme
- Döküntü, deride kaşıntı
- Erkek cinsel organında sertleşmenin sağlanamaması
- İdrarda protein, idrar yolu enfeksiyonu, böbrek fonksiyonlarında azalma
- Sinüslerde iltihap (sinüzit), bronşit, üst solunum yolu enfeksiyonu
- Ateş
- Ciltte yaygın ödem
- Bacak, ayak, kollar ve ellerde şişlik

#### **Seyrek:**

- Tat alma duyusunda bozukluk
- Kabızlık
- Dilde ağrı
- Denge problemleri, bayılma
- Bir çeşit kan hücresi olan eozinofillerde artıştan kaynaklanan akciğerlerde şişme (eozinofilik pnömoni)
- Kurdeşen, aşırı duyarlılık sonucu gelişen döküntüler

#### **Çok seyrek:**

- Bulanık görme
- Bağırsak tıkanıklığı, belirtileri mide ağrısı, bulantı, kusma ve barsak krampları olan barsak duvarlarının şişmesi olanintestinal anjiyoödem
- Sedef benzeri döküntü

#### **Bilinmiyor:**

- Kırmızı kan hücresi hacminde anormal düşüş
- Morarma veya mor ya da kırmızı renkli döküntü
- Safra kanalında tıkanıklık (sarılık) ya da karaciğerin iltihaplanması nedeniyle karın ağrısı

- Yaralanma veya kolay kanama ile sonuçlanabilen beyaz kan hücrelerinde azalma ya da kan pulcuklarında azalma (trombositopeni), kırmızı kan hücrelerinde düşüklük (kansızlık)
- Hemogloblin (kırmızı kan hücresinde bulunan bir çeşit protein) azalması
- Serum bilirubin ( karaciğerin kırmızı kan hücrelerini parçalama işlemi sırasında ortaya çıkan sarımsı bir madde) ve karaciğer enzimlerinde artış
- Kandaki sodyum konsantrasyonlarında azalma
- Saç dökülmesi
- Deride ışığa karşı duyarlılık
- Cilt ve mukoza zarının ilaç ve enfeksiyonlara karşı aşırı şekilde reaksiyon gösterdiği nadir bir hastalık (Stevens-Johnson Sendromu)
- Alerjik (anafilaktik) reaksiyon
- Beyin kan akımının kısa ya da uzun süreli yetersizliği veya beyindeki bir damarın kanaması sonucu ortaya çıkan bozukluk
- Aniden ayağa kalkınca tansiyonun düşmesi
- Bronşların (akciğer alt solunum yollarının) geçici olarak daralması
- Pankreatit (pankreas iltihabı)
- Koyu renkli idrar, mide bulantısı, kusma, kas krampları, kafa karışıklığı ve nöbetler. Bunlar, UADHS (uygunsuz antidiüretik hormon salınımı) adı verilen bir durumun belirtileri olabilir.
- Sedef hastalığı veya mevcut sedef hastalığının kötüleşmesi (gümüş rengi pullarla kaplı kırmızı lekelerle karakterize edilen cilt hastalığı)

ACUITEL, kanınızda belli değişikliklere neden olabilir. Eğer morarma, çok yorgun hissetme fark ederseniz veya şeker hastası iseniz ve şeker seviyelerinizin arttığını fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz. Bu durumda doktorunuz gerekirse kan testleri yaptırmanızı isteyebilir.

Bunlar ACUITEL'in hafif yan etkileridir.

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuza veya eczacınıza bildirin.*

#### Yan etkilerin raporlanması

Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri [www.titck.gov.tr](http://www.titck.gov.tr) sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi'ne (TÜFAM) bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

#### **5. ACUITEL'in saklanması**

*ACUITEL'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C'nin altında oda sıcaklığında saklayınız.*

**Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.**

*Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ACUITEL'i kullanmayınız.*

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz ACUITEL'i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

***Ruhsat Sahibi:*** Pfizer PFE İlaçları A.Ş. Muallim Naci Cad. No:55 34347 Ortaköy-İSTANBUL

***Üretim yeri:*** Pfizer İlaçları Ltd. Şti. Muallim Naci Cad. No:55 34347 Ortaköy-İSTANBUL

Bu kullanma talimatı ..... tarihinde onaylanmıştır.