

## KULLANMA TALİMATI

### CARDOVOL 50 mg tablet

Ağızdan alınır.

- **Etkin madde:** Her bir tablet 50 mg metoprolol tartarat içerir.
- **Yardımcı maddeler:** Mikrokrystalin selüloz, laktoz monohidrat (inek sütü kaynaklı), sodyum nişasta glikolat, polivinilprolidon (povidon), kolloidal silikon dioksit, magnezyum stearat içerir.

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

### **Bu Kullanma Talimatında:**

1. **CARDOVOL nedir ve ne için kullanılır?**
2. **CARDOVOL'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **CARDOVOL nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **CARDOVOL'un saklanması**

**Başlıkları yer almaktadır.**

## **1. CARDOVOL nedir ve ne için kullanılır?**

CARDOVOL tabletler, beyaz-beyazımsı renkli yuvarlak, bikonveks tabletlerdir.

Her bir tablet etkin madde olarak 50 mg metoprolol tartarat içerir.

CARDOVOL, 20 veya 30 adet tablet içeren ambalajlarda takdim edilmektedir.

CARDOVOL beta-blokörler olarak adlandırılan ilaç grubuna dahildir. Bu ilaçlar kan damarlarımızı gevşeterek toplardamarlarımızdaki (venlerinizdeki) kan basıncını düşürürler.

Bu ilaçlar çeşitli tıbbi sorunlarda kullanılırlar:

- Yüksek kan basıncının tedavi edilmesi için,
- Egzersiz ile tetiklenen göğüs ağrısı (angina) tedavisi için,
- Düzensiz kalp atımlarının düzeltilmesi ve kalbin düzenli atmaya devam etmesinin sağlanması için,
- Bir kalp krizi sonrasında kalbin korunmasına yardımcı olmak için,
- Tamamlayıcı tedavinin bir parçası olarak tiroid bezinin aşırı çalışmasının tedavi edilmesi için,
- Migrenin önlenmesi (bir baş ağrısı tipi) için,
- Sinirsel gerginlik ya da anksiyetenin neden olduğu çarpıntının tedavi edilmesi için.

CARDOVOL ile tedaviniz sırasında takip:

- Kalp rahatsızlığınız varsa, doktorunuz kan testi yapabilir ve kalp fonksiyonunuzu izleyebilir.
- Eğer kanınızda yüksek düzeyde şeker (diyabetiniz) varsa, doktorunuz düzenli olarak kanınızdaki şeker düzeyini kontrol edebilir.
- Eğer aşırı aktif bir tiroid beziniz varsa, doktorunuz düzenli olarak tiroid ve kalp fonksiyonlarınızı kontrol edebilir.
- Başka ilaçlar alıyorsanız ya da kısa zaman önce aldıysanız, doktorunuz bazı kan testleri yapabilir ve kalp fonksiyonunuzu izleyebilir.

CARDOVOL'un nasıl etki gösterdiği ya da neden verildiği hakkında herhangi bir sorunuz varsa doktorunuza danışınız.

## **2. CARDOVOL'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**

CARDOVOL size sadece bir doktor tarafından yazılabilir.

Doktorunuzun tüm talimatlarına – bu kullanma talimatındaki genel bilgilerden farklı olsalar bile dikkatle uyunuz.

## **CARDOVOL'u ařađıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ**

Eđer;

- Metoprolle, bu kullanma talimatının bařında sayılmıř CARDOVOL iindeki maddelerden herhangi birine ya da bir bařka beta bloköre karřı ařırı duyarlılıđımız (alerjiniz) varsa,
- Nefes darlıđı, sırt üstü yatarken solunum gçlüđü, bir kalp rahatsızlıđına iřaret eden, ayaklar ya da bacaklarda řiřme varsa,
- Dzensiz kalp atıřı varsa,
- Kalp atımınız ok yavařsa,
- Kalp krizine iřaret eden ani ve bulantıcı gđüs ađrısı varsa,
- Kol ve bacaklarındaki kan dolařımı ok zayıfsa (örneđin, ok sođuk, soluk el ve ayaklar, ya da yrdđünüzde bacak kaslarındaki ađrı),
- Kan basıncınız alıřılmadık ölçde dřkse,
- Adrenal bezlerin medullasında tedavi edilmemiř tmr (feokromasitom) varsa,
- Astımınız varsa ya da hırıltı veya ksrkle birlikte solunum gçlüđ yknz varsa,
- Eđer kardiyojenik řok olarak adlandırılan bir kalp bozukluđunun iřaretleri olan kan basıncında řiddetli dřme, bař dnmesi, hızlı kalp atıřı, hızlı ve yzeyssel solunum, sođuk ve nemli cildiniz varsa.

Eđer alerjik olduđunuzu dřnyorsanız, ltfen doktorunuzun nerisini alınız.

## **CARDOVOL'u ařađıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ**

Eđer;

- Kalp bozuklukları varsa,
- Kanda yksek řeker dzeyi (diyabetiniz) varsa,
- Karaciđer hastalıđımız varsa,
- Ciddi alerjik reaksiyonlar riski altında iseniz,
- İstirahat esnasında gđüs ađrınız varsa,
- Kol ve bacaklarındaki kan dolařımı zayıfsa (örneđin, ok sođuk, soluk el ve ayaklar, ya da yrdđünüzde bacak kaslarındaki ađrı),
- Adrenal bezlerin medullasında tmr (feokromasitom); CARDOVOL'a ek tedaviye gereksinim duyacaksınız,
- Ařırı alıřan bir tiroid beziniz varsa.
- CARDOVOL ile tedavi sırasında bir anesteziđin kullanılacađı bir ameliyat yapılacak ise,
- Astım gibi solunum hastalıklarınız varsa,

- Şiddetli konjunktivit, deri döküntüsü ve kulak enfeksiyonunu kapsayan işaretleri olan okülomukokutanöz sendrom olarak adlandırılan şiddetli sendromunuz varsa.

Durumunuz bunlardan herhangi birine uyuyorsa doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz CARDOVOL kullanmaya başlayıp başlayamayacağınıza/devam edip edemeyeceğinize karar verecektir.

- CARDOVOL ile tedavi sırasında spontan kanama ya da morarma fark ederseniz,
- CARDOVOL ile tedavi sırasında çok yavaş kalp atımınızı fark ederseniz,
- CARDOVOL ile tedavi sırasında sarı cilt ve gözler, mide bulantısı, iştah kaybı ve koyu idrar fark ederseniz,
- CARDOVOL ile tedavi sırasında düzensiz kalp atımı yaşarsanız,
- CARDOVOL ile tedavi sırasında nefes darlığı, sırt üstü yatınca solunum güçlüğü, ayaklar ya da bacaklarda şişme yaşarsanız,
- CARDOVOL ile tedavi sırasında halüsinasyonlar görürseniz.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

### **CARDOVOL'un yiyecek ve içecek ile kullanılması**

CARDOVOL tabletler çiğnenmeden bir bardak su ile yutulmalıdır.

Eğer size CARDOVOL'un aç ya da tok karnına alınması önerilmişse, bu durumda tedavi boyunca CARDOVOL'u aynı takvimi takip ederek almalısınız.

### **Hamilelik**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

Hamileyseniz bunu doktorunuza söyleyiniz. CARDOVOL çok gerekli olmadıkça gebelik süresince kullanılmamalıdır. Doktorunuz gebelik sırasında CARDOVOL kullanımının olası risklerini size açıklayacaktır.

Eğer hamile kalmayı planlıyorsanız, bunu doktorunuza söyleyiniz.

*Tedavi sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

### **Emzirme**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

Bebeğinizi emziriyorsanız bunu doktorunuza söyleyiniz. CARDOVOL emzirme döneminde dikkatle kullanılmalıdır.

### **Araç ve makine kullanımı**

CARDOVOL tedavisi sırasında baş dönmesi, yorgunluk ya da bulanık görme gibi durumlar yaşarsanız, araç ya da iş makineleri kullanmayınız ve tam dikkat ve hızlı tepki verebilmeyi gerektiren başka işler yapmayınız. Alkol alımı yorgunluğu arttırabilir.

### **CARDOVOL'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler**

CARDOVOL'un içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

CARDOVOL, laktoz monohidrat (inek sütü kaynaklı) içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

### **Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı**

Şu anda başka herhangi bir ilaç alıyorsanız ya da yakın zamanda aldıysanız –bitkisel ve reçetesiz ilaçlar da dahil olmak üzere – dozun değiştirilmesi ya da bazı durumlarda ilaçlardan birinin kesilmesi gerekebilir.

Bazı başka ilaçlar CARDOVOL ile etkileşime girebilir. Bunlardan bazıları:

- Yüksek kan basıncının tedavisinde kullanılan bazı diğer ilaçlar (ör. Prazosin, klonidin, verapamil, monoamin oksidaz inhibitörleri (MAO), diltiazem, hidralazin),
- Göğüs ağrısının tedavisinde kullanılan diğer bazı ilaçlar (angina) (ör. Nitrogliserin),
- Düzensiz kalp atımının tedavisinde kullanılan diğer bazı ilaçlar (ör. Amiodaron, propafenon, kinidin, disopiramid, tokainid, prokainamid, ajmalin, amiodaron, flekainid, digoksin gibi dijital glikozidler, lidokain),
- Cerrahi operasyonlar sırasında kullanılan anestezi ilaçları,
- Bazı göz ve burun damlaları ile bazı öksürük ilaçları ya da soğuk algınlığı ilaçlarının içinde bulunan adrenalin ya da benzeri maddeler,
- İnsülin ya da kandaki yüksek şeker (diyabet) düzeyini tedavi etmek için kullanılan ilaçlar,
- Ağrı ya da enflamasyonun hafifletilmesi için kullanılan bazı ilaçlar (COX-2 inhibitörleri gibi nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar),
- Bazı antibiyotikler (ör. Rifampisin),
- Bazı antiviraller (ör. Ritonavir),
- Saman nezlesinin tedavi edilmesi için kullanılan bazı antihistaminikler (ör. Difenhidramin),
- Sıtmanın tedavi edilmesi için kullanılan bazı ilaçlar (ör. Hidroksiklorokin ya da kinidin),

- Bazı antipsikotik ilaçlar (ör.-Tioridazin, klorpromazin, flufenazin, haloperidol),
- Bazı antidepresanlar (ör. Fluoksetin, paroksetin fluvoksamin, sertalin, klomipramin, desipramin ya da bupropion),
- Bazı antifungaller (ör. Terbinafin),
- Migren ağrılarının engellenmesi ve tedavisinde kullanılan bir ilaç sınıfı olan ergot alkaloidleri,
- Dipridamol, kan pıhtılaşması riskini azaltmak için kullanılan bir ilaç.

*Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

### **3. CARDOVOL nasıl kullanılır?**

#### **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:**

Doktorunuzun talimatlarına dikkatle uyunuz. Önerilen dozu aşmayınız.

Doktorunuz size tam olarak kaç tablet CARDOVOL almanız gerektiğini söyleyecektir.

Genelde günlük doz günde 100 ila 200 mg'dır. CARDOVOL günde bir kez (sabah) ya da iki ayrı doza bölünmüş olarak (sabah bir ve akşam bir) alınabilir. CARDOVOL tiroid bezinin aşırı çalışmasının tedavisinde kullanıldığında, doz genelde üç ya da dört ayrı doz şeklinde verilen 150 - 200 mg'dır. CARDOVOL düzensiz kalp atımının tedavisi için kullanıldığında, doz genelde iki ya da üç ayrı doz şeklinde verilen günde 100 - 150 mg'dır.

Tedaviye verdiğiniz yanıtı göre doktorunuz daha yüksek ya da daha düşük bir doz önerebilir.

#### **Uygulama yolu ve metodu:**

CARDOVOL tablet çiğnenmeden bütün olarak, bir bardak su ile yutulmalıdır.

Tabletlerinizi her gün aynı saatte almak onları ne zaman alacağınızı hatırlamada size yardımcı olacaktır.

#### **Değişik yaş grupları:**

##### **Çocuklarda kullanımı:**

CARDOVOL'un çocuklarda kullanımı önerilmez.

**Yaşlılarda kullanımı (>65 yaş):**

CARDOVOL 65 yaş üzerindeki kişilerce kullanılabilir. 65 yaşından büyükseniz; size doktorunuz dozu azaltmadıkça, diğer erişkinlerle aynı doz verilecektir.

**Özel kullanım durumları:****Böbrek yetmezliği:**

Böbrek yetmezliği olan hastalarda CARDOVOL için doz ayarlaması gerekli değildir.

**Karaciğer yetmezliği:**

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda CARDOVOL kan düzeyleri dikkate değer oranda artabilir. Dolayısıyla CARDOVOL dikkatli bir şekilde düşük dozlarda başlatılmalı ve klinik yanıtı göre aşamalı doz titrasyonu yapılmalıdır.

Doktorunuz size söylediği müddetçe CARDOVOL kullanmaya devam ediniz.

Doktorunuzla konuşmadan dozu değiştirmeyiniz ve tedaviyi bırakmayınız. CARDOVOL almayı çok ani keserseniz, durumunuz daha kötü olabilir. Doktorunuz tedaviyi tamamen kesmeden önce dozu yavaş yavaş azaltmanızı isteyebilir.

CARDOVOL'u ne kadar süre kullanacağınız ile ilgili sorularınız varsa, doktorunuz ya da eczacınızla konuşunuz.

*Eğer CARDOVOL'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.*

**Kullanmanız gerekenden daha fazla CARDOVOL kullandıysanız**

Kazayla çok fazla tablet alırsanız, hemen doktorunuzla konuşunuz. Tıbbi bakım görmeniz gerekebilir.

CARDOVOL doz aşımının bazı etkileri şunlardır: anormal derecede yavaş kalp atımı ya da düzensiz kalp atımı, çok düşük kan basıncı, nefes darlığı, sırt üstü yatınca solunum güçlüğü, ayaklarda şişme, bilinç kaybı, mide bulantısı, kusma, dudaklarda, dilde, ciltte mavi renk, nöbetler, ani ve bunalıcı göğüs ağrısı ve ölüm.

*CARDOVOL'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

## **CARDOVOL'u kullanmayı unutursanız**

Bir CARDOVOL dozunu almayı unutursanız, kaçırdığınız dozu hatırladığınızda hemen alınız. Ancak neredeyse bir sonraki dozun zamanı gelmişse, kaçırılan dozu atlayınız ve normal doz düzeninize geri dönünüz. Bu konuyla ilgili herhangi bir sorunuz varsa doktorunuza danışınız. *Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.*

## **CARDOVOL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler**

Doktorunuzun önerisini almadan CARDOVOL dozunu değiştirmeyin ya da ilacı bırakmayın. Eğer CARDOVOL almayı çok ani bırakırsanız, durumunuz bir süre daha da kötüleşebilir. Eğer tedaviyi durdurmanız gerekiyorsa, doktorunuz bunu nasıl yapacağınızı size söyleyecektir.

## **4. Olası yan etkiler nelerdir?**

Tüm ilaçlarda olduğu gibi, CARDOVOL ile tedavi sırasında bazı yan etkiler yaşayabilirsiniz; diğer yandan bu yan etkiler herkeste görülmeyebilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın	:10 hastanın en az 1'inde görülebilir.
Yaygın	:10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan	:100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek	:1.000 hastanın birinden az görülebilir.
Çok seyrek	:10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor	: Eldeki veriler ile belirlenemeyecek kadar az hastada görülebilir.

**Aşağıdakilerden biri olursa, CARDOVOL'u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.**

- Ürtiker (kurdeşen)
- Nefes almada güçlük
- Yüz, dudakların şişmesi ya da dilin veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin CARDOVOL'a karşı ciddi alerjiniz var demektir.

Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

CARDOVOL'u kullanırken aşağıdakilerden biri olursa ve devam ederse doktorunuza bildiriniz.



**Yaygın:**

- Çok yavaş kalp atımı.

**Seyrek:**

- Nefes darlığı, sırt üstü yatarken solunum güçlüğü, kalp bozukluklarına işaret eden ayaklarda ya da bacaklarda şişme,
- Raynaud sendromunun olası işaretleri olan, ayak parmaklarında ve el parmaklarında uyuşukluk ve soğukluk,
- Düzensiz kalp atımı.

**Çok seyrek:**

- Kanda düşük trombosit düzeyinin olası işaretleri olan spontan kanama ya da morarmalar (trombositopeni),
- Halüsinasyonlar,
- Karaciğer hastalığı hepatite işaret eden sarı cilt ve gözler, mide bulantısı, iştah kaybı, koyu idrar,
- Peniste ağrı ve anormal eğrilik,

Bunlardan herhangi birini görürseniz, hemen doktorunuzla konuşunuz.

**Yaygın:**

- Yorgunluk,
- Baş dönmesi,
- Baş ağrısı,
- Baş dönmesi ortostatik hipotansiyona işaret eden, ayağa kalkınca bayılma (kimi zaman bilinç kaybı ile birlikte),
- Nefes darlığı,
- Bulantı,
- Kusma,
- Mide ağrısı.

**Seyrek:**

- Kas krampları,
- Deri döküntüsü (kaşıntılı döküntü, kalınlaşmış kırmızı/gümüş renğinde deri bölgeleri; psoriyazis işaretleri),
- İshal,

- Kabızlık,
- Hırıltı ve öksürükle birlikte solunum güçlüğü (bronkospazm),
- Şişme,
- Çarpıntı,
- Uyanıklıkta azalma, uykululuk hali (somnolans) ya da uykusuzluk (insomnia),
- Parestezi işaretleri olan, uzuvlarda uyuşukluk, karıncalanma,
- Depresyon,
- Kabuslar.

### **Çok seyrek:**

- Kişilik değişikliği,
- Görme bozukluğu (örn., bulanık görme),
- Göz kuruması, göz tahrişi,
- Kulaklarda gürültüler (örn., ısıklık sesi),
- Önerilen değerleri aşan dozlarda duyma bozuklukları (örn., duymada azalma ya da duyma kaybı),
- Göğüs ağrısı,
- Daha önce şiddetli periferik dolaşım bozuklukları olan hastalarda kangren,
- Rinit işaretleri olan akıntılı ya da tıkalı burun, horlama,
- Ağız kuruması,
- Cildin güneşe duyarlılığının artması,
- Terlemede anormal artış,
- Saç kaybı,
- Psoriyazisin ağırlaşmasına işaret eden kalınlaşmış kırmızı/gümüş deri bölgelerinin kötüleşmesi,
- Artrit işaretleri olan eklem ağrısı ve katılığı,
- Cinsel arzuda değişiklik,
- Ereksiyona ulaşma ve ereksiyonu sürdürme yeteneğinde değişiklik,
- Kilo artışı,
- Anormal karaciğer fonksiyonu testi sonuçları,
- Bel ağrısı, böbrek bozukluğu, artmış kan basıncı, kan pıhtısı, böbrekleri, aortu, renal sistemi ve çeşitli yapıları kapsayan bir vücut bölümündeki (retroperitoneum olarak adlandırılmaktadır) fibröz dokunun çoğalmasının olası işaretleridir.

Bunlardan herhangi biri sizi ciddi olarak etkilerse, doktorunuza söyleyiniz.

**Bilinmiyor:**

- Zihin karışıklığı (konfüzyon),
- Anormal trigliserid kan değerleri,
- Anormal kolesterol kan değerleri,
- Ağrılı ereksiyon ile anormal penis kavisi (Peyronie hastalığı olarak bilinir),
- Retroperitoneal fibrozis (karın boşluğunu örten zarın arkasında anormal yara dokusunun meydana gelmesi). Bu sırt, kasık veya alt karın bölgesinde ağrı ile görülebilir,
- Hepatit (karaciğerde meydana gelen iltihabi reaksiyon).

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

**Yan etkilerin raporlanması**

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri [www.titck.gov.tr](http://www.titck.gov.tr) sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz.

Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

**5. CARDOVOL’un saklanması**

*CARDOVOL’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.*

**Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.**

*Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CARDOVOL’u kullanmayınız.*

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz *CARDOVOL’u kullanmayınız.*

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

***Ruhsat sahibi:*** World Medicine İlaç San. ve Tic. A.Ş.  
Bağcılar/İstanbul

***Üretim yeri:*** World Medicine İlaç San. ve Tic. A.Ş.  
Bağcılar/İstanbul

*Bu kullanma talimatı ..... tarihinde onaylanmıştır.*