

KULLANMA TALİMATI

EVİXOL 200 mg yumuşak kapsül

Ağızdan alınır.

- **Etkin madde:** Bir yumuşak kapsül 200 mg Vitamin E Asetat (dl-alfa tokoferil asetat) içermektedir.
- **Yardımcı maddeler:** Soya yağı, jelatin (sığır jelatini), gliserol, sodyum metil parahidroksibenzoat (E219), ponceau 4R.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlacınız hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

1. **EVİXOL nedir ve ne için kullanılır?**
2. **EVİXOL'ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **EVİXOL nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **EVİXOL'ün saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. EVİXOL nedir ve ne için kullanılır?

Oral kullanım için yumuşak kapsül. Berrak, açık sarı renkli çözelti içeren kırmızı renkli, şeffaf yuvarlak yumuşak kapsüllerdir.

EVİXOL, 30 adet yumuřak kapsül ieren HDPE řiřede takdim edilmektedir.

EVİXOL, vitamin E eksikliĐinin tedavisinde ve önlenmesinde antioksidan etkiden dolayı genel saĐlıĐın korunmasında kullanılır.

2. EVİXOL'ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

EVİXOL'ü ařaĐıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

EĐer;

- E vitaminine ya da ilacın bileřiminde bulunan diĐer bileřenlerden herhangi birine karřı ařırı duyarlılıĐınız (alerji) varsa,
- Gebelik ve emzirme döneminde (yalnızca doktor kontrolünde kullanılabilir)

EVİXOL'ü ařaĐıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

EĐer,

- Trombosit agregasyonu/hemostaz inhibitörleri (pıhtılařmayı engelleyiciler) kullanıyorsanız,
- Demir eksikliĐine baĐlı gözlenen kansızlık için demir ilaçları kullanıyorsanız,
- Antiasit (mide asidi giderici) ilaçlar kullanıyorsanız,
- AĐızdan alınan doĐum kontrol ilacı kullanıyorsanız,
- Pıhtılařma bozukluĐunuz varsa,
- Yüksek doz kan sulandırıcı ilaç kullanıyorsanız,
- A vitamini ya da K vitamini kullanıyorsanız,
- Kolestiramin, kolestipol, mineral yaĐ, sukralfat kullanıyorsanız (bu ilaçlar E vitamini emilimini azaltır.)
- Kemoterapi ve radyoterapi alıyorsanız.

Bu uyarılar, gemiřteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geerliyse lütfen doktorunuza danıřınız.

EVİXOL'ün yiyecek ve iecek ile kullanılması

EVİXOL, yiyecek ve ieceklerle beraber kullanılabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Doktorunuz tarafından gerekli testler yapıldıktan sonra önerilmediĐi sürece hamilelik döneminde EVİXOL kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doktorunuz tarafından önerilmedikçe emzirme döneminde EVİXOL kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanımına karşı herhangi bir olumsuz etkisi bulunmamaktadır.

EVİXOL'ün içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

EVİXOL, alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmeli) yol açabilecek sodyum metil parahidroksibenzoat içermektedir.

EVİXOL, alerjik reaksiyonlara yol açabilecek Ponceau 4R azo boyar maddesini içermektedir.

EVİXOL, soya yağı ihtiva eder. Eğer fıstık ya da soyaya alerjiniz varsa bu tıbbi ürünü kullanmayınız.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında EVİXOL'ün etkisi değişebilir. Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:

- Antikoagülan (kan pıhtılaşmasını önleyen) ilaçlar
- Trombolitik (kan damarlarındaki tehlikeli pıhtıların eritilerek damarların açılması için kullanılan) ilaçlar
- A vitamini ya da K vitamini içeren ilaçlar
- Demir ilaçları
- Kolestipol, kolestiramin (lipid düşürücü ilaçlar) içeren ilaçlar
- Kemoterapi ilaçları
- Ağızdan alınan doğum kontrol ilaçları

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. EVİXOL nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Günde 1-2 yumuşak kapsül alınır. Tedavi süresi hastalığa bağlı olarak değişir.

Uygulama yolu ve metodu:

Ağızdan alınır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanım:

Çocuklarda kullanılmaz.

Yaşlılarda kullanım:

Özel bir gereksinim yoktur.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Özel bir gereksinim yoktur.

Eğer EVİXOL'ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izlemınız var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla EVİXOL kullandıysanız:

EVİXOL'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

EVİXOL'ü kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

EVİXOL ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:

EVİXOL ile tedavi sonlandırıldığında herhangi bir olumsuz etki oluşmaz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, EVİXOL'ün içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Sıklıklar şu şekilde tanımlanmaktadır:

Çok yaygın: 10 hastanın en az 1'inde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek: 1000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek: 10000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Aşağıdakilerden biri olursa EVİXOL'ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Alerjik reaksiyonlar
- Alerjik ödem
- Anjiyoödem (en sık göz kapakları, ağız çevresi, el ve ayaklarda görülebilen ciltte yaygın ödem gelişmesi ile seyreden bir alerjik bir reaksiyon),
- Hırıltılı solunum
- Kızarıklık
- Döküntü.

"Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir." Eğer bunlardan sizde mevcut ise, sizin EVİXOL'e karşı ciddi alerjik reaksiyonunuz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

- Bulantı,
- Gaz
- İshal
- Karın ağrısı
- Döküntü
- Kaşıntı

Bunlar EVİXOL'ün hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etkileri Bildirimi" ikonuna tıklayarak

ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. EVİXOL'ün saklanması

EVİXOL'ü çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra EVİXOL'ü kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat Sahibi:

World Medicine İlaç San ve Tic A.Ş.
Bağcılar/İstanbul

Üretim yeri:

World Medicine İlaç San ve Tic A.Ş.
Bağcılar/İstanbul

Bu kullanma talimatı 15.03.2023 tarihinde onaylanmıştır.