

KULLANMA TALİMATI

MUCOSİS 50 mg/mL şurup

Ağızdan alınır.

- **Etkin madde:** Her ölçek (5 mL) 250 mg karbosistein içerir.
- **Yardımcı maddeler:** Sodyum benzoat (E-211), metil paraben (E-218), etil paraben (E-214), propil paraben (E-216), sükroz (sakkaroz), vanilin, karamel esansı, karamel (E-150), deiyonize su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

1. **MUCOSİS nedir ve ne için kullanılır?**
2. **MUCOSİS'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **MUCOSİS nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **MUCOSİS'in saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. MUCOSİS nedir ve ne için kullanılır?

MUCOSİS her ölçekte (5 ml) 250 mg karbosistein içeren bir şuruptur. 100 ml şurup içeren Tip II (işlem görmüş soda-kireç camı) renkli cam şişelerde piyasaya sunulmuştur.

-Bronş salgısının (balgamın) aşırı yoğunlaştığı solunum yolları hastalıklarında,

-Atılması gereken yoğun kıvamlı balgam oluşumuna neden olunabilen cerrahi müdahalelerde,

-Solunum yollarıyla (solunum yolu) ilgili sorunlar için kullanılır. Bu problemler çok fazla mukus yapıldığında veya mukus çok yapışkan olduğunda ortaya çıkar. Mukus (balgam) daha az yapışkan hale getirerek çalışır. Bu, mukusun atılmasını kolaylaştırır.

-Gerektiğinde bronkoskopi (bükülmez bir tüp aracılığıyla doğrudan doğruya soluk borusunu ve büyük bronşları muayene etmeye yarayan teknik), bronşial kataterizasyon (katater (sonda) ile bronşlardan sıvının dışarıya akıtılması) gibi tanı testleri öncesinde, bronşların (soluk borusundan ayrılan akciğerlere giden nefes boruları) temizliğinin sağlanması amacıyla esas tedavilere yardımcı olarak kullanılır.

2. MUCOSİS'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

MUCOSİS'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

- Karbosisteine ve/veya şurubun içerdiği diğer maddelere karşı alerjiniz varsa,
- Mide veya duodenum ülseriniz (bakteriler nedeniyle enfeksiyon meydana gelmesi ile oluşan bir ülser türü) varsa.

MUCOSİS'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

- Yaşlıysanız
- Emziriyorsanız
- Geçmişinizde yaşadığınız mide veya bağırsak ülseriniz varsa
- Mide kanamasına neden olduğu bilinen başka ilaçlar alıyorsanız

Astımı olan hastaların tedavileri esnasında bronkospazm (bronşlardadaralma) oluşabileceğinden dikkatli kullanılmalıdır. Belirtiler görülürse kullanılmamalıdır.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

MUCOSİS'in yiyecek ve iecek ile kullanılması

MUCOSİS yiyecek ve iecek ile birlikte kullanılabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Hamileliđin ilk  ayında kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduđunuz fark ederseniz hemen doktorunuza danıřınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Emzirme dneminde kullanılması tavsiye edilmez.

Emziriyorsanız veya emzirmeyi planlıyorsanız bu ilacı almadan nce doktorunuza danıřınız

Ara ve makine kullanımı

MUCOSİS'in ara ve makine kullanma yeteneđi zerinde etkisi yoktur veya ihmal edilebilir dzeydedir.

MUCOSİS'in ieriđinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında nemli bilgiler

MUCOSİS; metil paraben, etil paraben ve propil paraben ierir. Bu nedenle alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiř) neden olabilir.

MUCOSİS skroz (sakkaroz) ierir. Eđer daha nce doktorunuz tarafından bazı řekerlere karřı intoleransınız (dayanıksızlık, tahammlszlk) olduđu sylenmiřse bu tıbbi rn almadan nce doktorunuzla temasa geiniz.

Diđer ilalar ile birlikte kullanımı

Folkodin (opiat trevi ksrk kesici ila) ile geimsizdir. Folkodin ile karıřımı karbosisteinin kmesine neden olur. Opiat trevi bu tip bileřiklerle aynı anda kullanılmaması tavsiye edilir.

Eđer reeteli ya da reetesiz herhangi bir ilacı řu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız ltfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. MUCOSİS nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Yetişkinlerde: Günde 3 kez 2 ölçek

Uygulama yolu ve metodu:

Ağızdan alınır.

Değişik yaş grupları:**Çocuklarda kullanımı:**

12 yaş ve üzerindeki çocuklarda günde 3 kez 1 veya 2 ölçek hekimin önerisine göre.

12 yaşından küçük çocuklarda kullanılmaz.

Yaşlılarda kullanımı:

Yetişkinler için belirtilen doz kullanılır.

Özel kullanım durumları:**Böbrek yetmezliği:**

Yetişkinler için belirtilen doz kullanılır.

Karaciğer yetmezliği:

Yetişkinler için belirtilen doz kullanılır.

- Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.
- İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.
- Doktorunuz MUCOSİS ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz.

Eğer MUCOSİS'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla MUCOSİS kullandıysanız:

MUCOSİS'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla MUCOSİS kullanırsanız derhal doktorunuzla konuşunuz ya da hastanenin acil bölümüne gidiniz. İlaç kutusunu yanınıza alınız, doktor ne kullandığınızı bilmelidir. Eğer çok fazla MUCOSİS kullanmışsanız, mide rahatsızlığı yaşamanız muhtemeldir

(gastrointestinal hastalık).

MUCOSİS'i kullanmayı unutursanız:

Unuttuđunuz dozu hatırladıđınız en kısa zamanda alınız ve sonra önceki gibi devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

MUCOSİS ile tedavi sonlandırıldıđında oluşabilecek etkiler

MUCOSİS ile tedavi sonlandırıldıđında herhangi bir etki oluşmaz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, MUCOSİS'in içeriđinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiđi şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın:	10 hastanın en az 1'inde görülebilir.
Yaygın:	10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan:	100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek:	1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Çok seyrek:	10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor:	Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Aşağıdakilerden biri olursa, MUCOSİS'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Alerjik reaksiyon (kızarıklık, yutma ya da nefes alma problemleri, dudaklarda, yüzde, boğazda ve dilde şişme)
- Dudaklarınızın, gözlerinizin, ağzınızın, burnunuzun ve cinsel organlarınızın çevresi de dahil olmak üzere cildinizde kabarcıklar veya kanama. Ayrıca grip benzeri belirtiler ve ateşe de sahip olabilirsiniz. Bu, 'Stevens-Johnson sendromu' adı verilen hastalık olabilir.
- Kusmakta kan ya da siyah renkli dışkı

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir.

Eđer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin MUCOSİS'e karşı ciddi alerjiniz var demektir.

Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Diğer yan etkiler:

Bilinmiyor:

- Bulantı
- Kusma
- Epigastrik rahatsızlık (Karın üst orta bölgesinde yanma, basınç veya dolgunluk)
- İshal
- Gastrointestinal (Sindirim sisteminde) kanama
- Anafilaktik reaksiyonlar
- Alerjik deri döküntüsü ve belirgin ilaç döküntüsü
- Cilt kızarıklıkları ve alerjik cilt döküntüleri

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr adresinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. MUCOSİS’in saklanması

MUCOSİS’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra MUCOSİS’i kullanmayınız/ son kullanma tarihinden önce kullanınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz MUCOSİS’i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi gemiř veya kullanılmayan ilaları öpe atmayınız! evre,řehircilik ve İklim Deęiřiklięi Bakanlıęı'nca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat Sahibi: Drog-san İlaları San. ve Tic. A.ř.
Oęuzlar Mah. 1370. Sok. No: 7/3
06520 Balgat/ANKARA

Üretim Yeri: Drog-san İlaları San. ve Tic. A.ř.
Esenboęa Merkez Mah. ubuk Cad. No:31
06760 ubuk /ANKARA

Bu kullanma talimatı .../.../... tarihinde onaylanmıřtır.