

## KULLANMA TALİMATI

### KORTİLON-A orabase %0,1 merhem

Ağız içine uygulanır.

- **Etkin madde:** Her 1 gram merhem 1 mg (% 0,1) triamsinolon asetonid içermektedir.
- **Yardımcı maddeler:** Polietilen-mineral yağ, jelatin (balık derisi jelatini), pektin, karboksimetilselülöz sodyum

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

### **Bu Kullanma Talimatında:**

1. **KORTİLON-A nedir ve ne için kullanılır?**
2. **KORTİLON-A'yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **KORTİLON-A nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **KORTİLON-A'nın saklanması**

**Başlıkları yer almaktadır.**

### **1. KORTİLON-A nedir ve ne için kullanılır?**

KORTİLON-A 1 g merhemde 1 miligram triamsinolon asetonid içeren, 5 gramlık alüminyum tüplerde kullanıma sunulmaktadır.

KORTİLON-A, açık kahverengi, topaklardan ve yabancı maddelerden arı, homojen, yumuşak merhem görünümünde kütledir. Su ile karışınca yapışkan bir görünüm alır.

KORTİLON-A, kortikosteroidler olarak adlandırılan ve enflamasyonu azaltan bir ilaç grubuna dahildir. Etkin madde bir merhemin içerisinde ve ağız içerisindeki nemli bölgelere yapışarak koruyucu bir film tabaka oluşturur.

KORTİLON-A, ağızda takma diş ya da yaralanmalar sonucu oluşan yaraların, diş etlerindeki ağrı ve iltihaplanmanın tedavisinde kullanılır.

## **2. KORTİLON-A'yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**

### **KORTİLON-A'yı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ**

Eğer,

- Triamsinolon asetonid veya KORTİLON-A'nın bileşimindeki herhangi bir maddeye veya benzer bir ilaç grubuna karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa,
- Deri tüberkülozunuz varsa,
- Özellikle *varisella* (suçiçeği) veya *Herpes Simplex* (uçuk) içeren viral (virüs kaynaklı) bir deri enfeksiyonunuz varsa,
- Derinizde mantar ya da bakteriyel bir enfeksiyon varsa (doktorunuz antifungal veya antibiyotik ile tedavi etmediği takdirde).

### **KORTİLON-A'yı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:**

Eğer,

- Ülser veya şeker hastalığınız (diyabetiniz) varsa.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

### **KORTİLON-A'nın yiyecek ve içecek ile kullanılması**

KORTİLON-A'nın yiyecek ve içecek ile etkileşimi yoktur; ancak ağız içine uygulandığından dolayı yemeklerden sonra kullanılması önerilmektedir.

### **Hamilelik**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

Hamile iseniz; KORTİLON-A'yı ancak doktorunuz kesin gereklilik olduğuna karar verirse kullanabilirsiniz.

*Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.*

### **Emzirme**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

Eğer emziriyorsanız; KORTİLON-A'yı ancak doktorunuz kesin gereklilik olduğuna karar verirse kullanabilirsiniz.

### **Araç ve makine kullanımı**

KORTİLON-A önerilen dozlarda uygulandığında araç ve makine kullanma yeteneğinizi etkilemez.

### **KORTİLON-A'nın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler**

Uyarı gerektiren yardımcı madde bulunmamaktadır.

### **Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı:**

Bilinen bir etkileşimi yoktur.

*Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

### **3. KORTİLON-A nasıl kullanılır?**

#### **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:**

Doktorunuz tedavi edilmesini söylediği bölgeyi ince bir tabaka ile kaplamaya yetecek miktarda kullanınız. Yatmadan önce günde iki veya üç kez, tercihen yemeklerden sonra uygulayınız.

#### **Uygulama yolu ve metodu:**

Kapağı kaldırınız. Ağızınızda tedavi edilecek kısmı kurulaştırınız ve az bir miktar, kuru ve temiz parmağınız ile üzerine yayınız. Ovmayınız. Ağızda kalım süresini artırması açısından yemeklerden sonra kullanınız. KORTİLON-A uyguladıktan hemen sonra bir şey yemekten veya içmekten kaçınınız.

Doktorunuzun veya diş hekiminiz merhemi ne kadar süre ile kullanmanız gerektiğini söyleyecektir. Bir kürlük tedavi sonrasında hastalık belirtileri devam ediyorsa doktorunuza veya diş hekiminizi bilgilendiriniz.

#### **Değişik yaş grupları**

KORTİLON-A'yı yetişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da doktorunuz veya diş hekiminiz tarafından önerildiğinden fazla kullanmayınız. Çocuklarda beş günden fazla kullanmayınız.

KORTİLON-A'nın, süt çocuğu ve küçük çocuklarda zorunlu kalınmadıkça kullanımı önerilmemektedir.

#### **Özel kullanım durumları**

Özel kullanım durumu yoktur.

*Eğer KORTİLON-A'nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuza veya eczacınıza ile konuşunuz.*

#### **KORTİLON-A'yı kullanmayı unutursanız:**

KORTİLON-A'yı kullanmayı unutursanız mümkün olan en kısa sürede atlanan dozu uygulayınız.

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.*

#### **KORTİLON-A ile tedavi sonlandığındaki oluşabilecek etkiler:**

Tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler bilinmemektedir.

#### 4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, KORTİLON-A'nın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Uzun kullanıma bağlı olarak sistemik olarak emilebilir. Yan etkiler genellikle bebeklerde (0-1 yaş), çocuklarda ve takma diş üzerine uygulamada meydana gelir.

**Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:**

- Ülserin aktifleşmesi
- Glukoz ve protein metabolizmasında değişiklikler
- Adrenal supresyon (hormon üretiminde azalma)

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Bu yan etkiler genellikle geri dönüşümlüdür ve tedavi kesildiğinde kaybolur.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür. Bu yan etkiler uzun süreli uygulama sonucunda görülebilir ve genellikle kalıcı değildir. Tedavi kesildiğinde kaybolur.

Yan etkileri değerlendirirken aşağıdaki sıklık sıralaması kullanılır.

Çok yaygın	: 10 hastadan 1'ini etkiler
Yaygın	: 100 hastadan 1 ila 10'unu etkiler
Yaygın olmayan	: 1.000 hastadan 1 ila 10'unu etkiler
Seyrek	: 10.000 hastadan 1 ila 10'unu etkiler
Çok seyrek	: 10.000 hastada 1'den daha azını etkiler
Bilinmiyor	: Eldeki mevcut verilere göre sıklığı tahmin edilemeyen

Kortikosteroid içeren dental merhemlerde aşağıdaki lokal reaksiyonlar oluşur:

Bilinmiyor: Yanma, kaşıntı, iritasyon, kuruluk, tedaviden önce olmayan dökülme, perioral dermatit (ağız kenarında sivilce benzeri oluşumlar ve soyulmayla kendini gösteren bir tür deri hastalığı), alerjik temas dermatiti, oral mukoza maserasyonu (ağız mukozasında yumuşama), sekonder (ikincil) enfeksiyon ve oral mukoza atrofisi (ağız mukozasında incelleme).

#### Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri [www.titck.gov.tr](http://www.titck.gov.tr) sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

## **5. KORTİLON-A'nın saklanması**

*KORTİLON-A'yı çocukların göremeyeceđi, erişemeyeceđi yerlerde ve ambalajında saklayınız.*

25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Radyatörün yanında, pencere kenarında veya banyoda muhafaza etmeyin.

Kullandıktan sonra tüpün kapađını sıkıca kapattığınızdan emin olun.

### **Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.**

*Etiketin veya ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra KORTİLON-A'yı kullanmayınız.*

“Son Kullanma Tarihi” belirtilen ayın son günüdür.

Eđer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz KORTİLON-A'yı kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

### ***Ruhsat sahibi:***

Saba İlaç San. ve Tic. A.Ş.  
Küçükçekmece/İSTANBUL  
Tel: 0212 692 92 92  
Faks: 0212 697 00 24  
E-mail: saba@sabailac.com.tr

### ***Üretim yeri:***

Deva Holding A.Ş.  
Kapaklı/TEKİRDAĞ

*Bu kullanma talimatı .../.../... tarihinde onaylanmıştır.*