

## KULLANMA TALİMATI

### ALVENO<sub>AC</sub> 10ml IV enjeksiyonluk çözelti hazırlamak için toz ve çözücü

Damar içine uygulanır.

#### Steril ve apirojen

- **Etkin madde:**

*Androctonus crassicauda*  $\geq 100$  LD50 NU/Flakon akrep venomuna karşın immünoglobulin F(ab')<sub>2</sub> fragmentleri (at kökenli)

Her ml'si en fazla 100 mg protein içermektedir. (< 100 mg/ml)

- **Yardımcı madde:** Sodyum klorür, hidroklorik asit, sodyum hidroksit ve enjeksiyonluk su

***Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.***

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

#### **Bu Kullanma Talimatında:**

1. ***ALVENO<sub>AC</sub> nedir ve ne için kullanılır?***
2. ***ALVENO<sub>AC</sub> kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler***
3. ***ALVENO<sub>AC</sub> nasıl kullanılır?***
4. ***Olası yan etkiler nelerdir?***
5. ***ALVENO<sub>AC</sub>'ın saklanması*** Başlıkları yer almaktadır.

#### **1. ALVENO<sub>AC</sub> nedir ve ne için kullanılır?**

ALVENO<sub>AC</sub>, en zehirli akrep türlerinden biri olan *Androctonus crassicauda* venomlarının bir karışımıyla aşılanmış (immunize edilmiş) İngiliz-Arap atlarının serumlarından elde edilmiştir. Her flakon en az 100 nötralizasyon ünitesine ( $\geq 100$  LD50 NU/Flakon) karşılık gelen *Androctonus*

*crassicauda* akrep zehrine (venomuna) karşın immünoglobulin F(ab')<sub>2</sub> fragmentleri (at kökenli) içermektedir.

ALVENO<sub>AC</sub>, damar içine enjeksiyon için uygun olan, 10 mL enjeksiyonluk çözelti hazırlığı için toz içeren flakondur.

ALVENO<sub>AC</sub> beyaz ila kırık beyaz renginde, kek yapısına sahip liyofilize tozdur. Cam flakonlarda takdim edilir. Her bir karton kutuda 1 adet flakon ve çözücü olarak 10 ml'lik %0.9 NaCl izotonik çözeltisi içeren 1 adet ampul bulunmaktadır.

Akrep sokmalarının neden olduğu belirtilerin önlenmesi için kullanılır.

## **2. ALVENO<sub>AC</sub>' ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**

### **ALVENO<sub>AC</sub>' ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ**

Eğer:

- ALVENO<sub>AC</sub>'ın bileşiminde bulunan etkin maddelerin veya yardımcı maddelerin herhangi birine ya da at kökenli menşeli heterolog proteinlere karşı aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) varsa kullanmayınız.
- Daha önceden serum hastalığınız (Tip III aşırı duyarlılık reaksiyonu) gelişmiş ise (proteinlerden dolayı antiserum kullandıktan 6-10 gün sonra ateşlenme, eklem ağrısı, bulantı, kusma veya deri döküntüleri gibi şikayetlerin ortaya çıkması) ALVENO<sub>AC</sub>'ı kullanmayınız.

### **ALVENO<sub>AC</sub>' ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLE KULLANINIZ:**

Eğer:

- Önceden at proteinlerine maruz kalınmış ve herhangi bir alerjik reaksiyon meydana gelmişse,
- Astım ve bebekken başlayan iltihaplı cilt hastalığı (infantil egzama) gibi alerjik durumlarda dikkatli kullanınız.
- ALVENO<sub>AC</sub> at plazmasından elde edilmiştir. Bu nedenle enfeksiyon yapıcı ajanların (örn; virüsler) bulaşma riski olabilir.

**Virüs güvenlik uyarısı:**

**ALVENO<sub>AC</sub>, at kanı bileşenlerinden elde edilmektedir. Hayvansal kan veya plazmadan hazırlanan tıbbi ürünlerin kullanımından kaynaklanan enfeksiyonları önlemek için standart önlemler arasında donörlerin seçimi, belirli enfeksiyon belirteçleri için bireysel bağışlar, plazma havuzlarının taranması ve virüslerin etkisiz hale getirilmesi/uzaklaştırılması için etkili üretim adımlarının izlenmesi gerekir. Buna rağmen, hayvan kanından veya plazmasından hazırlanan tıbbi ürünler uygulandığında, henüz bilinmeyen enfeksiyon yapıcı ajanların ve virüslerin bu ürünlerin içerisinde bulunma ihtimali mevcuttur.**

Hastalar açısından ALVENO<sub>AC</sub> her uygulandığında, hastayla ürünü seri numarası arasındaki bağlantının korunabilmesi için, ürünün adı ve seri numarası kaydedilmelidir.

ALVENO<sub>AC</sub>'ın uygulanmasından 6-10 gün sonra seyrek olarak serum hastalığı (ateşlenme, eklem ağrısı, bulantı, kusma veya deri döküntüleri gibi şikayetler) görülebilir. Bu durumun meydana gelmemesi için ilacın kullanımı esnasında doktorunuz tarafından gerekli önlemler alınır.

Bu tür durumlarda doktorunuz ALVENO<sub>AC</sub>'ın kullanılıp kullanılmayacağına karar verecektir.

*Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.*

**ALVENO<sub>AC</sub> kullanımı öncesinde**

Yüksek derecede saflaştırılmış olmasına rağmen, ALVENO<sub>AC</sub> uygulamasından önce sağlık personeli tarafından bir cilt testi yapılması önerilir. Testin sonucunun pozitif olması, serum tedavisinin uygulanamayacağına dair geçerli bir neden değildir, fakat uyarı olarak dikkate alınmalıdır. Böyle bir durumda ALVENO<sub>AC</sub>, yararın, anafilaktik şokun (ani başlayan ve ölüme neden olabilen ciddi bir alerjik reaksiyon) üstesinden gelebileceğinden emin olunursa uygulanmalıdır. Negatif test sonucu aniden oluşabilecek alerjik tipte bir reaksiyonun olmayacağını garanti edemez. Testin yapılıp yapılmayacağına ve bu testin uygulama zamanına yönelik karar doktor tarafından hastanın genel durumu ve hayati riski göz önünde bulundurularak verilir.

**ALVENO<sub>AC</sub>'ın yiyecek ve içecek ile kullanılması**

Uygulama yolu (damar içi yoluyla) nedeniyle yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

## **Hamilelik**

*Bu antiserumu kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

ALVENO<sub>AC</sub>'ın hamilelerde kullanımına ilişkin güvenliliği klinik çalışmalarda kanıtlanmamıştır. İnsanlara yönelik potansiyel bir risk bilinmemektedir.

*Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

## **Emzirme**

*Bu antiserumu kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

ALVENO<sub>AC</sub> 'ın anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir ve bu yüzden dikkatle kullanılmalıdır.

## **Araç ve makine kullanımı**

ALVENO<sub>AC</sub>'ın araç ve makine kullanımına etkisi üzerine yapılmış herhangi bir çalışma bulunmamaktadır.

Eğer ALVENO<sub>AC</sub> kullandıysanız araç ve makine kullanırken dikkatli olunuz.

## **ALVENO<sub>AC</sub>' ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler**

ALVENO<sub>AC</sub> akrep sokmalarına karşı saflaştırılmış (pürifiye) ve konsantre panzehirin (antiserum) her bir flakonu 45 mg/ml'den daha az sodyum içerir. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

## **Diğer ilaçlar ile ALVENO<sub>AC</sub>'ın birlikte kullanımı**

Diğer ilaçlarla herhangi bir etkileşim bildirilmemiştir.

*Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza ve eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

## **3. ALVENO<sub>AC</sub> nasıl kullanılır?**

### **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:**

Doktorunuz durumunuza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

**Uygulama yolu ve metodu:**

Bu antiserum sađlık personeli tarafından uygulanacaktır, kendi başınıza kullanmayınız.  
ALVENO<sub>AC</sub> doktorunuzun önerisi ile damar içine uygulanır.

**Deđişik yaş grupları:****Çocuklarda kullanımı:**

Çocuklar akrep zehrinden daha fazla etkilenirler. Bu sebeple vakanın ciddiyetine ve akrep sokmasından sonra geçen süreye bađlı olarak uygulanacak antiserumun miktarına doktor tarafından hastanın genel durumu ve hayati riski göz önünde bulundurularak karar verilir.

**Yaşlılarda kullanımı:**

65 yaşın üzerindeki hastalar akrep zehrinden daha fazla etkilenirler. Bu sebeple vakanın ciddiyetine ve akrep sokmasından sonra geçen süreye bađlı olarak uygulanacak antiserumun miktarı miktarına doktor tarafından hastanın genel durumu ve hayati riski göz önünde bulundurularak karar verilir.

**Özel kullanım durumları:****Böbrek/Karaciđer yetmezliđi:**

ALVENO<sub>AC</sub>'ın böbrek/karaciđer yetmezliđi olan hastalardaki etkililik ve güvenliliđi ile ilgili yeterli veri bulunmamaktadır.

*Eđer ALVENO<sub>AC</sub>'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduđuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.*

**Kullanmanız gerekenden fazla ALVENO<sub>AC</sub> kullandıysanız:**

Dozaj programı, durumunuza göre doktorunuz tarafından ayarlanacaktır.

ALVENO<sub>AC</sub>'ın size fazla dozda uygulandıđını düşünüyorsanız doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

**Eđer ALVENO<sub>AC</sub> kullanmayı unutursanız:**

Bu antiserum, hastanede doktorunuz veya deneyimli bir sađlık personeli tarafından uygulanacağından, uygulama zamanı için doktorun talimatına uymanız önemlidir.

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.*

### **ALVENO<sub>AC</sub> ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:**

ALVENO<sub>AC</sub>'ın uygulanmasından 6-10 gün sonra serum hastalığı (ateşlenme, eklem ağrısı, bulantı, kusma veya deri döküntüleri gibi şikayetler) görülebilir. Bu nedenle tedavi sonrası hastaya, hekim tarafından 10 günlük bir takip süreci başlatılır.

### **4. Olası yan etkiler nelerdir?**

Tüm ilaçlar gibi, ALVENO<sub>AC</sub> içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

**Aşağıdakilerden biri olursa, ALVENO<sub>AC</sub>' ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.**

- Alerjik reaksiyonlar [kan basıncının düşmesi (hipotansiyon), nefes darlığı, deri döküntüsü (ürtiker), şok]
- Serum hastalığı [antiserum uygulamasından sonra 6-10 gün içerisinde oluşabilen ateşlenme, eklem ağrısı, bulantı, kusma, deri döküntüsü (ürtiker)]

Bunları hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin ALVENO<sub>AC</sub>' a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

### **Yaygın görülen yan etkiler**

- Mide bulantısı ( $\geq$  %2)
- Kusma ( $\geq$  %2)
- Diyare ( $\geq$  %2)
- Deri döküntüsü ( $\geq$  %2)
- Kaşıntı ( $\geq$  %2)
- Ateş ( $\geq$  %2)
- Üşüme ( $\geq$  %2)

- Bař ađrısı ( $\geq \%2$ )
- Yorgunluk ( $\geq \%2$ )
- Ařırı uyku hali
- Rinore (beyin omurilik sıvısının burun ve etrafındaki sinüs boşluklarına sızması) • Enjeksiyon bölgesinde ađrı, şiřlik, ödem ( $\geq \%2$ )

### **Seyrek görölen yan etkiler**

- Lenfadenopati (lenf bezlerinin şiřerek anormal büyüklüđe ulaşması)
- Nevrit (sinir iltihabı)
- Üveit (gözün içindeki damar tabakanın (uvea) iltihabı)
- Miyokardit (kalp kası iltihabı)
- Vaskülit (kan damarlarının iltihabı)
- Dispne (nefes darlığı)
- Poliartrit (eklemlerde meydana gelen iltihaplanma)
- Miyalji (kas ađrısı)
- Nefrit (böbrek iltihabı)

*Eđer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

### **Yan etkilerin raporlanması**

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz; eczacınız veya hemřireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılařtığınız yan etkileri [www.titck.gov.tr](http://www.titck.gov.tr) sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliđi hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sađlamıř olacaksınız.

### **5. ALVENO<sub>AC</sub>'ın saklanması**

ALVENO<sub>AC</sub> 'ı çocukların göremeyeceđi, erişemeyeceđi yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C' nin altındaki oda sıcaklığında ıřıktan koruyarak saklanmalıdır.

**Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.**

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ALVENO<sub>AC</sub>' ı kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz ALVENO<sub>AC</sub>' ı kullanmayınız. Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

***Ruhsat Sahibi:***

Albila Serum Biyolojik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Cumhuriyet Mh. İncirliçede Cd. Anthill Rezidans B Blok 6-1/41

Şişli/İSTANBUL

Telefon:0536 510 34 88

[www.albila.com](http://www.albila.com)

***Üretim Yeri:***

İdol İlaç Dolum Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Davutpaşa Cd. Cebe Ali Bey Sk No:20

Zeytinburnu/ İSTANBUL

Telefon: 0 212 449 00 00

[www.idolilac.com](http://www.idolilac.com)

*Bu kullanma talimatı 11/11/2019 tarihinde onaylanmıştır.*

---



## **AŐAĐIDAKİ BİLGİLER BU İLACI UYGULAYACAK OLAN SAĐLIK PERSONELİ İÇİNDİR.**

- Akrep sokmasına karŐı antiserum olarak kullanılacak ALVENO<sub>AC</sub> ticari isimli ŐrŐn intravenŐz yolla uygulanır.
- Őiddetli zehirlenmelerde, akrep sokmasının Őzerinden uzun zaman geĀen durumlarda ve hayati risk iĀeren durumlarda, antiserum intravenŐz yolla yavaŐa uygulanmalıdır.
- Āocukların bađıŐıklık sistemi henŐz tamamlanmadıđı ve dolayısıyla da zehrin vŐcuttan atılma kapasitesi (daha uzun biyolojik yarı ŐmŐr) sađlıklı bir eriŐkine gŐre daha fazla olduđundan antiserum tedavisi mŐmkŐn olduđunca Āabuk baŐlatılmalıdır. Uygulanacak antiserumun doz deđerlendirmesi, hastanın yaŐına bakılmaksızın, yetiŐkinlerdeki gibi yapılmalıdır. 65 yaŐın Őzerindeki akrep zehrinden daha fazla etkilenebilecek olan hastalarda da bu durum geĀerlidir.
- Zehirlenmenin Őiddetine gŐre antiserumun baŐlangıĀ dozu 1-3 vial olup, uygulanmasından sonra hasta 1 saat gŐzlemlenir. Gerekli olduđu durumlarda ek antiserum dozları her 30/60 dakikada bir intravenŐz yolla 1 flakon olarak uygulanır.
- Olası bir alerjik ya da anafilaktik Őok durumuna karŐın antiserum uygulamasından Őnce tŐm hastalar iĀin adrenalin hazır bulundurulmalıdır.