

KULLANMA TALİMATI

EUCARBON® tablet

Ağızdan alınır.

- **Etkin madde:** Her tablette, 180 mg bitkisel kömür, 50 mg kükürt, 105 mg sinameki yaprağı tozu, 25 mg ışgın ekstresi bulunur.
- **Yardımcı maddeler:** Kaolin, talk, gliserin, mısır nişastası, koloidal silikon dioksit, nane esansı ve rezene esansı.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

1. **EUCARBON® nedir ve ne için kullanılır?**
2. **EUCARBON®'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **EUCARBON® nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **EUCARBON®'un saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. EUCARBON® nedir ve ne için kullanılır?

EUCARBON®'un içeriğinde bulunan etkin maddeler sadece bitki ve mineral kökenlidir ve sindirim düzenleyici ve hafif laksatif (feçesi yumuşatarak atılmasını kolaylaştıran) etkiye sahiptir. Bitkisel kömür, sinameki yapraklarının ve ışgın ekstresinin laksatif etkisiyle sonradan salgılanan çeşitli zararlı metabolik maddelerin etkisini azaltma yeteneğine sahiptir. Kükürt ayrıca sindirim sisteminde hafif bir dezenfektan etki de göstermektedir.

EUCARBON®'un hafif laksatif etkisi uygulamadan 8-10 saat sonra ortaya çıkmaktadır.

İrritabl barsak sendromu diye adlandırılan kabızlık, barsak ve karında rahatsızlık ile seyreden durumdan yakınan az sayıdaki hastada EUCARBON® olumlu sonuçlar göstermiştir.

- EUCARBON®, 100 tabletten oluşan blister ambalajlarda sunulur. Tabletler, mat, grimsi siyah, hafif nane kokulu, hafif tatlı ve her iki tarafı bombeli tabletler şeklindedir
- EUCARBON®, aşağıdaki durumların tedavisinde kullanılır:
 - Barsak geçişinin yavaşlaması,
 - Barsak tıkanmasıyla seyreden durumlar hariç kabızlığın tüm formları,
 - İnce barsaktaki parçalanma ve fermentasyon süreci,

- Meteorizm (karın ve barsaklarda gaz varlığı)
- Şişkinlik,
- İntestinal oto-intoksikasyon (barsaklarda kalan atıklara bağlı olarak görülen zehirlenme),
- Hemoroidal (basura bağlı olarak gelişen) kabızlık.

2. EUCARBON®'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

EUCARBON®'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

- Eğer EUCARBON®'un herhangi bir bileşenine karşı aşırı duyarlıysanız,
- Barsak tıkanıklığınız varsa,
- Akut yangılı barsak hastalığınız varsa,
- Kökeni bilinmeyen karın ağrınız varsa,
- Ciddi su ve elektrolit dengesi bozukluğunuz varsa,
- Şüpheli mide veya barsak ülseriniz varsa,
- Apandisitte,
- Hamilelikte ve süt verme döneminde,
- 12 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.

EUCARBON®'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

- Güvenli bir etki elde edilmesi için gereken doz bireyler arasında değişkenlik gösterebilir.
- İshal ortaya çıkmasının bir doz aşımı belirtisi olduğunu göz önünde bulundurunuz.
- Doktorunuzun talimatı olmaksızın 1-2 haftadan daha uzun bir süre boyunca kullanmayınız.
- Zayıflatıcı bir ajan olarak kullanmayınız.
- 14 günden daha uzun süreli kesintisiz uygulama durumunda ilacın etkisi azalabilir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

EUCARBON®'un yiyecek ve içecek ile kullanılması

EUCARBON® yemek sırasında veya yemekten sonra alınabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

EUCARBON®, hamilelik dönemi boyunca kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

EUCARBON®, emzirme dönemi boyunca kullanılmamalıdır.

Araç ve makine kullanımı

EUCARBON®'un araç veya makine kullanma yeteneği üzerinde bilinen bir etkisi yoktur.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

- EUCARBON® kullanımına baęlı bir hipopotasemi (kanda potasyum seviyesi dūřüklüęü) ortaya çıktığında, kalp glikozidlerinin etkisi artmaktadır.
- EUCARBON®, barsaktan geçiři hızlandırdığından birlikte kullanılan ve barsaklardan emilen ilaların emilimini azaltabilir.

Eęer reeteli ya da reetesiz herhangi bir ilacı řu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. EUCARBON® nasıl kullanılır?

• Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Eriřkinler ve 12 yařından büyük çocuklarda: Hafif bir laksatif ve purgatif (feesin sulu kalmasını saęlayarak hızlı bir řekilde atılmasına neden olan) etki elde edilmesi için günde 3 defaya kadar 1-2 tablet kullanılır. Daha güçlü bir laksatif etki isteniyorsa akřam uygulanan doz 3-4 tablet EUCARBON® řeklinde artırılabilir. Günde 8 tablettten fazla alınmamalıdır.

Sindirim sistemindeki gazın eliminasyonu ve güçlü bir temizlenme için (örneğin; röntgen, ilalı böbrek filmi v.b. tetkiklerden önce): Akřam alınan 6-8 tablet EUCARBON®'dan sonra bol miktarda sıvı alınmalıdır.

Uzun dönemli, kesintisiz kullanımı sonucunda etkide bir azalma ortaya çıkabilir.

Doktorunuz EUCARBON® ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir.

- **Uygulama yolu ve metodu:** Tabletler, yemek sırasında ya da yemekten sonra bol miktarda sıvı ile alınmalıdır.

• Deęişik yař grupları

Çocuklarda kullanımı: 12 yařından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yařlılarda kullanımı: Yařlı hastalarda kullanımına iliřkin özel bir durum bulunmamaktadır.

• Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezlięi: Böbrek yetmezlięi olan hastalarda özel bir kullanımı yoktur.

Karacięer yetmezlięi: Karacięer yetmezlięi olan hastalarda özel bir kullanımı yoktur.

Eęer EUCARBON®'un etkisinin çok güçlü ya da zayıf olduęuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuřunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla EUCARBON® kullandıysanız

Ařırı doz durumunda oluřabilecek bařlıca belirti ishaldir. Bu durumda ila bırakılmalı veya dozaj azaltılmalıdır.

EUCARBON®'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuřunuz.

EUCARBON®'u kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

EUCARBON® ile tedavi sonlandırıldığında oluřabilecek etkiler

Veri yoktur.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, EUCARBON®'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa EUCARBON®'u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

- Deride yaygın kaşıntı ve döküntülerle beraber, dudakta, yüzde, boğazda ve dilde şişme, yutma veya nefes alma güçlüğü (aşırı duyarlılık-anafilaksi)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin EUCARBON®'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz

- Önerilen dozda kullanıldığında yan etkiler çok nadirdir (karın ağrısı ve ishal görülebilir),
- Alkali reaksiyonda, zaman zaman idrarın soluk kırmızı bir renk aldığı gözlenebilir ve bu durum klinik açıdan anlamlı değildir,
- Çok seyrek olarak bulantı veya kusma görülebilir. Bu durum, doz aşımının bir belirtisi olabilir.
- Uzun bir süre boyunca yüksek dozlarda kullanıldığı zaman, başta potasyum olmak üzere, elektrolit kayıpları ortaya çıkabilir ve bu da barsak geçişindeki yavaşlamayı daha da artırabilir (barsak hareketlerinin kaybı ve kabızlık).

Bunlar EUCARBON®'un hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuza veya eczacınıza bilgilendiriniz.

5. EUCARBON®'un saklanması

EUCARBON®'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 30 °C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Kutu üzerinde yazılı olan son kullanma tarihinden sonra EUCARBON®'u kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi: F. Trenka - Chem.Pharm Fabrik Viyana lisansı ile Santa Farma İlaç Sanayii A.Ş.

Okmeydanı, Boruçiçeği Sokak, No: 16 34382 Şişli-İSTANBUL

Tel: (+90 212) 220 64 00

Fax: (+90 212) 222 57 59

Üretim Yeri: Santa Farma İlaç Sanayii A.Ş.

Sofalıçeşme Sokak, No: 72-74 34091 Edirnekapı-İSTANBUL

Tel: (+90 212) 534 79 00

Fax: (+90 212) 521 06 44

Bu kullanma talimatı 28.02.2012 tarihinde onaylanmıştır.