

KULLANMA TALİMATI

SOLCOSERYL® Adheziv Diş Patı

Ağız boşluğunda ve dişeti üzerine uygulanır.

- **Etkin maddeler:** 1 g adheziv diş patı, 2.125 mg solkoseril ve 10.000 mg polidokanol 600 içerir.
- **Yardımcı maddeler:** Metilhidroksibenzoat, propilhidroksibenzoat, nane yağı, mentol, sodyum karboksimetilselüloz, yarı katı baz

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında;

1. *SOLCOSERYL nedir ve ne için kullanılır?*
2. *SOLCOSERYL'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler*
3. *SOLCOSERYL nasıl kullanılır?*
4. *Olası yan etkiler nelerdir?*
5. *SOLCOSERYL 'in saklanması*

Başlıkları yer almaktadır.

1. SOLCOSERYL nedir ve ne için kullanılır?

SOLCOSERYL küçük tanecikli kuru yapıda bir paktır. SOLCOSERYL etken madde olarak iyileşmeyi teşvik etmek için dana kanından elde edilen bir hemodiyalizat olan solkoseril ve çabuk ortaya çıkan ve uzun süren ağrı kesici etkisi için ise polidokanol 600 içermektedir. Pat, mukoza yarası üzerinde uzun süreli bir sargı oluşturmakta ve gıdalar ve içeceklerden kaynaklanan iritasyonlara karşı korumaktadır.

Ağız boşluğunda ve diş eti üzerinde kullanılmak üzere 5 g pat içeren tüp şeklindedir.

SOLCOSERYL,

- Oral mukozanın, diş etinin ve dudakların ağrılı ve enflamatuvar hastalıklarında: ağız ülseri (aft), herpes simplex labialis (uçuk), diş eti hassasiyetinde (gingivitis (diş eti iltihabı), periodontitis (dişi çevreleyen dokuların iltihabı)),
- Takma diş yaralarında,
- 20 yaş dişlerinin çıkma sürecindeki problemlerde,
- Doktorunuz veya eczacınızın tavsiye etmesi durumunda soyulma, kazıma, periodontal (dişi çevreleyen dokuları ilgilendiren) ameliyatlar, takma diş takılması ve diş çekiminde, alveolitide (dişlerin yerleştiği boşlukların iltihabında)

lokal uygulama amacıyla kullanılan bir preparattır.

2. SOLCOSERYL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

SOLCOSERYL’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

- Eğer içeriğinde yer alan solkoseril, polidokanol, metilhidroksibenzoat, propilhidroksibenzoat ya da diğer yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz var ise,
- Bebeklerde ve 2 yaşın altındaki çocuklarda, içeriğinde yer alan nane yağı ve mentol şiddetli nefes darlığına neden olabileceğinden kullanmayınız.

SOLCOSERYL’i ařađıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eđer belirtildiđi řekilde kullanılırsa, özel dikkat gerektirmemektedir. Pat, daha sonra cerrahi bir dikiř ile kapatılacak olan derin yaralar iine doldurulmamalıdır.

Ařađıdaki durumlarda doktorunuza veya eczacınıza danıřınız:

- Ađız mukozası veya yarada enfeksiyon var ise,
- Bařka hastalıklarınız var ise,
- Alerjik bünyeniz var ise,
- Bařka ilalar da kullanıyor iseniz.

Akut enfeksiyonlarda ađzın ayrıca dezenfektan gargaralar ile alkalanması tavsiye edilmektedir.

řikayetlerinizin kötüye gitmesi veya 10 günden sonra iyileřmemesi durumunda önlem olarak doktorunuzla temasa geiniz.

Bu uyarılar gemiřteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin iin geerliyse lütfen doktorunuza danıřınız.

SOLCOSERYL’in yiyecek ve iecek ile kullanılması

Geerli deđildir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

SOLCOSERYL iin, gebeliklerde maruz kalmaya iliřkin klinik veri mevcut deđildir.

Hayvanlar üzerinde yapılan alıřmalar, gebelik, dođum ya da dođum sonrası geliřim ile ilgili olarak dođrudan ya da dolaylı zararlı etkiler olduđunu göstermemektedir.

Gebeliklerde maruz kalmaya iliřkin veri mevcut deđildir. Hamile kadınlara verilirken tedbirli olunmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduđunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

SOLCOSERYL'in emzirme döneminde kullanılmasında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.

Araç ve makine kullanımı

SOLCOSERYL'in reaksiyon yeteneği ya da trafikte araç kullanımı üzerine herhangi bir etkisi yoktur.

SOLCOSERYL'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Metilhidroksibenzoat ve propilhidroksibenzoat alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş tipte) sebebiyet verebilir.

İçeriğinde yer alan nane yağı ve mentol bebeklerde ve 2 yaşın altındaki çocuklarda şiddetli nefes darlığına neden olabileceğinden kullanılmamalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Diğer ilaçlar ile herhangi bir etkileşim bugüne kadar bilinmemektedir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz

3. SOLCOSERYL nasıl kullanılır?






Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz başka türlü önermediği takdirde günde 3-5 kez yaklaşık ½ cm uzunluğunda patı, lezyon üzerine uygulayınız. Bu uygulama özellikle yatmadan önce tavsiye edilmektedir. Tedaviye yaralar tamamen iyileşene kadar devam ediniz.

Uygulama yolu ve metodu:

Patı, ince bir tabaka halinde uygulayınız ve masaj yapmayınız. Patı, mümkünse önceden kurutulmuş olan yara üzerine bir kulak çubuğu aracılığı veya yıkanmış ve kurulanmış parmak ucu yardımı ile uygulayınız. Ardından patı ya nemlendirilmiş parmak ucu ile düzeltiniz ya da ağzınızı su ile çalkalayınız. Nem aracılığı ile pat kabarmak ve yapışkan koruyucu film

tabakayı oluşturacaktır. Protez vuruklarında patı, temizlenmiş ve kurutulmuş protezin içerisine sürünüz. Protezin daha iyi tutması için protezi ağızınıza yerleştirmeden önce ağızınızı su ile çalkalayınız.

<p>Şekil 1: Yarayı bir kulak çubuğu ya da kağıt havlu ile üzerine hafifçe bastırarak kurutunuz.</p>	
<p>Şekil 2: Patı, temizlenmiş, kuru parmak ucu ya da kulak çubuğu üzerine alınız. Tüpün ağızı nem ile temas etmemelidir.</p>	
<p>Şekil 3: Patı yararın üzerine ince bir tabaka halinde uygulayınız, masaj yapmayınız.</p>	
<p>Şekil 4: Parmağınız ya da kulak çubuğunu nemlendiriniz ve patı düzleştiriniz. Geniş yüzeyli yaralarda ağız bir bardak su ile çalkalanabilir.</p>	
<p>Şekil 5: Protez vuruklarında patı, kurulanmış protez içerisine uygulayınız.</p>	

Kullandıktan sonra t p  sıkıca kapatınız. Nem ile temas ettiđinde, t p n ađzı tıkanır.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadık a, bu talimatları takip ediniz.

İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

Doktorunuz SOLCOSERYL ile tedavinizin ne kadar s receđini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz  ünkü istenen sonucu alamazsınız.

Eđer SOLCOSERYL 'in etkisinin  ok g c l  veya zayıf olduđuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuza veya eczacınıza ile konuŐunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla SOLCOSERYL kullandıysanız:

SOLCOSERYL'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuŐunuz.

SOLCOSERYL'in fazla kullanımından kaynaklanan herhangi bir etki bug ne kadar bilinmemektedir.

SOLCOSERYL'i kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek i in  ift doz almayınız.

SOLCOSERYL ile tedavi sonlandırıldıđında oluŐabilecek etkiler:

SOLCOSERYL ile tedavinin sonlandırılmasından kaynaklanan herhangi bir etki bug ne kadar bilinmemektedir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

T m ila lar gibi SOLCOSERYL'in i eriđinde bulunan maddelere duyarlı olan kiŐilerde yan etkiler olabilir.

AŐađdakilerden biri olursa SOLCOSERYL 'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil b l m ne baŐurunuz:

Nefes darlıđı ile birlikte alerji

Çok nadiren (onbin kişide bir) alerjik reaksiyonlar görülebilir. Bu durumda SOLCOSERYL ile tedavi kesilmelidir.

Bebeklerde ve 2 yaşın altındaki çocuklarda nefes darlığına sebep olabileceğinden kullanılmamalıdır.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. SOLCOSERYL'in saklanması

SOLCOSERYL'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 30°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Tüp içeriğini nemden korumak için, tüpü sıkıca kapalı tutunuz.

SOLCOSERYL'in küçük tanecikli ve kuru yapısı optimal tutuculuk için bir kriterdir ve kalitesinde bir azalmaya dair bir işaret değildir. Zaman zaman tüpün ağzında meydana gelen yağ sızıntılarının da yine preparatın kalitesi üzerine herhangi bir etkisi söz konusu değildir.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra SOLCOSERYL'i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz SOLCOSERYL'i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi: MEDA Pharmaceuticals Switzerland GmbH/İsviçre lisansı ile;

ADEKA İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Necipbey Cad. No. 88

55020 – SAMSUN

Üretim Yeri: ADEKA İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Necipbey Cad. No. 88

55020 – SAMSUN

Bu kullanma talimatı da onaylanmıştır