

KULLANMA TALİMATI

ELOSALIC Pomat

45 gram

Deriye sürülerek kullanılır.

- **Etkin madde:** Mometazon furoat ve salisilik asit.
- **Yardımcı maddeler:** Heksilen glikol, propilen glikol stearat, beyaz balmumu, beyaz vazelin ve saf su.

Bu ilacı kullanmadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
- Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
- Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
- Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.
- Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. **ELOSALIC nedir ve ne için kullanılır?**
2. **ELOSALIC kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **ELOSALIC nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **ELOSALIC'in saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. ELOSALIC nedir ve ne için kullanılır?

ELOSALIC beyaz homojen bir pomat olup, 45 gram pomat içeren alüminyum tüplerde bulunmaktadır.

ELOSALIC'in içerisindeki mometazon furoat, kortizon-tipi bir hormon ilacıdır ve güçlü kortikoid ilaç sınıfları arasında yer alır. Pomattaki diğer bileşen olan salisilik asit ise, kuru ve pul pul olmuş deri plaklarının yerlerinden çıkmasına yardım eder.

ELOSALIC, orta ile ağır derecede şiddetli sedef hastalığının tedavisinde kullanılır.

2. ELOSALIC kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ELOSALIC 'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

Eğer:

- Mometazon furoat, salisilik asit veya bu ilacın bileşimindeki maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz
- Derinizde bakteriyel enfeksiyon varsa
- Derinizde uçuk veya suçiçeği virüsü gibi virüs enfeksiyonları varsa
- Derinizde mantar enfeksiyonu varsa
- Aşı sonrası gelişen bir reaksiyon durumunda
- Verem (tüberküloz)
- Frengi (cinsel bir hastalık)
- Rozasea veya ağız çevresindeki dermatit tedavisinde
- Hamileliğin son üç ayında

ELOSALIC 'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

- Uzun süre ve büyük alanlarda, yaralı ya da hasarlı ciltte, kolaltı ya da kasıklarda kullanımından kaçınılmalıdır. Pomat bandajlanmış veya kapatılmış deride kullanılmamalıdır.
- Gözlerinize veya mukozalarınıza (örneğin ağızınızın, burnunuzun içini döşeyen ince tabakalara) temas etmemelidir.
- Bandaj, çocuk bezi veya plastik külot altında; uzun süreler boyunca; geniş deri bölgelerinde; yüzünüzde; açık yaralarda ya da hasar görmüş deride; birbirine sürtünen deri bölgelerinde (örneğin koltukaltı, kasık) bu uyarı, özellikle çocuklarda önemlidir.
- Bu ilacın, 12 yaşından küçük çocuklarda kullanılması önerilmemektedir.
- Tedavinize birdenbire son vermeyiniz.
- Belirtiler düzelmez veya daha da kötüleşirse, doktorunuzla birlikte kontrol ediniz.
- Deriye uygulanan diğer kortikosteroid ilaçlar gibi bu ilacın kullanımına da, derideki sorun ortadan kalktığına son verilmelidir.
- Bu ilacı başka birine vermeyin ya da tedavisi için verildiği hastalığın dışındaki hastalıklarda kullanmayınız.
- Glukokortikoidler öteki cilt enfeksiyonlarını maskeleyebilir, başlatabilir ya da daha kötüleştirebilirler. Kullanım sırasında ciltte enfeksiyon gelişirse doktorunuz mantar ya da bakteriyel enfeksiyonuna karşı uygun tedaviyi uygulayacaktır.
- Cildinizde aşırı kuruma dahil tahriş ile karşılaşırsanız doktorunuza başvurunuz. Tedavinin kesilmesi ve uygun tedaviye başlanması gerekebilir.
- Salisilik asit, güneşten koruyucu etkinlik gösterir. Ultraviyole (ışın) tedavisi alıyorsanız, bundan önce Elosalic Pomat'ı tamamen cildinizden temizleyip bu alanı yıkayınız. Böyle yaparsanız, pomat tarafından korunan bölgenin çevresini yanma riskine karşı koruyabilirsiniz. Işın tedavisi bittiğinde pomatı yeniden uygulayabilirsiniz.

“Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.”

ELOSALİC'in yiyecek ve iecek ile kullanılması

Uygulama yntemi aısından yiyecek ve ieceklerle etkilesimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

ELOSALIC gebelięin son  ayında kullanılmamalı ve gebelięin ilk altı ayında kullanımdan kaınılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduęunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

ELOSALIC'in anne stne geip gemedięi bilinmemektedir.

ELOSALIC tedavisi sırasında bebeęinizi emzirmeniz nerilmemektedir

Ara ve makine kullanımı

Ara ve makine kullanma yeteneęini etkilemez.

ELOSALİC'in ierisinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında nemli bilgiler

Propilen glikol stearat ierdiginden deride irritasyona neden olabilir.

Dięer ilalar ile birlikte kullanımı

ELOSALİC'in dięer ilalar ile kullanımında bilinen bir etkilesimi yoktur.

Eęer reeteli ya da reetesiz herhangi bir ilacı řu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise, ltfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. ELOSALIC nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklıęı iin talimatlar

ELOSALIC'i hastalıklı deri blgesine ince bir tabaka halinde gnde bir veya iki defa veya doktorunuzun nerdięi řekilde uygulayınız.

ELOSALIC'i doktorunuz nermedięi srece, tedavi edilen deri blgesini sargı ile ya da bařka herhangi bir pansumanla kapatmayınız. Gnde 15 gramdan fazla kullanmayınız.  haftalık ELOSALIC kullanımı sonrasında iyileřme grlmeye bařladıęında, gnde bir kez ELOSALIC kullanınız ve daha sonra kademeli olarak sonlandırınız.

Uygulama yolu ve metodu

ELOSALIC, hastalıklı deri blgesine ince bir tabaka řeklinde srlerek kullanılır.

Her kullanım sonrasında ellerinizi sabunla iyice yıkayınız.

“Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.”

Özel kullanım durumları

Çocuklarda kullanım:Doktorunuz önermiyorsa 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanmayınız.

Eğer ELOSALIC'in etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuza veya eczacınıza ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ELOSALIC kullandıysanız:

Eğer ELOSALIC 'i kazara ağız yoluyla alırsanız, derhal tıbbi yardım isteyiniz.

Eğer ELOSALIC Pomat'tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

ELOSALIC kullanmayı unutursanız:

ELOSALIC kullanmayı unutursanız, hatırlar hatırlamaz kullanınız, daha sonra tedavinize olağan şekilde devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

ELOSALIC ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Tedaviyi aniden bırakmayınız. Güçlü steroid kullanımında tedavi aşamalı olarak bırakılmalıdır.

Tedavinizi doktorunuza danışmadan sonlandırmayınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Topikal kortikosteroidlerin kullanımında bildirilen istenmeyen etkiler aşağıdakileri kapsamaktadır. Bu reaksiyonlar, görülme sıklığına [(çok yaygın ($\geq 1/10$), yaygın ($\geq 1/100$ ila $< 1/10$), yaygın olmayan ($\geq 1/1,000$ ila $< 1/100$), seyrek ($\geq 1/10,000$ ila $< 1/1,000$), çok seyrek ($< 1/10,000$) veya sıklığı bilinmeyen] göre verilmektedir.

Yaygın:

- Pomatın uygulandığı bölgede hafif ile orta derecede yanma hissi
- Kaşıntı (prutit)
- Lokalize deri incilmesi (deri atrofisi)

Yaygın olmayan:

- Enfeksiyonlar
- Deride çatlak oluşumu (strialar)
- Deride morarma (ekimozlar)

- Kıl köklerinde iltihaplanma (folikülit)
- Rozasea benzeri inflamasyonlar

Seyrek:

- Aşırı duyarlılık
- Böbreküstü bezlerinin salgıladığı hormonlarda baskılanma (adrenal korteksin baskılanması)
- Aşırı kıllanma (hipertrikoz)
- Derinin renginde açılma (hipopigmentasyon)

Bilinmiyor:

- Cilt irritasyonu
- Ciltte kuruluk
- Akne
- Dermatit
- Kontakt dermatit
- Deride pul pul dökülme (eksfolyasyon)
- Kılcal damarların daha belirgin hale gelmesi
- Ciltte yumuşama veya beyaz lekeler
- Ter bezlerinin etkilenmesi

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuzu ya da eczacınızı bilgilendiriniz.

5. ELOSALIC'in saklanması

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

30 °C' nin altındaki oda sıcaklığında, orijinal ambalajında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ELOSALIC Pomat'ı kullanmayınız.

Eğer ambalajın hasar gördüğünü farkederseniz ELOSALIC Pomat'ı kullanmayınız. Ambalajı açıldıktan sonra 6 hafta içinde kullanınız.

İlaçlar atık su veya evsel çöp yoluyla atılmamalıdır. Artık gerekli olmayan ilaçları nasıl elden çıkaracağınızı eczacınıza sorunuz. Bu önlemler çevrenin korunmasına yardımcı olacaktır.

Ruhsat sahibi:

Merck Sharp Dohme İlaçları Ltd. Şti.
Esentepe-İstanbul

Üretim Yeri:

Zentiva Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
Küçükkarıştıran 39780, Lüleburgaz/Kırklareli

Bu kullanma talimatı 30/01/2012 tarihinde onaylanmıştır.