

## KULLANMA TALİMATI

### TETRADOX 100 mg Kapsül

Ağızdan alınır.

- **Etkin madde:** 100 mg doksisisiklin baza eşdeğer doksisisiklin hiklat içerir.
- **Yardımcı maddeler:** Magnezyum stearat, mısır nişastası, sodyum lauril sülfat; kapsülünde siyah demir oksit, titanyum dioksit, sarı demir oksit, patent mavisi, su ve jelatin bulunur.

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

### **Bu kullanma talimatında:**

1. **TETRADOX nedir ve ne için kullanılır?**
2. **TETRADOX'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **TETRADOX nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **TETRADOX'un saklanması**

**Başlıkları yer almaktadır.**

### **1. TETRADOX nedir ve ne için kullanılır ?**

TETRADOX, bakteri denilen mikroorganizmaların oluşturduğu hastalıklarda kullanılan bir antibiyotiktir. TETRADOX'un etkin maddesi olan doksisisiklin, bakterilerin protein yapımlarını bozarak üremelerinin durmasına neden olur.

TETRADOX'un içinde 100 mg doksisisiklin bulunmaktadır. Kapağı siyah, gövdesi yeşil sert kapsül içinde sarı toz görünümündedir. Bir kutunun içinde 14 kapsül bulunur.

TETRADOX, duyarlı bakterilerin neden olduğu aşağıdaki çeşitli enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde kullanılır.

- İdrar yolları ve genital enfeksiyonlarda,
- Cinsel temasla geçen (zührevi) bazı hastalıklarda (bel soğukluğu, frengi hastalıklarında alternatif tedavi olarak),
- Solunum yolları hastalıklarında (Zatüree, atipik zatüree, kronik bronşit, sinüzit gibi),
- Deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında, antibiyotik tedavisinin gerekli görüldüğü sivilcelerde,
- Kolera, amip, turist diyaresi gibi barsak hastalıklarında,
- Bazı göz enfeksiyonlarında (Trahom, inklüzyon konjonktiviti gibi)
- Kayalık dağlar benekli humması, Q ateşi, tifüs çeşitleri, bit ve keneden geçen hastalıklar, Malta

humması, veba, sıraca (tularemi), leptospiroz, psitakoz gibi hastalıkların tedavisinde,

- Sıtmanın önlenmesi ve tedavisinde,
- Turist diyaresinin önlenmesinde,
- Gazlı gangren ve tetanoz için alternatif tedavi olarak.

## **2. TETRADOX'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**

Tetrasiklin grubu ilaçların diş gelişimi sırasında (gebeliğin son ikinci yarısı, bebeklik ve 8 yaşına dek çocukluk dönemlerinde) kullanılması, dişlerde kalıcı renk değişikliğine (sarı-gri- kahverengi) yol açabilir. Bu istenmeyen etki, ilaçların uzun süreli kullanımlarında daha yaygındır, ancak tekrarlanan kısa süreli kullanımlarda da bildirilmiştir. Aynı zamanda, diş minesi hipoplazisi (gelişim bozukluğu) de bildirilmiştir. Bu nedenle tetrasiklin grubu ilaçların, solunum yolu ile edinilmiş (maruziyet sonrası) şarbon olguları da dahil olmak üzere şarbon vakaları dışındaki olgularda, diğer ilaçlar etkisiz veya kullanımı kesinlikle yasak olmadıkça bu yaş grubunda kullanılmamaları gerekir

### **TETRADOX'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ**

Eğer,

- Doksasiklin'e veya TETRADOX'un içindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz olduğu söylenmişse,
- 8 yaşından küçük çocuklarda
- Ciddi karaciğer yetmezliğiniz varsa
- Hamile iseniz veya
- Bebeğinizi emziriyorsanız

### **TETRADOX'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ**

Eğer,

- TETRADOX tedavisi sırasında hafiften şiddetliye geçişebilen ve bazen kanlı ve balgamlı olabilen ishal gelişimi olabilir. Bu durum psödomembranöz kolit denen ve bazen hayatı tehdit edebilen hastalık nedeni ile olabilir.
- Güneş ışığına karşı duyarlılık gelişmişse (deride kızarıklık, güneş yanığı gibi)
- TETRADOX'a dirençli mikroorganizmalar ile (bakteri, mantar gibi) enfeksiyon gelişirse
- A grubu beta-hemolitik streptokoklar ile bir enfeksiyon geçirdiğiniz söylenmişse (en az 10 günlük tedavi gerekecektir)
- Zührevi hastalıklarda beraberinde frenginin de bulunduğu şüphe ediliyorsa (ek testler istenecektir)
- Sıtma önleminde kullanıldığında, diğer bölgedeki sivrisinekler ile sıtma gelişebileceği unutulmamalıdır.
- Yemek borusunda hasar gelişebilir
- Porfiri denilen kan hastalığınız olduğu söylenmişse
- Miyasteni denilen kas güçsüzlüğü hastalığınız varsa
- Sistemik lupus denilen bağ dokusu hastalığınız olduğu söylenmişse

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız.

### **TETRADOX'un yiyecek ve içecek ile kullanılması:**

TETRADOX yemek borusunu tahriş edebileceğinden bol su ile ve dik oturur durumda alınmalıdır. İlaç alındıktan sonra 30 dakika yatılmamalıdır. Eğer midede tahriş hissi oluşturursa,

yemekler ile veya stle birlikte alınabilir.

### **Hamilelik:**

*İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

TETRADOX, diř ve kemik geliřimi ile ilgili istenmeyen etkileri vardır. Bu nedenle kullanılması nerilmez.

Kesin olmasa da doęum kontrol haplarının etkinlięinde azalma meydana getirebileceęi akılda tutulmalıdır.

*Tedaviniz sırasında hamile olduęunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

### **Emzirme:**

*İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

Çocuęunuzu emzirirken TETRADOX kullanmayınız

### **Araç ve makine kullanımı**

TETRADOX'un araç ve makine kullanımı zerinde etkisi bilinmemektedir.

### **TETRADOX'un ierięinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında nemli bilgiler**

TETRADOX laktoz ierir. Eęer daha nceden doktorunuz tarafından bazı řekerleri tolere edemedięiniz sylenmiře bu tıbbi rn almadan nce doktorunuza danıřınız.

### **Dięer ilalar ile birlikte kullanımı**

TETRADOX, ařaęıdaki ilalarla birlikte kullanılmamalıdır.

- Penisilin olarak bilinen antibiyotikler.
- Alminyum, kalsiyum, magnezyum ieren mide asidi giderici ilalar
- Bizmut, sukralfat gibi mide koruyucu ilalar
- Demir, inko ieren ilalar
- Kan pıhtılařmasını engelleyen varfarin gibi ilalar
- Fenobarbital, karbamazepin, fenitoin, primidon gibi sara (epilepsi) hastalıęı tedavisinde kullanılan ilalar
- Diyazepin gibi uyku ilaları
- Depresyon tedavisinde kullanılan venlafaksin, mirtazapin, nefazodon
- Takrolimus ve siklosporin gibi organ nakillerinde kullanılan ilalar
- Kalp hastalıkları ve kan basıncının ykselmesinin tedavisinde kullanılan kalsiyum kanal blokerleri
- Cinsel yetmezlik iin kullanılan sildenafil vb ilalar
- Aęızdan alınan doęum kontrol hapları
- Anestezide kullanılan metoksifluran (bbrek yetmezlięi iin risk oluřturur)
- Alkol

*Eęer reeteli ya da reetesiz herhangi bir ilacı řu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise ltfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

### 3. TETRADOX nasıl kullanılır?

- **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:**

Doktorunuz enfeksiyonun cinsine ve şiddetine göre alacağınız doz miktarını ve TETRADOX ile yapılacak tedavi süresini belirleyecektir.

Doktorunuz başka şekilde önermediyse, genellikle hafif ve orta şiddette enfeksiyonlarda başlangıç dozu olarak günde iki kez 100 mg veya tek doz 200 mg alınmasının ardından günde 100 mg kullanılması önerilir. Şiddetli enfeksiyonlarda 200 mg ile tedaviye devam edilebilir. Uygulama süresi genellikle 10 gündür.

Farklı enfeksiyonlarda farklı dozlarda ve sürelerde önerilir:

- Sivilce tedavisinde günde 50 mg, 6-12 hafta
- Cinsel temasla bulaşan hastalıklarda günde 2 kez 100 mg 7-10 gün
- Frengide günde 300 mg bölünmüş dozlarda
- Bit veya kene nedenli ateşlerde enfeksiyonun şiddetine göre 100-200 mg tek doz
- Sıtmada günde 200 mg en az 7 gün (kinin gibi ilaçlar ile birlikte)
- Çalı tifüsü engellenmesinde 200 mg, tek doz
- Turist ishalinin önlenmesinde, seyahatin ilk günü 200 mg, ve seyahat boyunca günde 100 mg, en fazla 3 hafta (21 gün) kullanılır
- Leptospiroz denilen enfeksiyonlar için seyahat boyunca günde 200 mg ve seyahat bittikten sonra bir kez daha 200 mg önerilir. Doktorunuz aksini söylemedikçe 3 haftadan uzun süreli kullanmayınız.

#### **Uygulama yolu ve metodu:**

TETRADOX, ağız yoluyla ve çiğnenmeden ve bol su ile dik olarak alınır. Aldıktan sonra 30 dakika boyunca yatılması önerilmez

- **Değişik yaş grupları:**

#### **Çocuklarda kullanım**

8 altındaki çocuklarda kullanılması önerilmez. Diş ve kemik bozukluklarına neden olabilir.

#### **Yaşlılarda kullanım**

Genç hastalar için önerilen dozun aynısı önerilir.

- **Özel kullanım durumları:**

#### **Böbrek yetmezliği:**

Normal dozlarda kullanılabilir

#### **Karaciğer yetmezliği:**

Şiddetli karaciğer yetmezliğinde kullanılmaz.

*Eğer TETRADOX'un etkisinin çok güçlü veya çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.*

#### **Kullanmanız gerekenden daha fazla TETRADOX kullandıysanız :**

*TETRADOX'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

Doz aşımında bulantı, iştahsızlık ve ishal görülebilir.

Doktorunuz midenizi boşaltmaya çalışacak ve diğer gereken önlemleri alacaktır.

### **TETRADOX'u kullanmayı unutursanız**

Bir sonraki doz zamanı yakın değilse, hatırlar hatırlamaz TETRADOX dozunuzu alınız. Bir sonraki dozunuzu normal zamanında alınız.

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.*

### **TETRADOX ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler**

Doktorunuzla konuşmadan TETRADOX almayı aniden kesmeyiniz. Antibiyotiklerin uygunsuz kullanımları dirençli mikroorganizmaların gelişmesine neden olabileceği gibi hastalığınız gerektiği gibi iyileşmediği için enfeksiyon bulgularınızın devam etmesine neden olacaktır.

### **4. Olası yan etkiler nelerdir?**

Tüm diğer ilaçlar gibi, TETRADOX'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

**Aşağıdakilerden biri olursa TETRADOX'u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:**

- Nefes almakta zorlanıyorsanız veya hırıltılı nefes alıyorsanız, yüz, dil ve boğazınızda şişme yaşarsanız, bunlar anaflaksi denilen ciddi bir alerjinin bulguları olabilir.
- Cildinizde veya göz çevresinde içi su dolu veya kanlı sıvı dolu kabarcıklar gelişir veya deriniz geniş alanlarda soyulmaya başlarsa, (farklı tipteki ciddi alerjik deri hastalıklarının belirtileri olabilir)
- Ciddi güneş yanıkları gelişirse

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

**Aşağıdakilerden herhangi birini farkederseniz hemen doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:**

- Kan testlerinizde alyuvarlar, akyuvarlar veya pıhtılaşma hücrelerinizde anormal azalmalara bağlı olarak, kanamalar, ateş, enfeksiyon oluşuyorsa veya derinizin altında toplu iğne başı gibi noktasal morarmalar gibi bulgulara rastlanırsa
- Porfiri hastalığı gelişirse (kansızlık, karın ağrısı, deride ışığa duyarlılık)
- Ciddi karaciğer fonksiyon bozukluğuna işaret eden bazı kan testlerinde bozulma, sarılık gibi bulgularınız varsa
- Uzun süren şiddetli veya kanlı, balgamlı ishal, karın ağrısı ve kramplar olursa (psödomembranöz kolit)
- Yutmada güçlük, göğüs kemiği arkasında yanma ve ağrı (yemek borusu tahrişi)
- Vajinada akıntı, kaşıntı, pamukçuk veya ilaca dirençli diğer enfeksiyonlar (ağız ve dil enfeksiyonları gibi)
- Sistemik lupus hastalığında kötüleşme

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

**Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz , doktorunuza söyleyiniz:**

- Baş ağrısı
- Görme bulanıklığı ve görme bozuklukları

- Bebeklerde kullanılırsa bingıldak kabarıklığı
- Kulak çınlaması
- Karın ağrısı
- İştahsızlık
- Bulantı,
- Mide yanması,
- İshal
- Dişlerde renklenme ve diş minesinde gelişim bozukluğu (çocuklarda)
- Kas ve eklem ağrıları
- Kan üre değerlerinde (böbrek fonksiyonlarını gösterir) geçici değişiklik

Bunlar TETRADOX'in hafif yan etkileridir.

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

## **5. TETRADOX'un Saklanması**

*TETRADOX'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru bir yerde saklayınız.*

**Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.**

*TETRADOX'u ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız.*

**Ruhsat Sahibi:** Actavis İlaçları A.Ş.

Gültepe mah. Polat İş Merkezi 34394 Levent/Şişli-İstanbul

Tel : (0212) 316 67 00

Faks : (0212) 264 42 68

**Üretim yeri:** Bilim İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi, 1900 sok. no:1904 41480 Gebze/Kocaeli

*Bu kullanma talimatı .../.../... tarihinde onaylanmıştır.*