

KULLANMA TALİMATI

SYSTANE® Lubrikant Göz Damlası, 15mL

Göze damlatılarak uygulanır.

- **Etkin madde:** 1 mL’de 4 mg polietilen glikol 400 ve 3 mg propilen glikol
- **Yardımcı maddeler:** Hidroksipropil guar, borik asit, sodyum klorür, potasyum klorür, kalsiyum klorür (dihidrat), magnezyum klorür (heksahidrat), çinko klorür, poliquad, sodyum hidroksit ve/veya hidroklorik asit, saf su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçetelendirilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

1. **SYSTANE nedir ve ne için kullanılır?**
2. **SYSTANE’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **SYSTANE nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **SYSTANE’nin saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. SYSTANE nedir ve ne için kullanılır?

SYSTANE, gözyaşının eksikliğine veya gözyaşının yapıcı bozukluğuna bağlı ortaya çıkan göz yüzeyinin nemlenmesinin bozulduğu veya göz küresinin normal yerleşiminin değişerek (eksoftalmi, lagoftalmi) dış etkilere daha fazla maruz kaldığı durumlarda suni gözyaşı olarak kullanılan göz damlasıdır. Kuru göz rahatsızlıklarını tedavi etmek ve bu durumla ilgili yanma ve tahriş şikayetlerinin rahatlatılması amacı ile kullanılır.

15 mL’lik kendinden damlalıklı vidalı kapaklı koruma bantlı (DROP-TAINER) şişede sunulmaktadır.

2. SYSTANE’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

SYSTANE’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

- Eğer SYSTANE’nin içerdiği maddelerden herhangi birine karşı hassasiyetiniz (alerjiniz) var ise

SYSTANE’i ařağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

- Eęer gözde ağrı, görmede deęişiklik, devamlı kızarıklık veya tahriř meydana gelir, bu durum daha kötüye gider ve 72 saatten fazla sürerse ilacın kullanımını kesilerek göz doktoruna başvurulmalıdır.
- Eęer çözelti renk deęiřtirir ve bulanık hale gelirse ürün kullanılmamalıdır.

Bu uyarılar gemiřteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danıřınız.

SYSTANE’in yiyecek ve iecek ile kullanılması

SYSTANE göze damlatılarak kullanılır. Ürünü bařka bir yolla kullanmayınız. Ürün önerildięi řekilde kullanıldıęı takdirde, besinlerle ve ieceklerle bir iliřkisi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

İlacın hamile kadınlarda kullanımını ile iliřkili yeterli alıřmaları mevcut deęildir, hamilelik sırasında kullanımında dikkatli olunmalıdır. SYSTANE, sadece gerekten gerekli olduęu durumlarda kullanılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduęunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

SYSTANE, sadece gerekten gerekli olduęu durumlarda kullanılmalıdır.

Ara ve makine kullanımı

Dięer göz damlalarında da olduęu gibi, SYSTANE kullandıktan sonra görüřünüzde bulanıklařma oluřabilir. Bulanıklık geinceye kadar ara ya da makine kullanmayınız.

Dięer ilalar ile birlikte kullanımı

Eęer reeteli ya da reetesiz herhangi bir ilacı řu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Eęer birden fazla göz ilacı kullanıyorsanız, iki uygulama arasında 5 dakika bırakınız.

3. SYSTANE nasıl kullanılır?

▪ Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklıęı için talimatlar:

İhtiya duyulduęunda rahatsız göz veya gözlere 1-2 damla üç basamakta uygulanır.

▪ Uygulama yolu ve metodu:

- Bařınızı arkaya yatırın.

- Elinizi gözünüzün altına yerleştirin ve gözünüz ile alt göz kapağınızın arasında V şeklindeki kese görünene kadar yavaşça aşağıya çekin.
- Keseye bir veya iki damla damlatın.

Kirlenmesini ve mikrop bulaşmasını önlemek için damlalığın ucunu göz kapaklarına veya herhangi bir yere değdirmemeye dikkat edilmelidir.

Damla gözünüze gelmediğinde tekrar deneyiniz.

- **Değişik yaş grupları:**
Çocuklarda kullanımı: Özel kullanımı yoktur.
Yaşlılarda kullanımı: Özel kullanımı yoktur.

- **Özel kullanım durumları:**
Özel kullanımı yoktur.

Eğer SYSTANE'nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla SYSTANE kullandıysanız:

Kullanmanız gerekenden fazla SYSTANE kullandıysanız endişelenmeyiniz, ılık su ile yıkayarak gözümüzden uzaklaştırılabilir.

SYSTANE'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

SYSTANE'i kullanmayı unutursanız

Endişelenmeyiniz, hatırladığınız anda tek bir doz damlatınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz damlatmayınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, SYSTANE'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

SYSTANE ile ilişkili herhangi bir yan etki bildirilmemiştir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. SYSTANE'in saklanması

SYSTANE'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra SYSTANE'i kullanmayınız. Şişeyi açtığınız tarihi aşağıdaki bölüme yazınız.

Açıldığı tarih:

Kullanmadığınız zaman şişenin kapağını sıkıca kapatınız.

25°C'nin altında oda sıcaklığında saklanmalıdır.

Eğer çözeltide bulanıklık veya renk bozukluğu fark ederseniz kullanmayınız.

Şişe ilk kez açıldıktan sonra 1 ay içinde kullanılmalıdır.

Bu tıbbi ürün hakkında herhangi bir bilgi için, lütfen Ruhsat Sahibi ile temasa geçiniz.

Ruhsat Sahibi: Alcon Laboratuvarları Tic. A.Ş.
Cumhuriyet Cad. Acarlar İş Mrk. No: 12 C-Blok K:5 Kavacık 34805
Beykoz / İSTANBUL

Üretici: Alcon Pharmaceuticals Ltd.
Camil Fabra, 58 08320 El Masnou Barselona / İSPANYA

Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.