

## KULLANMA TALİMATI

### LEVRAL 750 mg efervesan tablet

Ağız yolu ile alınır.

• **Etkin madde:**

Her bir efervesan tablet, 750 mg Levetirasetam içerir.

• **Yardımcı maddeler:**

- Sitrik asit anhidr, sodyum hidrojen karbonat, maltodekstrin, sorbitol (E 420), aspartam (E 951), polietilen glikol, portakal aroması ve kayısı aroması içerir.

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

### **Bu Kullanma Talimatında:**

1. **LEVRAL nedir ve ne için kullanılır?**
2. **LEVRAL 'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **LEVRAL nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **LEVRAL 'in saklanması**

**Başlıkları yer almaktadır.**

## **1. LEVRAL nedir ve ne için kullanılır?**

LEVRAL, beyaz renkli, iki tarafı düz, silindirik efervesan tabletler şeklindedir.

LEVRAL, 50, 100 ve 200 efervesan tablet içeren plastik tüp / silikajelli plastik kapak ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır.

LEVRAL, epilepsi (sara) nöbetlerinin tedavisinde kullanılan antiepileptik (sara nöbetlerini önleyici) bir ilaçtır.

LEVRAL 16 yaş ve üstü hastalarda parsiyel (kısmi) nöbetlerin tedavisinde tek başına kullanılır.

LEVRAL halihazırda başka bir antiepileptik ilaç kullanan; diğer tip sara benzeri nöbetleri olan hastaların kullandıkları anti epileptik ilaçlara ilave olarak da kullanılır.

## **2. LEVRAL’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**

### **LEVRAL’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ**

Eğer,

- LEVRAL, levetirasetam diğer pirolidon türevleri veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız varsa (aşırı duyarlı iseniz).

### **LEVRAL’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ**

Eğer;

- Böbrek problemlerinizi var ise, doktorunuzun talimatlarını uyunuz. Doktorunuz dozunuzun ayarlanmasına gerek olup olmadığına karar verebilir.
- LEVRAL alan çocuklarda, LEVRAL’in ergenlik ve büyümeye bir etkisi gözlenmemiştir. Ancak çocuklarda uzun süreli etkileri bilinmemektedir.
- Nöbet şiddetinde artış meydana gelirse, doktorunuza danışınız.
- LEVRAL gibi bir antiepileptik ilaç ile tedavi edilen az sayıda kişide, kendine zarar verme veya kendini öldürme düşüncesi vardır. Depresyon ve/veya intihar düşüncesi belirtisi gösteriyorsanız lütfen doktorunuza danışınız.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

## **LEVRAL'in yiyecek ve iecek ile kullanılması**

LEVRAL yemeklerle birlikte veya ayrı alabilirsiniz. Bir gvenlik nlemi olarak LEVRAL'i alkol ile kullanmayınız.

## **Hamilelik**

*İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

Hamileyseniz veya hamile kalmayı dřnyorsanız, ltfen doktorunuza bildiriniz.

LEVRAL'i, hamilelik sırasında gerekli olmadıka kullanmayınız. Dođmamıř ocuđunuza karřı potansiyel risk bilinmemektedir. LEVRAL, nbetlerinizi kontrol etmek iin ihtiyacınız olandan daha yksek doz dzeylerinde yapılan hayvan alıřmalarında istenmeyen reme etkileri gstermiřtir.

*Tedaviniz sırasında hamile olduđunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

## **Emzirme**

*İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

Tedavi sresince emzirme nerilmez.

## **Ara ve makine kullanımı**

LEVRAL, kendinizi uykulu hissetmenize neden olabileceđi iin, araba kullanma ya da herhangi bir alet veya makine kullanma yeteneđinizi bozabilir. Bu durum, tedavinin bařlangıcında veya doz artıřından sonra daha fazla grlebilir. Sz konusu aktiviteleri yapma yeteneđinizin etkilenmediđi kanıtlanıncaya kadar ara veya makine kullanmayınız.

## **LEVRAL'in ieriđinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında nemli bilgiler**

LEVRAL ieriđinde bulunan yardımcı maddelere karřı ařırı duyarlılıđınız yoksa, bu maddelere bađlı olumsuz bir etki beklenmez.

## **Aspartam ile İlgili Uyarı**

LEVRAL'de aspartam bulunmaktadır. Aspartam bir fenilalanin kaynađıdır ve fenilketonrisi (ender rastlanan kalıtsal bir hastalık) olan hastalar iin zararlı olabilir.

### Sorbitol ile İlgili Uyarı

LEVRAL sorbitol içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

### Sodyum ile İlgili Uyarı

Bu tıbbi ürün her bir efervesan tablette toplam 154,70 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

### **Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı**

*Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

### **3. LEVRAL nasıl kullanılır?**

#### **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:**

*Yetişkinler ( $\geq 18$  yaş) ve 50 kg ve üstündeki ergenlerde (12-17 yaş) kullanım:*

Doktorunuz size kaç tablet LEVRAL kullanacağınızı söyleyecektir, tabletleri ona göre alınız.

- Genel doz: günde 1000 mg -3000 mg arasındır.
- LEVRAL’i, günde 2 kez, sabah ve akşam birer kez, yaklaşık her gün aynı zamanda olacak şekilde, almalısınız.

Örneğin, eğer günlük dozunuz 1500 mg ise sabah ve akşam birer tablet almalısınız.

*4-11 yaş arası çocuklarda ve 50 kg’ın altındaki ergenlerde (12-17 yaş) kullanım:*

Doktorunuzun çocuğunuz için söylediği sayıda tableti, çocuğunuza veriniz.

- Genel doz: günde 20 mg/kg ve 60 mg/kg arasındır.
- Çocuğunuz LEVRAL’i, günde 2 kez, sabah ve akşam birer kez, yaklaşık her gün aynı zamanda olacak şekilde almalıdır.

**Uygulama yolu ve metodu:**

LEVRAL'i bir bardak suda eritiniz. Sonra bardađı tamamıyla iiniz. Yemeklerle birlikte ve yemek harici alınabilir.

**Deđişik yař grupları:****ocuklarda kullanımı:**

LEVRAL 4 yař üstü ocuklarda ve eriřkinlerde kullanılmaktadır. 4 yař altı ocuklarda kullanımı önerilmez.

**Yařlılarda kullanımı:**

Yařlı hastalarda (65 yař üstü), bbrek fonksiyonu azalmıř ise LEVRAL dozu doktorunuz tarafından ayarlanacaktır.

**zel kullanım durumları:****Bbrek/Karaciđer yetmezliđi:**

Bbrek yetmezliđiniz varsa, *LEVRAL* dozunuz bbrek fonksiyonunuza gre doktorunuz tarafından ayarlanacaktır.

Ađır karaciđer yetmezliđiniz varsa doktorunuz tarafından dozunuz azaltılacaktır.

*Eđer LEVRAL'in etkisinin ok gl veya zayıf olduđuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuřunuz.*

**Kullanmanız gerekenden daha fazla LEVRAL kullandıysanız**

*LEVRAL'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmıřsanız bir doktor veya eczacı ile konuřunuz.*

**LEVRAL'i kullanmayı unutursanız**

Eđer, bir veya daha fazla dozu almayı unutursanız, doktorunuza danıřınız.

*Unutulan dozları dengelemek iin ift doz almayınız.*

### **LEVRAL ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler**

LEVRAL kronik (uzun süreli) tedavi olarak kullanılır. Doktorunuz size söylediği sürece LEVRAL tedavisine devam etmelisiniz.

Doktorunuzun önerisi olmadan tedaviyi kesmeyiniz çünkü bu durum nöbetlerinizi arttırabilir. LEVRAL tedavisinin sonlandırılmasına doktorunuz karar vermelidir.

Doktorunuz, LEVRAL tedavisinin kademeli bir doz azaltımı ile sonlandırılması hakkında sizi bilgilendirecektir.

İlacın kullanımı ile ilgili başka sorularınız olursa doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

### **4. Olası yan etkiler nelerdir?**

Tüm ilaçlar gibi LEVRAL'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

**Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin Acil bölümüne başvurunuz:**

- Uyuklama hali (Somnolans)
- Yorgunluk (Asteni/halsizlik)
- İstemsiz kas kasılmaları (konvülsiyon)
- Uyumlu hareket bozukluğu (ataksi)
- Denge bozukluğu
- Aşırı huzursuzluk hali (Ajitasyon)
- Depresyon
- Duygusal değişkenlik/duygu durum dalgalanmaları
- Düşmanca davranış/saldırganlık
- Sinirlilik veya uyarıya aşırı tepki gösterme (irritabilite)
- Kanda trombosit sayısında azalma
- Anormal davranışlar
- Kızgınlık
- Kaygı (Anksiyete)
- Zihin karışıklığı (konfüzyon)
- Gerçekte olmayan şeyleri görmek veya duymak (halusinasyon, varsanı)

- Mental bozukluk
- İntihar, intihar girişimi ve intihar düşüncesi
- Pankreas iltihabı (Pankreatit)
- Karaciğer iltihabı (Hepatit)
- Alyuvar ve /veya akyuvar sayısında azalma

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

**Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:**

- Sersemlik hissi
- Baş ağrısı
- Hiperaktivite, aşırı hareketlilik (Hiperkinezi)
- İstemsiz titreme (Tremor)
- Bellek kaybı (Amnezi), dikkat dağınıklığı (konsantrasyon kaybı)
- Unutkanlık (Bellek yetmezliği)
- Uykusuzluk (İnsomni)
- Kişilik bozuklukları (davranış bozuklukları)
- Anormal düşünce (yavaş düşünme, konsantre olamama)
- Karın ağrısı
- İshal
- Hazımsızlık (Dispepsi)
- Bulantı
- Kusma
- İştahsızlık (Anoreksi)
- Kilo artışı
- Dönme hissi (Vertigo)
- Çift görme
- Bulanık görme
- Kas ağrısı (Miyalji)
- Kazara yaralanmalar
- Enfeksiyon

- Nazofaranjit (Burun ve yutak iltihabı)
- Öksürükte artış
- Döküntü
- Deri iltihabı (Ekzema)
- Kaşıntı
- İğneleme hissi (Parestezi)
- Karaciğer yetmezliği
- Karaciğer fonksiyon testlerinde anormallik
- Kilo kaybı
- Saç dökülmesi

Bunlar LEVRAL'in hafif yan etkileridir.

Uyuklama hali, yorgunluk ve sersemlik gibi bazı yan etkiler tedavinin başlangıcında veya doz artışlarında daha sık görülebilir. Ancak bu etkilerin zamanla azalması gerekmektedir.

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*



## **5. LEVRAL'in saklanması**

*LEVRAL 'i çocukların göremeyeceđi, erişemeyeceđi yerlerde ve ambalajında saklayınız.*

25 °C'nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru yerde saklayınız.

Kullandıktan sonra tütün ağzını kapatmayı unutmayınız.

### **Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.**

*Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra LEVRAL 'i kullanmayınız.*

Eđer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz LEVRAL 'i kullanmayınız.

### ***Ruhsat Sahibi:***

Mentis İlaç San. Tic. Ltd. Şti

Florya Asfaltı Florya İş Merkezi B Blok No:88/6

Bakırköy/İSTANBUL

Telefon: 0 212 481 79 52

Faks: 0 212 481 79 52

### ***Üretim yeri:***

Neutec İlaç San. Tic. A.Ş.

1.OSB. 1.Yol No:3 Adapazarı / SAKARYA

*Bu kullanma talimatı 16.07.2010 tarihinde onaylanmıştır.*