

## KULLANMA TALİMATI

### TUSAMOL 7.5 mg / 5 ml şurup

#### Ağızdan alınır.

- **Etkin madde:** Her 5 ml şurupta 7.5 mg Butamirat sitrat
- **Yardımcı maddeler:** Nipajin M , sodyum sakarin, mandalina aroması, gliserin, sorbitol ve distile su.

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
- Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
- Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
- Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz
- Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük doz kullanmayınız.**

#### **Bu Kullanma Talimatında:**

1. **TUSAMOL nedir ve ne için kullanılır?**
2. **TUSAMOL'ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **TUSAMOL nasıl kullanılır?**
4. **Olasıyan etkiler nelerdir?**
5. **TUSAMOL'ün saklanması**

#### **Başlıkları yer almaktadır.**

#### **1. TUSAMOL nedir ve ne için kullanılır?**

TUSAMOL, 100 ml'lik renkli şişede, 5 ml'lik 1, 2.5 ve 5 ml'ye işaretli kaşık ölçekle beraber sunulan şuruptur.

TUSAMOL etkin madde olarak butamirat sitrat içerir.

Ani başlayan öksürük ve cerrahi girişimler için ameliyattan önce ve sonra öksürüğün kesilmesi için kullanılır.

#### **2. TUSAMOL'ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**

#### **TUSAMOL'ü aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ**

Butamirat sitrata veya TUSAMOL'ün bileşenlerine karşı alerjiniz var ise kullanmayınız.

## **TUSAMOL'ü aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ**

Hamileliğinizin ilk üç ayında doktorunuza danışmadan kullanmayınız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

### **TUSAMOL'ün yiyecek ve içecek ile kullanılması**

Yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

### **Hamilelik:**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

Gerekli olduğu durumlarda doktorunuzun kontrolü altında kullanınız.

*Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.*

### **Emzirme:**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

TUSAMOL'ün anne sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden, tedavinin devamı konusunda doktorunuza danışınız.

### **Araç ve makine kullanımı**

Araç ve makine kullanım becerisi üzerine etkileri hakkında hiçbir çalışma yapılmamıştır. Butamirat sitrat, baş dönmesine sebep olabileceğinden, araç ya da makine kullanırken dikkatli olunuz.

### **TUSAMOL'ün içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler**

İçeriğinde bulunan Sorbitol nedeniyle, eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

TUSAMOL, 5 ml'lik dozunda 10 g'dan daha az gliserin içerir. Gliserin'e karşı herhangi bir etki beklenmez.

TUSAMOL'ün 5 ml'lik dozunda 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ( 0,25 mg sodyum sakarin) içerir. Sodyum miktarına bağlı herhangi bir olumsuz etki beklenmez.

### **Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı**

TUSAMOL'ün herhangi bir ilaçla etkileşimde bulunduğu dair kanıt yoktur.

*Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

## **3. TUSAMOL nasıl kullanılır?**

### **Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:**

- TUSAMOL yetişkinlerde, yemeklerden önce ya da sonra veya yemeklerle birlikte, günde 4 defa 3 ölçek (15 ml) olmak üzere kullanılır.
- Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde belirtilen dozlarda kullanınız.

### **Uygulama yolu ve metodu:**

- TUSAMOL sadece ağızdan kullanım içindir.
- Ölçek kaşığı kullanılarak şurup içilir.

### **Değişik yaş grupları:**

#### **Çocuklarda kullanım:**

- 3 yaşın üstündeki çocuklarda : Günde 3 defa 5 ml (1 ölçek)  
6 yaşın üstündeki çocuklarda : Günde 3 defa 10 ml (2 ölçek)  
12 yaşın üstündeki çocuklarda : Günde 3 defa 15 ml (3 ölçek)

### **Yaşlılarda Kullanım:**

TUSAMOL'ün yaşlı hastalardaki güvenilirlik ve etkinliği incelenmemiştir.

### **Özel kullanım durumları**

#### **Böbrek/Karaciğer yetmezliği:**

TUSAMOL'ün böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalardaki güvenilirlik ve etkinliği incelenmemiştir.

*Eğer TUSAMOL 'ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.*

### **Kullanmanız gerekenden daha fazla TUSAMOL kullandıysanız:**

*TUSAMOL'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

Şurubun aşırı dozda alınması halinde şu belirtiler görülebilir: uyuklama, bulantı, kusma, ishal, baş dönmesi ve kan basıncında düşme.

### **TUSAMOL'ü kullanmayı unutursanız:**

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.*

### **TUSAMOL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:**

Bulunmamaktadır.

## **4. Olası yan etkiler nelerdir?**

Tüm ilaçlar gibi, TUSAMOL 'ün içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

**Aşağıdakilerden biri olursa, TUSAMOL'ü kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz :**

- Deri döküntüleri

Bu çok ciddi bir yan etkidir. Eđer bu yan etki sizde mevcut ise sizin TUSAMOL'e karřı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi mřdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etki oldukça seyrek gřrřlřr.

**Ařađıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil břlřmřne bařvurunuz:**

- Hafif deri dřkřntřsř

Bu ciddi bir yan etkidir. Acil tıbbi mřdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek gřrřlřr.

**Ařađıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza sřyleyiniz:**

- Mide bulantısı,
- İshal
- Bař dšnmesi

Bunlar TUSAMOL'řn hafif yan etkileridir.

Bu yan etkiler doz azaltıldıđında veya tedavi kesildiđinde kaybolur.

*Eđer bu kullanma talimatında bahsi geęmeyen herhangi bir yan etki ile karřılařırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

##### **5. TUSAMOL'řn Saklanması**

*TUSAMOL'ř cřocukların gřremeyeceđi, eriřemeyeceđi yerlerde ve ambalajında saklayınız.*

25°C'nin altındaki oda sıcaklıklarında saklanmalıdır

**Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.**

*Etiketin veya ambalajın řzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra TUSAMOL' kullanmayınız.*

Eđer řrřnde ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz TUSAMOL'ř kullanmayınız.

**Ruhsat Sahibi :** Atabay Kimya San. ve Tic. A.ř.  
Acıbadem, Křftřncř Sok. No : 1  
34718 Kadıkřy / İSTANBUL

**řretici :** Atabay İlaę Fabrikası A.ř.  
Acıbadem, Křftřncř Sok. No : 1  
34718 Kadıkřy / İSTANBUL

*Bu kullanma talimatı 02.03.2010 tarihinde onaylanmıřtır.*