

KULLANMA TALİMATI

SİCCAPROTECT göz damlası

Göze uygulanır.

- **Etkin maddeler:** 1 ml içeriğinde, 30 mg dekspantenol ve 14 mg polivinil alkol bulunur.
- **Yardımcı madde(ler):** Benzalkonyum klorür, kalsiyum dihidrojen fosfat, kalsiyum monohidrojen fosfat, saflaştırılmış su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

1. **SİCCAPROTECT nedir ve ne için kullanılır?**
2. **SİCCAPROTECT'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **SİCCAPROTECT nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **SİCCAPROTECT'in saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. SİCCAPROTECT nedir ve ne için kullanılır?

SİCCAPROTECT göz üzerinde lokal uygulama amaçlı suni göz yaşıdır.

SİCCAPROTECT, lokal (bölgesel) veya sistemik (vücudun tamamından kaynaklanan) temel hastalıklar ve göz kapağının kapanma problemleri sebebiyle göz yaşı salgılamında meydana gelen bozukluklarda oluşan göz kurumasının belirtilere yönelik tedavisinde, ayrıca sert lenslerin kullanılması esnasında ilave nemlendirme sağlamak amacıyla kullanılır.

2. SİCCAPROTECT'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

SİCCAPROTECT'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

- Eğer SİCCAPROTECT formülünde bulunan etkin maddelerden veya diğer bileşenlerden herhangi birisine karşı aşırı hassasiyetiniz (alerji) varsa,
- Eğer yumuşak (hidrofil) lens kullanıyorsanız

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

SİCCAPROTECT'in yiyecek ve iecek ile kullanılması
SİCCAPROTECT yemeklerle birlikte veya a karna alınabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduđunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Ara ve makine kullanımı

SİCCAPROTECT kullandıktan sonra direk olarak ara veya makine kullanmayın.

Uygun bir biimde uygulanmıř olsa bile, ara ve makine kullanırken bu ila grme yeteneđini dolayısıyla da trafikte tepki sresini geici olarak olumsuz ynde etkiler.

SİCCAPROTECT'in ieriđinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında nemli bilgiler

İeriđindeki benzalkonyum klorr nedeniyle gzde tahriře sebebiyet verebilir. Yumuřak kontakt lenslerle temasından kaınınız. Uygulamadan nce kontakt lensi ıkartınız ve lensi takmak iin en azından 15 dakika bekleyiniz. Yumuřak kontakt lenslerin renklerinin bozulmasına neden olduđu bilinmektedir.

Diđer ilalar ile birlikte kullanımı

Diđer ilalarla bilinen bir etkileřimi yoktur.

Not: Bařka gz damlaları veya gz merhemleri kullanıyorsanız, ilaların uygulanmalarını 15 dakika arayla gerekleřtirmelisiniz. Gz merhemleri daima en son olarak uygulanmalıdır.

Eđer reeteli ya da reetesiz herhangi bir ilacı řu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız ltfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. SİCCAPROTECT nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklıđı iin talimatlar:

SİCCAPROTECT daima doktorunuzun size sylediđi řekilde kullanın. Eđer emin deđilseniz doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Hekim tarafından farklı bir biimde nerilmedike:

Gnde en fazla 6 defa bir damla konjunktiva torbasına (gz kapađının iine) damlatılır.

SİCCAPROTECT kullanımını gn ierisinde eřit srelere yayınız.

Kesin tedavi sresi řahsi hastalık belirtilerine bađlıdır ve doktor tarafından tespit edilmelidir. Genel olarak SİCCAPROTECT gibi suni gzyařları ile tedavi, uzun sreli bir tedavi řeklidir.

Uygulama yolu ve metodu:

Göz damlaları daima, şişe ucunun göze veya cilde temas etmesinden kaçınılmalıdır. Koruyucu başlığı çıkarınız, başınızı hafifçe arkaya atınız, alt göz kapağını gözün üzerinden biraz kaldırınız ve şişeye hafif bir basınç uygulayarak konjunktiva torbasına 1 damla damlatınız. Sonra göz kapaklarınızı yavaşça kapatınız. Kullandıktan sonra şişeyi dikkatli bir biçimde kapatınız.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanım: Çocuklarda kullanımına ilişkin tecrübe bulunmamaktadır

Yaşlılarda kullanım: Veri yoktur.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği: Veri yoktur.

Eğer SİCCAPROTECT'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuza veya eczacınıza ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla SİCCAPROTECT kullandıysanız:

Özel önlemlere gerek yoktur, olağan dozuyla uygulamaya devam ediniz.

SİCCAPROTECT'ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

SİCCAPROTECT'i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

SİCCAPROTECT ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Doktorunuzun size tavsiye ettiği süre zarfında kullanın.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi SİCCAPROTECT ' in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkilerin değerleri aşağıdaki detaylara dayanmaktadır.

Çok yaygın: 10 kişide 1'den fazla

Yaygın: 100 kişide 1'den fazla

Yaygın olmayan: 1000 kişide 1'den fazla

Seyrek: 10.000 kişide 1'den fazla

Çok seyrek: 10.000 kişide 1'den daha az veya bilinmiyor.

Çok seyrek olarak aşırı duyarlılık reaksiyonları (hafif yanma hissi) bildirilmiştir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuza veya eczacınıza bilgilendiriniz.

5. SİCCAPROTECT'in Saklanması

SİCCAPROTECT'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25 °C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra SİCCAPROTECT'i kullanmayınız.

Iřıktan korumak iin dıř ambalajında saklayınız.

Aıldıktan sonra kullanım suresi

SİCCAPROTECT aıldıktan sonra sadece 6 hafta kullanılabilir.

Ruhsat sahibi:

BİEM Tıbbi Cihaz ve İla San. Ve Tic. Ltd. řti.
Turgut Reis Cad. No:21 06570 Tandoęan-ANKARA

retici:

URSAPHARM, Industriestr., D-66129 Saarbrucken, Tel.: 06805/92 92-0,
FAKS: 06805/92 92-88, EMAIL: info@ursapharm.de

Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıřtır.