

## KULLANMA TALİMATI

**ALLERGOCROM® burun spreyi 20 mg/ml, çözelti**  
**Yalnızca burun içine uygulanır.**

**Etkin madde:** Sodyum Kromoglikat 0.14 ml'lik püskürtme içeriğinde 2.8 mg

**Yardımcı Maddeler:** Benzalkonyum klorür, sodyum edetat, glikoz monohidrat, enjeksiyonluk su

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
- Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
- Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
- Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
- Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.

### **Bu Kullanma Talimatında:**

- 1. ALLERGOCROM nedir ve ne için kullanılır?**
- 2. ALLERGOCROM'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
- 3. ALLERGOCROM nasıl kullanılır?**
- 4. Olası yan etkiler nelerdir?**
- 5. ALLERGOCROM'un saklanması**

**Başlıkları yer almaktadır.**

### **1. ALLERGOCROM nedir ve ne için kullanılır?**

ALLERGOCROM antialerjik bir ilaçtır.

ALLERGOCROM tüm yıl boyunca devam eden veya mevsimsel alerjik nezle ve saman nezlesinde uygulanmaktadır (mevsimsel alerjik rinit).

ALLERGOCROM berrak, renksiz-hafif sarı arası bir sıvıdır ve dozaj pompalı plastik bir şişe içinde bulunmaktadır. Her şişede 15 ml çözelti vardır.

### **2. ALLERGOCROM'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**

**ALLERGOCROM'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ**

Sodyum kromoglikat veya ALLERGOCROM formülünde bulunan diğer bileşenlerden birisine karşı aşırı hassasiyet (alerji) durumlarında ilaç kullanılmamalıdır.

## **ALLERGOCROM'un yiyecek ve iecek ile kullanılması**

Herhangi bir bilgi mevcut deęildir.

## **Hamilelik**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

ALLERGOCROM'un řimdiye kadar yapılan hayvan deneylerinden ve insanlar üzerindeki tecrübelerden edinilen fötusa zararlı etkisi olduęuna dair herhangi bir veri yoktur. Buna raęmen ALLERGOCROM hamilelikte sadece doktor tarafından zorunlu görüldüęü hallerde kullanılmalıdır.

*Tedaviniz sırasında hamile olduęunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

## **Emzirme**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

ALLERGOCROM etkin maddesi düşük miktarlarda anne sütüne geçmektedir. Bu sebeple ALLERGOCROM emzirme döneminde sadece doktor tarafından zorunlu görüldüęü hallerde kullanılmalıdır.

## **Ara ve makine kullanımı**

Özel güvenlik tedbirleri gerekli deęildir.

## **ALLERGOCROM'un ierięinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler**

İerięindeki benzalkonyum klorür nedeniyle iritan, deri reaksiyonlarına sebep olabilir.

## **Dięer ilalar ile birlikte kullanımı**

ALLERGOCROM ile bařka ilalar arasında etkileřim řimdiye kadar bildirilmemiřtir.

*Eęer reeteli ya da reetesiz herhangi bir ilacı řu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

## **3. ALLERGOCROM nasıl kullanılır?**

### **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklıęı için talimatlar:**

### **Uygulama yolu ve metodu:**

Doktorunuzun size önerdięi řekilde uygulayınız.

Doktor tarafından farklı bir biimde önerilmedike:

Yetiřkinler ve ocuklarda günde 4 defaya kadar her burun delięine 1 kez ALLERGOCROM uygulanır.

Günlük doz gerektiğinde artırılabilir, ancak günlük uygulama her burun deliğine 6 püskürtmeyi geçmemelidir. Klinik semptomlarda düzelme meydana gelmesi durumunda dozun basamak basamak indirilmesi uygundur.

Şikayetlerin ortadan kalkması durumunda dahi ALLERGOCROM ile alerjenlere (ev tozu, mantar küfleri, polen vs.) maruz kaldığınız sürece devam ediniz. Bazen tedavinin başlangıcında burun açıcı ve sistemik antialerjik ilaç kullanmak gerekebilir.

ALLERGO-CROM sadece burun içerisine lokal uygulama içindir. İlk kullanımda koruyucu kapak çıkartılır. Sprey mekanizması ince damlacıklar çıkana kadar basılır. Daha sonra burun adaptörü her burun deliğine yerleştirilir ve püskürtülür. Nazıkçe nefes alınır. Hijyenik sebeplerden dolayı burun adaptörü her uygulama sonrası silinir ve koruyucu kapak takılır.

#### **Değişik yaş grupları:**

**Çocuklarda kullanım:** Çocuklarda ve yetişkin hastalar arasında ayrıntılı bir güvenilirlik ve etkililik farkı saptanmamıştır.

**Yaşlılarda kullanım:** Yaşlılarda ve yetişkin hastalar arasında ayrıntılı bir güvenilirlik ve etkililik farkı saptanmamıştır.

#### **Özel kullanım durumları:**

Özel kullanımı yoktur.

*Eğer ALLERGOCROM'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuza veya eczacınıza ile konuşun.*

#### **Kullanmanız gerekenden daha fazla ALLERGOCROM kullandıysanız:**

Sodyum kromoglikat için şimdiye kadar zehirlenme belirtileri bilinmemektedir.

*ALLERGOCROM'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

#### **ALLERGOCROM'u kullanmayı unutursanız**

Tatbik edilmesi gereken dozun iki katını uygulamayınız.

İlacın kullanımına ilişkin başka sorularınız olması durumunda doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.*

#### **ALLERGOCROM'la tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler**

Herhangi bir bilgi mevcut değildir.

#### **4. Olası yan etkiler nelerdir?**

Tüm ilaçlar gibi ALLERGOCROM'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Uygulama yerinde genel rahatsızlıklar ve şikayetler:

Burun mukozasında tahriş, burun kanaması, hapşırma, baş ağrısı, aşırı hassasiyet tepkileri (kaşıntı, nefes darlığı, bronş kaslarında kramp, cilt ve mukozada şişkinlik (anjioödem)).

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

#### **5. ALLERGOCROM'un saklanması**

ALLERGOCROM'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 °C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

#### **Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.**

Ambajındaki/kartondaki/şişedeki son kullanma tarihinden sonra ALLERGOCROM'u kullanmayınız/son kullanma tarihinden önce kullanınız. Son kullanma tarihi belirtilen ayın son günüdür.

#### **Açıldıktan sonra kullanım süresi**

ALLERGOCROM ilk açıldıktan sonra sadece 12 hafta kullanılabilir.

**Ruhsat sahibi:** BİEM Tıbbi Cihaz ve İlaç San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Turgut Reis Cad. No:21 06570 Tandoğan Ankara

**Üretici:** URSAPHARM, Industriestr., D-66129 Saarbrücken, Tel.: 06805/92 92-0,

Faks: 06805/92 92-88, Email: [info@ursapharm.de](mailto:info@ursapharm.de)

*Bu kullanma talimatı ..... tarihinde onaylanmıştır.*