

## KULLANMA TALİMATI

### NEVİMOL PLUS 5/12,5 mg film kaplı tablet

Ağızdan alınır.

- **Etkin madde:** Her bir film kaplı tablet etkin madde olarak 5 mg Nebivolol'e 5,45 eşdeğer Nebivolol hidroklorür ve 12,5 mg hidroklorotiyazid içerir.
- **Yardımcı maddeler:** Hidroksipropil metilselüloz, kroskarmelloz sodyum, laktoz monohidrat, avisel pH 102, aerosil 200, mısır nişastası, magnezyum stearat, opadry II 85G18490 white (talk, titanyum dioksit (E171), lesitin (soya (E322)), polietilenglikol/makrogol) içerir.

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

### **Bu Kullanma Talimatında:**

1. **NEVİMOL PLUS nedir ve ne için kullanılır?**
2. **NEVİMOL PLUS'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **NEVİMOL PLUS nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **NEVİMOL PLUS'ın saklanması**

**Başlıkları yer almaktadır.**

## **1. NEVİMOL PLUS nedir ve ne için kullanılır?**

NEVİMOL PLUS etkin madde olarak nebivolol ve hidroklorotiyazid içerir.

Nebivolol selektif beta-bloker ilaçlar grubunda (kardiyovasküler sistem üzerinde seçici etkili) yer alan kardiyovasküler bir ilaçtır. Kalp hızındaki artışı önler, kalbin pompalama gücünü kontrol altına alır. Aynı zamanda kan damarları üzerinde genişletici etkiye sahiptir ve bu etkisi ile kan basıncında düşmeye yardımcı olur.

Hidroklorotiyazid idrar söktürücü (diüretik)'dür. Hidroklorotiyazid ürettiğiniz idrar miktarını artırarak etkisini gösterir.

NEVİMOL PLUS, yüksek kan basıncı (hipertansiyon) tedavisinde kullanılır. NEVİMOL PLUS tek başına nebivolol ya da hidroklorotiyazid ile yeterli kan basıncı kontrolü sağlanamayan hastalarda kullanılır.

NEVİMOL PLUS, beyaz renkli, bir yüzünde 5/12,5 yazılı bikonveks, yuvarlak film kaplı tabletler şeklinde, 28 ve 84 film kaplı tablet içeren PVC / Alüminyum blister ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır.

## **2. NEVİMOL PLUS'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**

### **NEVİMOL PLUS'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ**

Eğer;

- Nebivolole, hidroklorotiyazide, sülfonamid türevlerine veya NEVİMOL PLUS'ın içeriğindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlı iseniz,

Aşağıdaki durumlardan biri veya daha fazlası varsa:

- Çok düşük kalp hızı (dakikada 60 atımdan daha az)
- Düşük kan basıncı
- Kollarda ya da bacaklarda ciddi dolaşım problemleri
- Bazı diğer ciddi kalp ritim bozuklukları (örneğin 2. ve 3. derece atriyoventriküler blok, hasta sinus sendromu)
- Henüz yeni gelişmiş veya son dönemde kötüleşmiş kalp yetmezliğiniz varsa veya akut kalp yetmezliğinden kaynaklanan dolaşımsal şok nedeniyle kalbinizin çalışmasına yardımcı olmak üzere damar içine ilaç verilmesi yöntemiyle tedavi görüyorsanız
- Astım ya da hırıltı (şimdi veya geçmişte) var ise

- Tedavi edilmemiş feokromasitoma (böbreklerin üstünde, böbreküstü bezlerinde yerleşik tümör) var ise
- Karaciğer fonksiyon bozukluğu var ise
- Metabolik bozukluk (metabolik asidoz), örneğin diyabetik ketoasidoz var ise
- Ciddi böbrek problemlerinizi, anuri (idrar yokluğu)
- Gut semptomları ile birlikte yüksek asit seviyeleri
- Sürekli veya geçici olarak kan kalsiyum seviyeniz yüksekse, kan potasyum ve sodyum seviyeniz düşükse
- Bebeğinizi emziriyorsanız

### **NEVİMOL PLUS'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ**

Eğer aşağıdaki durumlardan biri sizde varsa veya gelişirse, doktorunuzu bilgilendiriniz,

- Kalp hızınız anormal bir şekilde yavaşsa
- Prinzmetal angina olarak adlandırılan ve kendiliğinden gelişen kalp krampından kaynaklanan tipte göğüs ağrınız varsa
- Tedavi edilmemiş kronik kalp yetmezliğiniz varsa
- 1. derece kalp bloğunuz (kalp ritmini etkileyen hafif düzeyde kalp iletim bozukluğu çeşidi) var ise
- Lupus eritematozus varsa (bağışıklık sisteminin bir hastalığı, örneğin vücudunuzun savunma sistemi)
- Kol veya bacaklarındaki kan dolaşımınız zayıfsa, örneğin Raynaud hastalığı veya sendromu, yürürken kramp benzeri ağrılar yaşıyorsanız
- Uzamış solunum sorunlarınız varsa
- Diyabetikseniz, NEVİMOL PLUS'ın kan şekeri üzerinde etkisi yoktur. Ancak düşük şeker düzeyinin uyarıcı bulgularını (örneğin çarpıntılar, artmış kalp hızı) gizleyebilir.
- Tiroid beziniz aşırı çalışıyorsa, NEVİMOL PLUS bu durumdan kaynaklanan kalp hızınızdaki anormal artışın belirtilerini maskeleyebilir.
- Alerjikseniz, bu ilaç alerjiniz olan polen ve diğer maddelere karşı gösterdiğiniz reaksiyonun şiddetini arttırabilir.
- Sedef hastalığınız (kabuklu pembe lekeler ile karakterize cilt hastalığı) varsa veya daha önce sedef hastalığı geçirdiyseniz
- Cerrahi bir operasyon geçirmeniz gerekiyorsa, operasyondan önce mutlaka anestezi uzmanınızı NEVİMOL PLUS kullandığımız konusunda bilgilendiriniz.

- B brek problemleriniz varsa doktorunuz b brek fonksiyonlarınızın daha da k t leřmediđinden emin olmak iin b brek fonksiyonlarınızı kontrol edecektir. Ciddi b brek problemleriniz varsa NEVİMOL PLUS kullanmayınız.
- Kan potasyum seviyeniz d ř kse,  zellikle uzun QT sendromundan (bir eřit EKG anormalliđi) dolayı oluřabilir veya dijitalis alıyorsanız (kalbinizin pompalamasına yardım eder), karaciđer sirozundan dolayı kan potasyum seviyeniz d řebilir veya di retik (idrar s kt r c  ila) tedaviden dolayı hızlı su kaybı olabilir, besinlerle veya sıvılarla yeterli potasyum almıyorsanız

NEVİMOL PLUS kan yađ seviyeleriniz ve  rik asit seviyenizi arttırabilir. Kanınızdaki elektrolit olarak adlandırılan bazı kimyasalların seviyesini etkileyebilir. Doktorunuz zaman zaman kan testi ile bu kimyasalları kontrol edecektir.

NEVİMOL PLUS'ın ieriđindeki hidroklorotiyazid ışığa veya UV ışınlarına karřı hassasiyete neden olabilir. Tedavi s resince cildinizde kızarıklık, kařıntılı b lgeler oluřtuysa doktorunuza s yleyiniz ve NEVİMOL PLUS almayı bırakınız.

Anti-doping testi: NEVİMOL PLUS anti-doping testinin pozitif ıkmasına neden olabilir.

ocuklarda ve ergenlerde NEVİMOL PLUS'ın kullanımı ile ilgili veri olmadığından, ocuklarda ve ergenlerde kullanımı  nerilmemektedir.

Bu uyarılar, gemiřteki herhangi bir d nemde dahi olsa sizin iin geerliyse l tfen doktorunuza danıřın.

### **NEVİMOL PLUS'ın yiyecek ve iecek ile kullanılması**

NEVİMOL PLUS, a karnına ya da besinlerle birlikte alınabilir, ancak tablet en iyi, bir miktar su ile birlikte alınır. NEVİMOL PLUS alırken alkol kullandıđınızda baygınlık veya bařınızın d nd đ n  hissedeabilirsiniz. Eđer bu belirtiler sizde g r l rse řarap, bira veya kokteyl dahil alkol ieren iecekler kullanmayınız.

### **Hamilelik**

*İlacı kullanmadan  nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

Hamile iseniz veya hamileliđi planlıyorsanız doktorunuza bu durumu s yleyiniz. Doktorunuz NEVİMOL PLUS yerine bařka bir tedavi  nerecektir. NEVİMOL PLUS'ın ierisindeki

hidroklorotiyazid plasentaya geçtiğinden, hamilelik süresince NEVİMOL PLUS kullanımı önerilmez. Hamilelik süresince NEVİMOL PLUS kullanımı cenine potansiyel zarar verebilir. *Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

### **Emzirme**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

Bebeğinizi emziriyorsanız veya emzirmeye başlayacaksınız, bu durumu doktorunuza söyleyiniz. Emzirme döneminde NEVİMOL PLUS kullanılmamalıdır.

### **Araç ve makine kullanımı**

NEVİMOL PLUS baş dönmesi veya yorgunluk yapabilir. Eğer bu durumdan etkileniyorsanız araç veya makine kullanmayınız.

### **NEVİMOL PLUS'ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler**

NEVİMOL PLUS her bir film kaplı tabletinde 1 mmol'den daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

NEVİMOL PLUS lesitin (soya (E322)) ihtiva eder. Eğer fıstık ya da soyaya alerjiniz varsa bu tıbbi ürünü kullanmayınız.

### **Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı**

Reçetesiz ilaçlar dahil, aldığınız veya son zamanlarda almış olduğunuz diğer ilaçları doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz. NEVİMOL PLUS ile birlikte bazı ilaçların birlikte kullanılması gerektiğinde değişiklik yapılması gerekirken (örneğin doz ayarlaması), bazı ilaçlar ile birlikte kullanılmamalıdır.

NEVİMOL PLUS ile birlikte aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız ya da alıyorsanız mutlaka doktorunuzu bilgilendiriniz:

Bu ilaçların hepsi NEVİMOL PLUS gibi kan basıncını ve/veya kalp fonksiyonunu etkileyebilir.

- Kan basıncını kontrol altına almak üzere kullanılan ilaçlar veya kalp sorunları nedeniyle kullanılan ilaçlar (amiodaron, amlodipin, sibenzolin, klonidin, digoksin,

diltiazem, dizopiramid, felodipin, flekainid, guanfasin, hidrokinidin, lasidipin, lidokain, metildopa, meksiletin, moksonidin, nikardipin, nifedipin, nimodipin, nitrendipin, propafenon, kinidin, rilmenidin, verapamil)

- Sedatif etkili ilaçlar (sinirleri yatıştırarak, sakinleştiren) veya psikoz (bir akıl hastalığı) ilaçları, örneğin amilsuprid, barbitüratlar (ayrıca sara için de kullanılırlar), klorpromazin, siyamezamin, droperidol, haloperidol, levomepromazin, narkotik ilaçlar, fenotiazin (ayrıca bulantı ve kusma için de kullanılır), pimozid, sulpid, sultoprid, tioridazin, tiaprid, trifluoperazin
- Depresyonda kullanılan ilaçlar, örneğin amitriptilin, fluoksetin, paroksetin
- Ameliyat sırasında anestezi için kullanılan ilaçlar
- Astım, burun tıkanması veya glokom (göz içi basıncında artış) ya da pupilin (göz bebeği) genişlemesi gibi bazı göz bozukluklarında kullanılan ilaçlar

Aşağıdaki ilaçlar NEVİMOL PLUS'ın etkisini veya toksisitesini arttırabilir.

- Lityum (duyu durumlarında kullanılan ilaç)
- Sisaprid (sindirim problemlerinin tedavisinde kullanılır)
- Bepridil (anjina tedavisinde kullanılır)
- Diphekanil (aşırı terleme tedavisinde kullanılır)
- Enfeksiyon tedavisinde kullanılan ilaç (infüzyon veya injeksiyon ile uygulanan eritromisin, pentamidin ve sparfloksasin, amfoterisin ve penisilin-G sodyum, halofantrin (sıtma tedavisinde kullanılır)
- Vinkamin (beyin dolaşım problemlerinin tedavisinde kullanılır)
- Mizolastin ve terfenadin (alerji tedavisinde kullanılan ilaç)
- Diüretikler ve laksatifler (idrar söktürücü ve bağırsak hareketini hızlandıran ilaçlar)
- Akut inflamasyon tedavisinde kullanılan ilaç: steroidler (örn. kortizon ve prednizon), ACTH (adrenokortikotropik hormon), ve salisilik asiden türemiş ilaçlar (örn, asetilsalisik asit/aspirin ve diğer salisilatlar)
- Karbenoksolon (mide yanması ve mide ülseri tedavisinde kullanılır)
- Kalsiyum tuzları, kemik sağlığının tedavisinde kullanılan destekleyiciler
- Kas gevşeticiler (örn, tubokurarin)
- Diaksozid (düşük kan şekeri ve yüksek kan basıncı tedavisinde kullanılan ilaç)
- Amantadin (virüs tedavisinde kullanılan ilaç)
- Siklosporin (bağışıklık sistemini baskılanması için kullanılır)

- İyonize kontrast madde (X-ray taramasında kontrastlığı sağlanması için kullanılır)
- Sisklofamid, flurourasil, metotreksat (kanser tedavisinde kullanılır)

Aşağıdaki ilaçlar NEVİMOL PLUS'ın etkisini azaltabilir;

- İnsülin ve oral antidiyabetik ilaçlar, metformin (kan şekerini düşürücü ilaçlar)
- Allopurinol, probenesid ve sulfinpirazon (Gut (damla) hastalığında kullanılır)
- Noradrenalin benzeri ilaçlar (düşük kan basıncı veya yavaş kalp atımı tedavisinde kullanılır)

Ağrı veya iltihap tedavisinde kullanılan ilaçlar (non-steroidal antiinflamatuvar ilaçlar) NEVİMOL PLUS'ın kan basıncı etkisini azaltabilir.

Aşırı mide asidi veya ülser tedavisi için, örneğin simetidin gibi bir ilaç (antasid ilaç) kullanıyorsanız NEVİMOL PLUS'ı öğün esnasında, antasid ilacı ise öğünlerin arasında almalısınız.

*Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

### **3. NEVİMOL PLUS nasıl kullanılır?**

#### **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:**

NEVİMOL PLUS'ı her zaman doktorunuzun söylediği şekilde alınız. Eğer emin değilseniz, doktorunuza ya da eczacınıza sormalısınız.

Önerilen günlük doz bir film kaplı tablet (5/12,5 mg)'tir. Tercihen günün aynı saatinde alınmalıdır.

#### **Uygulama yolu ve metodu:**

NEVİMOL PLUS ağızdan kullanım içindir.

NEVİMOL PLUS, yemeklerden önce, birlikte veya sonra alınabilir.

NEVİMOL PLUS, yeterli miktarda su ile birlikte yutulmalıdır.

#### **Değişik yaş grupları:**

##### **Çocuklarda kullanımı:**

Çocuklar ve ergenler NEVİMOL PLUS'ı kullanılmamalıdır.

**Yaşlılarda kullanımı:**

Doktorunuz kullanmanız gerek dozunuzu ayarlayacaktır. Doktorunuzun verdiği kullanma talimatlarına uyunuz.

**Özel kullanım durumları:****Böbrek yetmezliği:**

Doktorunuz hastalığınızın derecesine göre dozunuzu ayarlayacaktır. Şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalar NEVİMOL PLUS'ı kullanmamalıdır.

**Karaciğer yetmezliği:**

Karaciğer yetmezliği olan hastalar NEVİMOL PLUS'ı kullanmamalıdır.

**Kullanmanız gerekenden daha fazla NEVİMOL PLUS kullandıysanız**

Eğer kazaen daha fazla film kaplı tablet alırsanız, **hemen** doktorunuza veya eczacınıza ne yapacağınızı sorunuz veya en yakın hastanenin acil servisine müracaat ediniz. Kullanmanız gerekenden fazla aldığınızda kalp atımınız yavaşlayabilir, mideniz bulanabilir, akut kalp yetmezliği, kaslarınızda kasılmalar oluşabilir, aşırı idrara çıkma ile birlikte susuz kalma, kan basıncınız düşmesi ile birlikte olası bayılma, kalp ritim düzensizlikleri (özellikle NEVİMOL PLUS'ın yanında ayrıca bir dijitalis veya kalp ritim problemlerin tedavisi için bir ilaç alıyorsanız) nefes almada zorluk veya hırıltılı nefes alma yaşayabilirsiniz.

*NEVİMOL PLUS'tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

**NEVİMOL PLUS'ı kullanmayı unutursanız**

Eğer ilacınızı almayı unuttuysanız ve bunu almanız gereken zamandan kısa bir süre sonra hatırlarsanız ilacınızı her zamanki gibi alınız. Ancak, almanız gereken zamandan çok uzun zaman geçmişse unuttuğunuz dozu atlayın ve ilacınızı ertesi gün aynı saatte almaya devam edin. Ancak bir kez daha doz atlamaktan kaçınınız.

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.*

**NEVİMOL PLUS ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler**

Her zaman, NEVİMOL PLUS tedavinizi kesmeyiniz önce doktorunuza danışınız.

Bu ilacın kullanımıyla ilgili başka sorularınız olursa doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.



#### **4. Olası yan etkiler nelerdir?**

Tüm ilaçlar gibi NEVİMOL PLUS'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

**Aşağıdakilerden biri olursa, NEVİMOL PLUS'ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:**

- Yüz, ağız ve boğazda şişme ve bunlara eşlik edebilecek nefes darlığı ile birlikte oluşabilen şiddetli alerjik reaksiyonlar
- Kalp yetmezliği
- Kalp atımının yavaşlaması
- Kalp iletim bozukluğu
- Tromboz (kanın damarda ya da kalpte pıhtılaşması)
- Emboli (damar tıkaçı)
- Akciğer hastalığı
- Akciğerlerde sıvı birikimi
- Kalp çarpıntısı

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin NEVİMOL PLUS'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

**Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:**

- Yürürken bacaklarda ağrı, gerginlik ve güçsüzlük hissi
- Düşük tansiyon
- Oturur ya da yatar pozisyonda ayağa kalkarken görülen kan basıncı düşüklüğü
- Nefes darlığı
- Bronşların daralması
- Sedef hastalığı
- Şeker hastalığı
- Uyuşma, kayıtsızlık
- Bayılma

- Ruhsal çöküntü (depresyon)
- İştahsızlık, aşırı susama, kusma ile seyreden böbrek iltihabı
- Böbrek fonksiyon bozukluğu
- Deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık
- Kan damarlarında iltihap
- Safra kesesi iltihabı
- Tükürük bezi iltihabı
- Pankreas iltihabı
- Nesneleri sarı renkte görme
- Uzağı net görememe (miyop)
- Alyuvar sayısında azalma, kandaki parçacık hücre sayısında azalma, ürik asit miktarının yükselmesi, kanda kalsiyum miktarının yükselmesi, kanda magnezyum seviyesinin azalması, kanda sodyum miktarının azalması, kanda potasyum miktarının azalması, beyaz kan hücre sayısında azalma, kanda amilaz enziminin (pankreatik enzim) yükselmesi, kemik iliğinden yeni kan hücrelerinin oluşumunun azalması
- Kan kolesterol ve trigliserit seviyelerinde yükselme
- Kan şeker seviyesinin artması, diyabet (şeker hastalığı), metabolik alkaloz (metabolizma bozukluğu)
- Kansızlık
- Sarılık
- Denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi
- Bilinç düzeyinde azalma

Bunların hepsi ciddi yan etkilere sahiptir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

**Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:**

- Baş ağrısı
- Baş dönmesi
- Sersemlik
- Bulanık görme, gözyaşı salgısında azalma
- Kızarıklık
- Kurdeşen

- İshal
- Kabızlık
- Kusma
- Bulantı
- Uyku bozukluğu
- Gaza bağlı mide bağırsakta şişkinlik
- Midede huzursuzluk hissi
- Cinsel isteksizlik
- Ağız kuruluğu
- Cilt döküntüsü
- Yorgunluk
- Kâbus
- Susama
- Ateş
- Görme bozuklukları
- Kas ağrısı, kas spazmı
- Bacaklarda şişkinlik
- Karın ağrısı

Bunlar NEVİMOL PLUS'ın hafif yan etkileridir.

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

#### **5. NEVİMOL PLUS'ın saklanması**

*NEVİMOL PLUS'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve orijinal ambalajında saklayınız.*

25 °C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

#### **Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.**

*Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra NEVİMOL PLUS'ı kullanmayınız.*

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz NEVİMOL PLUS'ı kullanmayınız.

***Ruhsat Sahibi :*** Mentis İlaç San. Tic. Ltd. Şti.  
Florya Asfaltı, Florya İş Merkezi  
B Blok No:88/6  
Bakırköy / İSTANBUL  
Tel: 0 212 481 79 52  
Faks: 0 212 481 79 52  
e-mail: info@mentisilac.com.tr

***Üretim Yeri :*** Neutec İlaç San. Tic. A.Ş.  
1. OSB. 1. Yol No 3  
Adapazarı / SAKARYA

*Bu kullanma talimatı 13.02.2013 tarihinde onaylanmıştır.*