

KULLANMA TALİMATI

EBERNET® % 1 Krem

Deriye sürülerek uygulanır.

- **Etkin madde:** 1 g krem 10 mg eberkonazol (nitrat formunda) içerir.
- **Yardımcı maddeler:** Metil parahidroksibenzoat, setoestearil alkol, poliglikol yağ asitleri C₁₂-C₂₀ esterleri, desil oleat, propilenglikol, formaldehit gliserin, gliserol, poliakrilamid, trolamin ve saf su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük doz kullanmayınız.***

Bu Kullanma Talimatında :

- 1. EBERNET® nedir ve ne için kullanılır?**
- 2. EBERNET® kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
- 3. EBERNET® nasıl kullanılır?**
- 4. Olası yan etkiler nelerdir?**
- 5. EBERNET®'in saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. EBERNET® nedir ve ne için kullanılır?

EBERNET®, deri üzerinde kullanımına yönelik olarak 30 gramlık tüplerde sunulmaktadır.

EBERNET®'in etken maddesi olan eberkonazol, imidazolik türevler olarak tanımlanan bir ilaç grubuna dahildir.

EBERNET®, deride rastlanan mantar infeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.

2. EBERNET®'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

EBERNET®'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

- Eğer eberkonazole veya aynı sınıftan diğer mantar öldürücülere veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı (yardımcı maddeler listesine bakınız) aşırı duyarlılığınız var ise kullanmayınız.

EBERNET®'i ařađıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

- EBERNET® uygulandıđında gözlerle temas halinde gözlerinizi bol su ile yıkayınız.
- EBERNET®'in kullanılmasından sonra deride tahriř oluřursa doktora bařvurunuz.
- Deride tahriřini artırabileceđinden zarar gören bölgenin hava almasını önleyen bandaj kullanmayınız. EBERNET®'i mukoza (ađız, burun gibi bazı organların iç yüzlerini kaplayan ve salgı üreten doku tabakası) üzerine uygulamayınız.

Bu uyarılar geçmiřteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danıřınız.

EBERNET®'in yiyecek ve iecek ile kullanılması

EBERNET®'in, uygulama yolu itibariyle, yiyecek ve ieceklerle etkileřimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Doktorunuz, özel durumunuzu belirleyecek ve hamilelik sırasında bu ilacı kullanıp kullanmama durumunu size söyleyecektir.

Tedaviniz sırasında hamile olduđunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Doktorunuz, özel durumunuzu belirleyecek ve emzirme sırasında bu ilacı kullanıp kullanmama durumunu size söyleyecektir.

Ara ve makine kullanımı

EBERNET®'in ara ve makine kullanma yeteneđiniz üzerinde bilinen bir etkisi yoktur.

EBERNET®'in ieriđinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

EBERNET®'in bileřiminde bulunan metil parahidroksibenzoat (E214) alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiř), setostearil alkol ise lokal deri reaksiyonlarına (kontakt dermatit gibi) sebebiyet verebilir. Ayrıca ieriđindeki propilen glikol ciltte iritasyona neden olabilir.

EBERNET®'in bileřiminde gliserol de bulunmaktadır; ancak uygulama yolu itibariyle herhangi bir olumsuz etki beklenmemektedir.

Diđer ilalar ile birlikte kullanımı

EBERNET®'i doktorunuza veya eczacınıza danıřmadan deri kullanımına yönelik diđer ilalarla birlikte kullanmayınız.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. EBERNET® nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

EBERNET® 4 hafta boyunca günde 2 defa (sabah ve akşam) uygulanmalıdır.

Uygulama yolu ve metodu:

EBERNET®'i hastalıklı deri bölgesi ve çevresini kaplayacak miktarda uygulayınız ve hafif bir masaj ile yayın. Derinin kıvrımlı yerlerindeki enfeksiyonlarda ıslanıp yumuşamayı önlemek için az miktarda krem uygulanmalıdır. Her kullanımdan sonra tüpü iyice kapatınız. Yeni bir enfeksiyon ihtimalini engellemek için hijyene dikkat ediniz.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı:

EBERNET®'in çocuklardaki güvenlilik ve etkinliği incelenmemiştir.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlı hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

Doktorunuz EBERNET® ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz, çünkü istenen sonucu elde edemezsiniz.

Eğer EBERNET®'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla EBERNET® kullandıysanız:

EBERNET®'ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

EBERNET®'i kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi EBERNET®'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

- Uygulama bölgesinde kızarıklık
- Uygulama bölgesinde kaşıntı
- Egzama (kaşıntılı deri iltihabı)
- Deride döküntü
- Folikülit (kıl köklerinin iltihabı)
- Cerahatli sivilce

Bunlar EBERNET®'in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. EBERNET®'in saklanması

EBERNET®'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra EBERNET®'i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz EBERNET®'i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

Mustafa Nevzat İlaç Sanayii A.Ş.
Prof. Dr. Bülent Tarcan Sok., Pak İş Merkezi No: 5/1,
34349 Gayrettepe/İstanbul
Tel: 0 212 337 38 00
Fax: 0 212 337 38 01
e-mail: info@mn.com.tr

Üretici:

Laboratorios S.A.L.V.A.T., S.A.
C/ Gall 30-36
08950-Esplugues de Llobregat (Barselona)
İSPANYA

Bu kullanma talimatı 16/06/2009 tarihinde onaylanmıştır.