

KULLANMA TALİMATI

BUTAMCOD 7.5 mg/ 5ml Şurup

Ağızdan alınır.

- **Etkin madde:** Her 5 ml şurupta 7.5 mg Butamirat sitrat
- **Yardımcı maddeler:** Sorbitol % 70, sakarin sodyum, benzoik asit, etanol, vanilin, sükröz, gliserol ve saf su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

1. ***BUTAMCOD nedir ve ne için kullanılır?***
2. ***BUTAMCOD'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler***
3. ***BUTAMCOD nasıl kullanılır?***
4. ***Olası yan etkiler nelerdir?***
5. ***BUTAMCOD'un saklanması***

Başlıkları yer almaktadır.

1. BUTAMCOD nedir ve ne için kullanılır?

BUTAMCOD, 100 ml'lik kahverengi renkli şişede 5 ml'lik ölçekle beraber sunulan ve her ölçekte etkin madde olarak 7.5 mg butamirat sitrat içeren bir şuruptur.

Değişik nedenlere bağlı akut öksürük, cerrahi girişimler ve bronkoskopi için ameliyattan önce ve sonra öksürüğün kesilmesinde kullanılır.

2. BUTAMCOD'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

BUTAMCOD'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Butamirat sitrata veya BUTAMCOD'un içeriğindeki maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa bu ilacı kullanmayınız.

BUTAMCOD'u ařağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Hamileliđinizin ilk üç ayında doktorunuza danıřmadan kullanmayınız.

Bu uyarılar geęmiřteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geęerliyse, lütfen doktorunuza danıřınız.

BUTAMCOD'un yiyecek ve iecek ile kullanılması

BUTAMCOD yemeklerden önce ya da sonra veya yemeklerle birlikte kullanılabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Gerekli olduđu durumlarda doktorunuzun kontrolü altında kullanınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduđunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza ya da eczacınıza danıřınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

BUTAMCOD'un anne sütüne geip gemediđi bilinmediđinden emziren annelerde dikkatli kullanılmalıdır.

Ara ve makine kullanımı

Ara ve makine kullanım yeteneđi üzerine etkisi hakkında alıřma yapılmamıřtır. Butamirat sitrat, bař dönmesi ve uyuklama hali yapabileceđinden, ara ya da makine kullanırken dikkatli olunuz.

BUTAMCOD'un ieriđinde bulunan bazı maddeler hakkında önemli bilgiler

İeriđinde bulunan sorbitol nedeniyle, eđer daha önceden doktorunuz tarafından bazı řekerlere karřı dayanıksızlıđınız olduđu söylenmiře bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geiniz.

BUTAMCOD'da hacmin %5,25'i (a/h) kadar etanol (alkol) vardır; örneđin, her dozda 787,5 mg'a kadar, her dozda 15,75 ml biraya eřeđer, her dozda 7,875 ml řaraba eřeđer gibi. Alkol bađımlılıđı olanlar için zararlı olabilir. Hamile veya emziren kadınlar, ocuklar ve karaciđer hastalıđı ya da epilepsi gibi yüksek risk grubundaki hastalar için dikkate alınmalıdır.

BUTAMCOD, sukroz ierir. Eđer daha önceden doktorunuz tarafından bazı řekerlere karřı dayanıksızlıđınız olduđu söylenmiře bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geiniz.

BUTAMCOD, her dozunda (5 ml) 580 mg gliserol ierir. Bu durumun hastalar üzerinde olumsuz bir etkisi yoktur.

BUTAMCOD, her dozunda 0.043 mmol (1.0 mg) sodyum ihtiva eder. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastaları etkilemez.

BUTAMCOD, her dozunda (5 ml) 5.2 mg benzoik asit içerir. Bu durumun hastalar üzerinde olumsuz bir etkisi yoktur.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

BUTAMCOD'un herhangi bir ilaçla etkileşimde bulunduğu dair kanıt yoktur.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. BUTAMCOD nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

BUTAMCOD yetişkinlerde, yemeklerden önce ya da sonra veya yemeklerle birlikte, günde 4 defa 3 ölçek (15 ml) olarak kullanılır.

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde belirtilen dozlarda kullanınız.

Uygulama yolu ve metodu

BUTAMCOD sadece ağızdan kullanım içindir.

Ölçek kaşığı kullanılarak şurup içilir.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

3 yaşın üstündeki çocuklarda	Günde 3 defa 1 ölçek (1 ölçek = 5 ml)
6 yaşın üstündeki çocuklarda	Günde 3 defa 2 ölçek
12 yaşın üstündeki çocuklarda	Günde 3 defa 3 ölçek

Yaşlılarda kullanımı

BUTAMCOD'un yaşlı hastalardaki güvenilirlik ve etkinliği incelenmemiştir.

Özel kullanım durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği

BUTAMCOD'un böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalardaki güvenilirlik ve etkinliği incelenmemiştir.

Eğer BUTAMCOD'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla BUTAMCOD kullandıysanız:

BUTAMCOD'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Aşırı dozda BUTAMCOD alınması halinde uyuklama, bulantı, kusma, ishal, baş dönmesi ve kan basıncına düşme gibi belirtiler görülebilir.

BUTAMCOD'u kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

BUTAMCOD ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, BUTAMCOD'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa BUTAMCOD'u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Deri döküntüleri

Bu çok ciddi bir yan etkidir. Eğer bu yan etki sizde mevcut ise, sizin BUTAMCOD'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etki oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Hafif deri döküntüsü

Bu ciddi bir yan etkidir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

- Mide bulantısı
- İshal
- Baş dönmesi

Bunlar BUTAMCOD'un hafif yan etkileridir. Bu yan etkiler doz azaltıldığında veya tedavi kesildiğinde kaybolur.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. BUTAMCOD'un saklanması

BUTAMCOD'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25 °C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki/kartondaki/şışedeki son kullanma tarihinden sonra BUTAMCOD'u kullanmayınız./Son kullanma tarihinden önce kullanınız.

Eđer üründe ve/veya ambalajında bozukluk fark ederseniz BUTAMCOD'u kullanmayınız.

Ruhsat sahibi : KOÇAK FARMA İlaç ve Kimya Sanayi
Bağlarbaşı, Gazi Cad., No:64-66 Üsküdar / İSTANBUL

Üretici : KOÇAK FARMA İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi, Çerkezköy / TEKİRDAĞ

Bu kullanma talimatı onaylanmıştır.

(25/05/2009)