

KULLANMA TALİMATI

NovoRapid® Penfill® 3 ml, 100 U/ml

Kartuş içinde enjeksiyonluk çözelti

Deri altına uygulanır.

- **Etkin madde:** İnsülin aspart, rDNA. Saccharomyces cerevisiae kullanılarak rekombinant DNA teknolojisi ile üretilmiştir. 1 ml'si 100 U (3.5 mg) insülin aspart içerir. Bir kartuş 300 U'ye eşdeğer 3 ml içermektedir. 1 ünite insülin aspart 6 nmol, 0.035 mg tuzsuz anhidr insülin aspart'a eşdeğerdir.
- **Yardımcı maddeler:** Gliserol, fenol, metakrezol, çinko klorür, disodyum fosfat dihidrat, sodyum klorür, hidroklorik asit, sodyum hidroksit ve enjeksiyonluk sudur.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu kullanma talimatında:

1. **NovoRapid Penfill Nedir ve Ne İçin Kullanılır?**
 2. **NovoRapid Penfill'i Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler**
 3. **NovoRapid Penfill Nasıl Kullanılır?**
 4. **Olası Yan Etkiler Nelerdir?**
 5. **NovoRapid Penfill'in Saklanması**
- Başlıkları yer almaktadır

1. NovoRapid Penfill Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

NovoRapid, diyabetin (şeker hastalığının) tedavisinde kullanılan bir insülin analogudur. Penfill adı verilen ve enjeksiyon sistemine uyumlu 3 ml'lik kartuşlar halinde bulunur.

NovoRapid, erişkinlerde ve 2 yaş ve üzerindeki çocuklarda kullanılabilen hızlı etkili bir insülin analogudur. İlacı aldıktan 10-20 dakika sonrasında kan şekerinizi düşürmeye başlar, maksimum etkisini 1-3 saat içinde gösterir ve etkisi 3 ile 5 saat kadar sürer. Bu kısa ekisinden dolayı NovoRapid normalde, orta ya da uzun etkili insülin preparatları ile birlikte kullanılmalıdır.

2. NovoRapid Penfill'i Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

NovoRapid'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

- Eğer insülin aspart, metakrezol veya NovoRapid içinde bulunan herhangi bir maddeye karşı **alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa**. NovoRapid'in içinde bulunan yardımcı maddeler için yardımcı maddeler bölümüne, alerji belirtilerini öğrenmek için 4. Olası Yan Etkiler Nelerdir?'e bakınız.
- **Eğer kan şekerinizin çok düştüğünü (hipoglisemi) hissediyorsanız.** Hipoglisemi hakkında daha detaylı bilgi için 4. Olası Yan Etkiler Nelerdir?'e bakınız.

NovoRapid'i ařağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

- Eęer bbrek veya karacięer ile ilgili bir **probleminiz varsa**, doktorunuz inslin dozunuzu deęiřtirebilir.
- **Eęer alkol alıyorsanız (bira, řarap vb);** kan řekeri dřmesi (hipoglisemi) belirtilerine dikkat ediniz ve alkol a karnına almayınız.
- Eęer her zamankinden fazla **egzersiz yaparsanız** veya her zamanki diyetinizde bir deęiřiklik yapmak isterseniz.
- **Eęer hastaysanız;** inslin almaya devam ediniz. Ancak hastalık esnasında inslin ihtiyacınız deęiřebilir.
- **Eęer enfeksiyonunuz, ateřiniz varsa ya da ameliyat olmuř iseniz,** her zamankinden daha fazla insline ihtiyacınız olabilir.
- **Eęer ishal, kusma varsa veya her zamankinden daha az yemek yiyorsanız** her zamankinden daha az insline ihtiya duyabilirsiniz.
- **Eęer yurtdiřına seyahat edecekseniz;** lkeler arasındaki saat farkı nedeniyle, inslin ihtiyacınız ve enjeksiyon zamanlarınız deęiřebilir. Seyahat ncesinde doktorunuza danıřınız.

Bu uyarılar gemiste ki herhangi bir dnemde dahi olsa sizin iin geerliyse ltfen doktorunuza danıřın.

NovoRapid Penfill'in yiyecek ve iecek ile kullanılması

Etkisinin abuk başlaması nedeniyle, NovoRapid'i genellikle yemekten hemen nce kullanınız. NovoRapid'i gerektięinde yemekten hemen sonra da uygulayabilirsiniz.

Hamilelik

- *İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*
- NovoRapid hamilelik sırasında kullanılabilir. İnslin dozunuzun hamilelik sırasında ve doęumdan sonra ayarlanması gerekebilir. Diyabetinizin dikkatli bir řekilde kontrol ve hipoglisemiden korunmanız bebeęinizin saęlıęı iin de ok nemlidir.
- *Tedaviniz sırasında hamile olduęunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danıřınız.*

Emzirme

- *İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*
- Emzirme dneminde NovoRapid tedavisinde herhangi bir kısıtlama yoktur. Emziren annelerin inslin kullanmasının bebek iin hibir riski yoktur. Bununla birlikte NovoRapid dozunun ayarlanması gerekebilir

Ara ve makine kullanımı

Ara ve makine kullanıyorsanız; kan řekeri dřmesi (hipoglisemi) sırasında, iře yoęunlaşma ve tepki verme yeteneęiniz azalabilir. Ltfen kendinizi ve bařkalarını riske atabileceęiniz iin bu ihtimali her zaman aklınızda tutunuz (rneęin ara ve makine kullanma). Kan řekerinizin dřtęn hissederseniz hibir zaman ara veya makine kullanmayınız. ok sık kan řekeri dřmesi (hipoglisemi) yařıyorsanız veya kan řekeri dřmesini (hipoglisemi) fark etmekte glk ekiyorsanız doktorunuzdan ara veya makine kullanıp kullanamayacaęınız konusunda bilgi alınız.

NovoRapid, hızlı etki bařlangıcına sahiptir, dolayısıyla kan řekeri dřmesini (hipoglisemi), znr insan inslinine gre enjeksiyondan sonra daha erken yařayabilirsiniz.

2 yaşın altındaki çocuklarda NovoRapid ile klinik deneyim yoktur.

NovoRapid, çocuklarda hızlı etki başlangıcı daha iyi olacağı düşünüldüğü durumlarda çözünür insan insülini yerine kullanılabilir. Örneğin, yemekle ilişkili enjeksiyonun zamanı ile ilgili zorluklar gibi.

NovoRapid'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

NovoRapid metakrezol içermektedir ve nadiren alerjik reaksiyonlara neden olabilir. NovoRapid pH ayarlayıcısı olarak hidroklorik asit ve sodyum hidroksit içerir.

Bu tıbbi ürün her ml'sinde 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum (0.58 mg/ml sodyum klorür, 1.25 mg/ml disodyum fosfat dihidrat ve 2.2 mg/ml sodyum hidroksit) ihtiva eder. Sodyuma bağlı herhangi bir olumsuz etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Pek çok ilaç glukozun vücudundaki durumunu etkiler ve bu da insülin dozunu etkileyebilir. Aşağıda insülin tedavinizi etkileyebilecek en yaygın kullanılan ilaçların listesi yer almaktadır.

Ayrıca eğer aşağıdaki ilaçlar arasında kullandıklarınız bulunuyorsa **insülin gereksinimiz değişebilir**:

Oral antidiyabetik ilaçlar, monoamin oksidaz (MAO) inhibitörleri, beta blokör ajanlar, anjiyotensin dönüştürücü enzim (ADE) inhibitörleri, salisilatlar, anabolik steroidler ve glukokortikoidler (topikal kullanılanlar hariç) oral kontraseptifler, tiyazidler, tiroid hormonları, sempatomimetikler, danazol, oktreotid ve sülfonamidler.

Beta blokörler hipoglisemi semptomlarını maskeleyebilirler.

Alkol insülinin hipoglisemik etkisini artırıp, süresini uzatabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. NovoRapid Penfill Nasıl Kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

İnsülin ihtiyacınız için doktorunuz ile görüşünüz ve tavsiyelerine mutlaka uyunuz. Bu kullanma talimatı ilaca ait genel bilgileri içermektedir.

Eğer doktorunuz insülininizi bir çeşitten diğerine değiştirdiyse, doktorunuz tarafından doz ayarlamasının yapılması gerekebilir.

Hipoglisemiden kaçınmak için, enjeksiyonun 10 dakikası içinde yemeğinizi yemeli ya da karbonhidrat içeren bir yiyecek atıştırmanızdır. NovoRapid gerektiğinde yemekten önce kullanmak yerine yemekten hemen sonra da kullanılabilir.

Kan glukozunuzu düzenli olarak ölçmeniz önerilmektedir.

NovoRapid'i kullanmadan önce:

- Doğru insülini kullandığınızdan emin olmak için **etiketini kontrol ediniz.**
- Lastik piston (tıpa) tarafı da dahil olmak üzere kartuşu **her zaman kontrol ediniz.** Herhangi bir hasar oluşmuşsa veya lastik piston ile beyaz etiket bandlı kısım arasında bir boşluk varsa kartuşu kullanmayınız. Kartuşu aldığınız yere iade ediniz. Daha ayrıntılı bilgi için enjeksiyon sistemi kullanım talimatına bakınız.
- Lastik membranı alkollü pamuk ile **dezenfekte ediniz.**
- Kontaminasyonu önlemek için her enjeksiyon için **her zaman yeni bir iğne ucu kullanınız.**

NovoRapid ařařıdaki durumlarda kullanılmamalıdır:

- **Kartuř ya da kartuřu ieren enjeksiyon sistemi dūřerse, kırılırsa veya hasar gōrürse**, dıřarıya insülin sızma tehlikesi vardır.
- **Doęru řekilde saklanmamıřsa** veya dondurulmuřsa. (bakınız bōlüm 5 NovoRapid Penfill'in Saklanması)
- **İnsülin berrak ve renksiz gōrünmüyorsa**

NovoRapid deri altına enjeksiyon ya da pompa sisteminde sürekli infüzyon iindir. NovoRapid ayrıca saęlık meslek mensupları tarafından doktorun yakın gözetiminde damar iine (intravenöz) de uygulanabilir.

Enjeksiyon bölgesinde řiřlik oluřumundan (bakınız bōlüm 4 Olası Yan Etkiler Nelerdir?) kaınmak iin, **enjeksiyon yerini sürekli deęiřtiriniz**. Enjeksiyon iin en iyi bölgeler: Karnınızın ön kısmı, kalalarınız, uyluęunuz veya üst kolunuzun ön kısımlarıdır. Karın çevrenize yakın yere enjeksiyon yaparsanız, insülininiz daha abuk etki gösterir.

NovoRapid Penfill, Novo Nordisk insülin enjeksiyon sistemleri ve NovoFine ięne uları ile kullanılmak üzere tasarlanmıřtır. Eęer NovoRapid Penfill ve bařka bir insülin kartuřu ile tedavi ediliyorsanız, her insülin eřidi iin ayrı enjeksiyon sistemi kullanmalısınız.

NovoRapid Penfill'i tekrar doldurmayınız.

Kartuřun kaybolması ya da hasar gōrmesine tedbir olarak yanınızda her zaman yedek insülin enjesiyon sistemi tařıyınız.

NovoRapid Penfill nasıl enjekte edilmeli?

- **İnsülini** deri altına **enjekte ediniz**. Enjeksiyon sistemi kullanım kılavuzunda tanımlandıęı ve doktorunuzun size tavsiye ettięi enjeksiyon teknięini kullanınız.
- Bütün insülini enjekte ettięinizden emin olmak iin, **ięneyi** en az 6 saniye **derinizin altında tutunuz**.
- **Her enjeksiyondan sonra** ięneyi ıkardıęınızdan emin olunuz ve ięneyi atınız ve ięnesiz NovoRapid'i saklayınız. Yoksa, sıvı sızabilir ve insülinin dozunda deęiřmeye neden olabilir.

Pompa sisteminde infüzyon řeklinde kullanımı iin:

NovoRapid pompada kullanıldıęında bařka bir insülin ile asla karıřtırmayınız.

NovoRapid'in pompa siteminde kullanımı ile ilgili olarak doktorunuzun talimat ve önerilerine uyunuz. NovoRapid'i pompa sisteminde kullanmadan önce, kapsamlı bir kullanım talimatı ve geliřebilecek hastalık, ok yüksek ya da ok dūřük kan řekeri durumlarında veya pompa sistemi alıřmadıęında neler yapacaęınız konusundaki bilgileri almalısınız.

- **ięneyi batırmadan önce**, ellerinizi ve ięneyi batıracaęınız yeri, infüzyon bölgesinde enfeksiyon oluřumunu engellemek iin su ve sabun ile yıkayınız.
- **Yeni rezervuar doldurduęunuzda**, enjektör ya da tüpte büyük bir hava kabarcıęı bırakmadıęınıza emin olunuz.
- **İnfüzyon seti (tüp ve ięne) deęiřimini**, infüzyon seti ile birlikte saęlanan ürün bilgisindeki talimatlara göre yapınız.

İnsülin infüzyonundan fayda saęlayabilmek iin ve insülin pompasındaki olası fonksiyon bozukluęunu farkedebilmek iin, kan glukozunuzu düzenli olarak ölçmeniz önerilmektedir.

Eğer insülin pompa sistemi bozulursa:

Pompa sisteminin bozulduğu durumlarda kullanmanız için yanınızda her zaman deri altı enjeksiyonu için alternatif insülin bulundurunuz.

Değişik yaş grupları:**Çocuklarda kullanımı**

NovoRapid 2 yaş ve üzerindeki çocuklarda kullanılabilen hızlı etkili bir insülin analogudur. 2 yaşın altındaki çocuklarda NovoRapid ile klinik deneyim yoktur.

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlı hastalarda dikkatli glukoz takibi ve insülin aspart da dahil, insülinlerde bireysel doz ayarlaması gerekli olabilir.

Özel kullanım durumları**Böbrek/karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanımı**

Diğer bütün insülinlerde olduğu gibi, özellikle diyaliz tedavisi alan hastalarda, insülin aspart bireysel gereksinimlere göre titre edilmelidir.

Karaciğer yetmezliği olan bireylerde dikkatli glukoz takibi ve doz ayarlaması önerilmektedir.

- Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.
- İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.
- Doktorunuz NovoRapid Penfill ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz, çünkü kan şekeri yükselmesine neden olabilir. (Bkz. “Kan şekeri yükselmesinin (Hipergliseminin) nedenleri” ve “Kan şekerinin çok yükselmesi”)
- *Eğer NovoRapid Penfill'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.*

Kullanmanız gerekenden daha fazla NovoRapid kullandıysanız:

NovoRapid'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

NovoRapid Penfill'i kullanmayı unutursanız:

NovoRapid Penfill'i kullanmayı unutursanız kan şekeri yükselmesi (hiperglisemi) gelişebilir. *Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.* Böyle bir durumda lütfen doktorunuza danışınız.

Kan şekeri yükselmesinin (Hipergliseminin) nedenleri

- İnsülininizi almayı unutmanız
- Sürekli olarak ihtiyacınızdan daha az insülin almanız
- Enfeksiyon veya ateş
- Her zamankinden daha fazla yemek yemeniz.
- Her zamankinden daha az egzersiz yapmanız.

Kan şekerinin çok yükselmesi;

Kan şekeriniz çok yükselebilir (bu duruma hiperglisemi adı verilir).

Belirtiler yavaş yavaş ortaya çıkar. Bu belirtiler; sık idrara çıkma, susama, iştah kaybı, hasta hissetme (bulantı veya kusma), sersemlik veya yorgunluk, kızarıklık, deri kuruluğu, ağız kuruluğu, nefeste meyvemsi (aseton) kokudur.

Bu belirtilerden herhangi birini farkederseniz, kan şekerinizi ve mümkünse idrar ketonunuzu ölçtürmelisiniz, daha sonra hemen doktorunuza danışınız.

Bu belirtiler diyabetik hastalarda görülebilen kanda keton cisimciklerinin artmasına bağlı patolojik ciddi durumun (diyabetik ketoasidoz) belirtisi olabilir. Eğer tedavi edilmezse diyabetik komaya ve ölüme neden olabilir.

NovoRapid Penfill ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Eğer NovoRapid Penfill ile tedavi sonlandırılırsa, kan şekeriniz çok yükselebilir. Bu kan şekeri yükselmesi (hiperglisemi) olarak isimlendirilir (Bkz. NovoRapid Penfill'i kullanmayı unutursanız).

4. Olası Yan Etkiler Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, NovoRapid'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, NovoRapid Penfill'i kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Kan şekeri düşmesi (hipoglisemi)
- Vücudunuzda yaygın alerjik belirtiler oluşursa
- Kendinizi aniden kötü hisseder ve terlerseniz, bulantı ve kusma gibi belirtiler, soluk almada güçlük, çarpıntı, sersemlik hissederseniz.

Çok nadiren NovoRapid Penfill veya içindeki maddelerden birine karşı **ciddi alerjik reaksiyon** (sistemik alerjik reaksiyon olarak bilinir) **belirtileri oluşabilir**. (Bkz. Bölüm 2 NovoRapid Penfill'i Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler)

- **Kan şekerinin çok düşmesi;**

Bilincinizi yitirdiğiniz kan şekeri düşüklüğü durumuna **ağır kan şekeri düşmesi** denir ve eğer bu durum tedavi edilmezse beyin hasarına (kalıcı veya geçici) hatta ölüme neden olabilir. Bayılmanıza neden olan kan şekeri düşmesinde glukagon kullanımı gerekebilir (Bkz. Glukagon kullanımı).

Kan şekeri düşmesinin nedenleri

Eğer kan şekeriniz çok düşerse hipoglisemiye girersiniz. Bunun nedeni;

- Çok fazla insülin almanız
- Çok az yemeniz veya öğün atlamanız
- Her zamankinden fazla egzersiz yapmanız olabilir.

- Kan şekeri düşmesi (hipoglisemi).

Kan şekeri düşmesi belirtileri ve yapmanız gerekenler;

Kan şekeri düşmesinin ilk belirtileri, aniden ortaya çıkabilir. Belirtiler; soğuk terleme, soğuk ve soluk deri, baş ağrısı, çarpıntı, hasta hissetme, aşırı açlık hissi, görmede geçici değişiklikler, sersemlik, anormal derecede yorgun hissetme ve bitkinlik, sinirlilik veya titreme, endişe hissi, bilinç bulanıklığı, dikkatini toplama güçlüğüdür.

Yukarda bildirilen belirtilerden herhangi birini hissederseniz, hemen bir kesme şeker veya şekerli bir yiyecek (şekerleme, bisküvi, meyve suyu) yemeli/içmeli ve daha sonra dinlenmelisiniz.

Kan şekeri düşmesi belirtilerini fark ederseniz **insülin kullanmayınız**.

Acil durumlar için yanınızda şekerleme, kesme şeker, bisküvi veya küçük meyve suyu bulundurunuz.

Akrabalarınıza, arkadaşlarınıza ve yakın iş arkadaşlarınıza, eğer bayılırsanız, sizi yan çevirmelerini ve hemen tıbbi yardım çağrılarının gerektiğini söyleyiniz. Boğulmanıza neden olabileceğinden size ağızdan hiç bir yiyecek ve içecek vermemeleri gerektiğini bildiriniz.

-Eğer bayılmanıza neden olan kan şekeri düşmesi ataklarınız oluyorsa veya tekrarlıyorsa doktorunuza danışınız. İnsülinin miktarının, zamanlamasının, yiyecek veya egzersizinizin ayarlanması gerekiyor olabilir.

Glukagon kullanımı

Nasıl uygulanacağını bilen bir kişi tarafından glukagon hormonu size enjekte edilerek bilinç kaybınız hızla düzeltilebilir. Glukagon enjekte edildiğinde, bilinciniz açılır açılmaz ağız yoluyla şeker veya şekerli yiyecekler de almalısınız. Glukagon tedavisine cevap alınmadığı durumlar hastanede tedavi edilmelidir.

Glukagon enjeksiyonundan sonra acil servise veya doktorunuza başvurarak kan şekeri düşmesi nedenini bulmanız gerekir.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilidir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini farkederseniz, hemen doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Şeker hastalığı ile ilişkili gözün ağ tabakasında (retina) oluşan iltihap dışı değişiklik (Diyabetik retinopati):

Eğer diyabetik retinopatiniz varsa ve kan glukoz kontrolünde çok hızlı iyileşme gerçekleştiyse, retinopati kötüleşebilir. Bu konuda doktorunuza danışınız. Diyabetik retinopati nadir (seyrek) bildirilen bir yan etkidir.

Bunların hepsi ciddi yan etkilidir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

- **Görme problemleri:** İnsülin tedavisine ilk başladığında görme bozukluğu olabilir, ancak bu durum genellikle geçicidir.
- **Enjeksiyon bölgesi değişiklikleri: (Yağ dokusunda bozulma-Lipodistrofi)** Aynı yere çok sık enjeksiyon yaparsanız, bu bölgede şişlikler oluşabilir. Her seferinde farklı enjeksiyon yeri seçerek bu durumu önleyebilirsiniz.
- **Alerji belirtileri:** Enjeksiyon bölgesinde alerji belirtileri (kızarıklık, şişlik, kaşıntı) oluşabilir (lokal alerjik reaksiyonlar). Bunlar genellikle insülin tedavisine devam edilirken birkaç hafta içinde kaybolur. Eğer kaybolmazsa doktorunuza başvurunuz.
- **Eklem yerlerinde şişme:** İnsülin almaya başladığınız zaman, su tutulması nedeniyle bilekleriniz ve diğer eklem yerlerinizde şişmeye neden olabilir. Ancak normalde bu çok kısa zamanda düzelir.

- **Ağrılı periferik sinir hastalığı (nöropati):** Kan glukoz kontrolünde çok hızlı bir iyileşme gerçekleşirse sinirlere bağlı ağrınız olabilir. Bu durum akut ağrılı nöropati olarak adlandırılır ve genellikle geçicidir.

Bunlar NovoRapid Penfill'in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuza veya eczacınıza bilgilendiriniz.

5. NovoRapid Penfill'in Saklanması

NovoRapid Penfill'i çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Kullanılmaya başlanmamış NovoRapid Penfill'i, 2 °C - 8 °C arası sıcaklıklarda buzdolabında saklayınız. Dondurucu kısmın uzağında saklayınız. Dondurmayınız.

Kullanılmakta veya kullanılmak üzere olan NovoRapid Penfill buzdolabında saklanmamalıdır. Bu kartuşları yanınızda taşıyabilir ve oda sıcaklığında (30 °C'nin altında) 4 haftaya kadar saklayabilirsiniz.

Kullanmadığınız zamanlarda, ışıktan korumak için kartuşları daima dış kutusu içinde saklayınız.

NovoRapid Penfill aşırı sıcaktan ve güneş ışığından korunmalıdır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra NovoRapid Penfill'i kullanmayınız.

NovoRapid atık su yoluyla ya da evdeki atık maddelerle birlikte atılmamalıdır. Daha fazla kullanılmayacak ilaçların nasıl imha edilmesi gerektiğini eczacınıza sorunuz. Bu şekilde çevre korumasına yardımcı olabilirsiniz.

Ruhsat Sahibi:

Novo Nordisk Sağlık Ürünleri Tic. Ltd. Şti.

Nispetiye Cad. Akmerkez E3 Blok Kat 7

34335 Etiler - İstanbul Türkiye

Tel: 0 212 385 40 40

Faks: 0 212 282 21 20

www.novonordisk.com.tr

Üretici Firma:

Novo Nordisk A/S

Novo Alle'

DK-2880 Bagsvaerd, Danimarka

veya

Novo Nordisk Production SAS

45, Avenue d'Orléans F-28002 Chartres, Fransa

NovoRapid[®], Penfill[®] ve NovoFine[®] Novo Nordisk A/S Danimarka'nın sahip olduğu ticari markalardır.

Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.