

KULLANMA TALİMATI

DONAXYL vajinal tablet
Vajinal yoldan uygulanır.

Etkin Madde: 10 mg dekualinyum klorür

Yardımcı Maddeler: Laktoz monohidrat içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında :

1. ***DONAXYL nedir ve ne için kullanılır?***
2. ***DONAXYL'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler***
3. ***DONAXYL nasıl kullanılır?***
4. ***Olası yan etkiler nelerdir?***
5. ***DONAXYL'in saklanması***

Başlıkları yer almaktadır.

1. DONAXYL nedir ve ne için kullanılır ?

DONAXYL içeriğindeki dekualinyum klorür farklı bakteri ve mantara karşı geniş antimikrobiyal spektrumlu amonyum bileşiğidir.

DONAXYL, beyaz, oval, bikonveks 6 adet vajinal tablet içeren ambalajlarda sunulmaktadır.

Bakteri veya mantarların neden olduğu vajinal akıntı, kadın doğum ile ilgili cerrahi girişimler veya doğum öncesi enfeksiyonlardan (mikrobik hastalıklar) korunmak amacıyla uygulanır.

Vajinaya uygulandıktan sonra erir ve ilaç bırakır. Etkisini lokal olarak gösterir.

2. DONAXYL'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

DONAXYL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

- Bu ilacın içerdiği maddelerden herhangi birine alerji durumunda,
- Vajina bölgesinde yarası olanlar,

- Cinsel olgunluęa eriřmemiř genç kızlar

DONAXYL'i ařaęıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Donaxyl ile tedavi sırasında cinsel iliřkiden kaçınilmalıdır.

Donaxyl kullanırken vajinal temizlik için sabun gibi maddeler kullanılmamalıdır.

“Bu uyarılar geęmiřteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geęerliyse lütfen doktorunuza danıřınız.”

DONAXYL'in yiyecek ve iecek ile kullanılması

DONAXYL vajinal yoldan uygulanan lokal etkili bir ürün olduęundan, yiyecek ve iecekler ile etkileřmesi beklenmez.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Hamilelięin ilk üç aylık dönemi ierisinde olan kadınlarda DONAXYL verilirken dikkatli olunmalıdır.

Tedavi sırasında hamile olduęunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Dekualinyum klorürün anne sütüne gemesiyle ilgili veri bulunmamaktadır.

Ara ve makine kullanımı

DONAXYL alan hastaların ara sürme ve tehlikeli makineleri kullanma yeteneklerinde herhangi bir bozulma olacaęı ile ilgili bir bilgi bulunmamaktadır.

DONAXYL'in ierięinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

DONAXYL 653.50 mg laktoz iermektedir.

Eęer daha önceden doktorunuz tarafından bazı řekerlere karřı intoleransınız olduęu söylenmiře bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geiniz.

Dięer ilalar ile birlikte kullanımı

Bilinen bir ila etkileřimi bulunmamaktadır.

Eęer reeteli yada reetesiz herhangi bir ilacı řu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. DONAXYL nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

DONAXYL, akşamları yatmadan önce, vajinanın iyice derinine yerleştirilecek şekilde tek tablet olarak uygulanır.

Uygulama yolu ve metodu:

Doktorunuzun size önerdiği şekilde ve süre boyunca kullanmalısınız.

DONAXYL, vajinaya en iyi şekilde, uzanıp dizler hafifçe bükülerek yerleştirilir.

DONAXYL nadir olarak ve vajinanın çok kuru olduğu hallerde parçalanmayarak olduğu gibi dışarı atılabilir. Bu durumda vajinaya zarar gelmesi gibi bir tehlike mevcut değildir. DONAXYL eğer vajinal kuruluk varsa vajinaya yerleştirilmeden önce bir damla su ile ıslatılabilir.

Tedaviye adet döneminde ara verilmeli, adet kanaması sona erdiğinde devam edilmelidir.

DONAXYL tamamen erimeyen maddeler de içermektedir. Bu nedenle vajinadan tablet artıkları geri gelebilir ancak bu ilacın etkisini azaltmaz.

İlaç uygulandığı süre uygun hijyenik ped kullanmalısınız. İç giysinizi boyamaz. İç giysilerinizi her gün değiştirin ve 80°C sıcaklıkta yıkayın.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

DONAXYL'i cinsel olgunluğa erişmemiş genç kızlar kullanmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlıların kullanımı ile ilgili özel bir bilgi bulunmamaktadır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği: Karaciğer ve böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir.

Eğer DONAXYL'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla DONAXYL kullandıysanız

DONAXYL'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

DONAXYL'i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.

DONAXYL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

DONAXYL tedavisi sonlandırıldığında herhangi bir etki oluşması beklenmemektedir.

4. Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi DONAXYL'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, DONAXYL'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz :

Ciddi deri döküntüleri, nefes darlığı gibi alerji belirtileri gelişirse DONAXYL'e karşı ciddi duyarlılığınız var demektir.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin DONAXYL'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Ateş

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz :

Vajinada şiddetli kaşıntı, yanma ve kızarıklık
(*Bu yan etkiler hastalığınızın belirtileri ile de ilişkili olabilir*)

Vajina yüzeyinde yaralar
(*Bu yan etki vajina yüzeyinin önceden zarar gördüğü durumlarda gözlemlenmiştir*)

Bunlar DONAXYL'in hafif yan etkileridir.

Bu belirtiler kendiliğinden geçmezse veya şiddetli/sıkıntı verici boyutlardaysa, doktorunuzla temas kurunuz.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. DONAXYL'in saklanması

DONAXYL'i çocukların göremeyeceđi, erişemeyeceđi yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25 °C'nin altında, oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra DONAXYL'i kullanmayınız. Son kullanma tarihi belirtilen ayın son günüdür.

Ruhsat sahibi:

Abdi İbrahim İlaç Pazarlama A.Ş.
Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi.No:4
34467 Maslak/Sarıyer/İstanbul
Tel: 0212 366 84 00
Faks: 0212 276 20 20

Üretim yeri:

Medinova Ltd. İSVİÇRE lisansıyla Rottendorf Pharma GmbH - ALMANYA

Bu kullanma talimatı . tarihinde onaylanmıştır.