

## KULLANMA TALIMATI

### MAFLOR saşe

Ağızdan alınır.

**Etkin madde:** Her bir saşe 60,00 mg Probiyotik (*Bifidobacterium animalis ssp lactis B94*) içerir.

**Yardımcı maddeler:** Hindiba inulini, Maltodekstrin, Askorbik asit içerir.

**Bu ilaç kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

*Bu ilaç sizin reçetesiz olarak temin edip bir doktor yardımı olmadan eczacınızın tavsiyesi ile hafif bir hastalığı tedavi etmeniz içindir. Buna karşın, yine de MAFLOR' dan en iyi sonuçları alabilmeniz için dikkatli kullanmanız gerekmektedir.*

- Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
- Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
- Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir. başkasına vermeyiniz
- Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.
- Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

### Bu Kullanma Talimatında

1. MAFLOR nedir ve ne için kullanılır?
2. MAFLOR 'u kullanmadan önce nelere dikkat etmelisiniz?
3. MAFLOR nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkileri nedir?
5. MAFLOR'un saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

## 1. MAFLOR nedir ve ne için kullanılır?

MAFLOR'un etkin maddesi olan *Bifidobacterium animalis ssp lactis B94* biyolojik kaynaklı bir ishal kesicidir. MAFLOR bağırsak florasında bulunan bakterilerinin sayısını artırır ve zararlı bakterilerin sayılarının azalmasına yardımcı olarak isal oluşumunu engeller.

MAFLOR, karton kutulara koyulmuş, PAP/PE/AL/PE saşede ambalaj içinde 5 ve 10 adet saşe içerecek şekilde pazarlanmaktadır.

MAFLOR, mikrobik (enfeksiyöz) ve spesifik olmayan ishallerin ve antibiyotik tedavisine bağlı ishal gibi sindirim sistemi rahatsızlıklarının önlenmesi ve tedavisinde kullanılan Vankomisin/metranidazole isimli ilaçlara ek olarak *Clostridium difficile* isimli bir bakterinin neden olduğu hastalığının tekrarının önlenmesinde, Seyahate bağlı turist ishalinin önlenmesi ve tedavisinde kullanılır.

## 2. MAFLOR'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

**MAFLOR'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ**

Eğer;

- MAFLOR'un içerdiği maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılığınız varsa
- Santral venöz kateteriniz varsa
- Akut pankreas iltihabınız varsa kullanmayınız.

**MAFLOR'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ**

Eğer;

- İshaliniz şiddetliyse ağızdan veya damar yolundan sıvı verilebilir ise
- Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse,

bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

## MAFLOR'un yiyecek ve içecek ile kullanılması

Bu ilaç günün herhangi bir saatinde alınabilir, ancak hızlı bir etki sağlamak için yemeklerle birlikte alınmamalıdır.

## **Hamilelik**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

Doktorunuz tarafından yarar zarar oranı değerlendirilerek uygulanmalıdır.

*Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

## **Emzirme**

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doktorunuz tarafından yarar zarar oranı değerlendirilerek uygulanmalıdır.

## **Araç ve makine kullanımı**

MAFLOR'un araç ve makine kullanımı üzerinde etkileri bildirilmemiştir.

## **MAFLOR'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler**

İçindeki maddelerden herhangi birisine karşı aşırı duyarlılığı olanlarda dikkatli kullanılmalıdır.

## **Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı:**

MAFLOR bakteriyel yapıda olduğu için bakteri önleyici ilaçlara karşı duyarlıdır.

Bir antibiyotik ile birlikte kullanılıyorsa, antibiyotik ile aynı zamanda alınabilir.

Momoamin oksidaz inhibitörleri ile (depresyon ve duygu durum bozukluğu tedavisinde kullanılan ilaçlar) birlikte kullanıldığında hipertansiyona neden olabilir.

*Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

## **3. MAFLOR nasıl kullanılır?**

### **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:**

Yetişkinlerde günde 1 veya 2 saşe alınır.

Çocuklarda günde 1 saşe alınır.

### **Uygulama yolu ve metodu:**

Ağızdan alınır.

Yemek saatlerinin dışında alınması tavsiye edilir.

MAFLOR çok sıcak, gazlı veya alkollü içeceklerle veya yiyeceklerle alınmamalıdır.

**Değişik yaş grupları:****Çocuklarda kullanımı:**

Çocuklarda günde 1 saşe kullanılır. 6 yaşından küçük çocuklar kapsül alamayacağı için saşe kullanılmalıdır.

**Yaşlılarda Kullanımı:**

Yaşlılarda özel bir kullanımı bulunmamaktadır.

**Özel kullanım durumları:****Böbrek/Karaciğer yetmezliği:**

Özel kullanım durumu yoktur.

*Eğer MAFLOR'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.*

**Kullanmanız gerekenden fazla MAFLOR'u kullandıysanız**

*MAFLOR'u kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

**MAFLOR 'u kullanmayı unutursanız**

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

**MAFLOR ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:**

Herhangi bir etki oluşumu bildirilmemiştir.

**4. Olası yan etkiler nelerdir?**

Tüm ilaçlar gibi MAFLOR'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Çok yaygın : 10 hastanın en az 1'inde görülebilir.

Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek : 1000 hastanın birinden az, fakat 10 000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Aşağıdakilerden biri olursa, Maflor'u kullanmayı durdurunuz ve **DERHAL** doktorunuza bildirin ve size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

- Anafilaktik şok (yüz, boğaz, dudak ve ağız aniden şişmesi. Bu nefes alma ve yutkunma zorluğuna yol açabilir. Eller, ayakların ve bileklerin aniden şişmesi),
- Deri döküntüsü, kaşıntı, kızarıklık

#### **Seyrek**

- Barsaklarda gaz / midede rahatsızlık hissi,

#### **Çok seyrek**

- Ateş,

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuza veya eczacınıza bilgilendiriniz.*

#### **5. MAFLOR'un saklanması**

*MAFLOR'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.*

*Oda sıcaklığında (25 °C'nin altında), nemden ve güneş ışığından koruyarak saklanmalıdır.*

**Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.**

*Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra MAFLOR'u kullanmayınız.*

*"Son Kullanma Tarihi" ambalajda yazılı ayın son günüdür.*

*Çevreyi korumak amacıyla kullanmadığınız MAFLOR'u şhir suyuna veya çöpe atmayınız.  
Bu konuda eczacınıza danışınız.*

#### **Ruhsat sahibi:**

Mamsel İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş  
Mahir İz Caddesi No: 43 Altunizade  
Üsküdar, İstanbul

**Üretim yeri:**

Laboratoires Ineldea Fransa adına

Lallemand S.A.S

4 chemin du Bord de l'Eau-

Saint Simon 15130

FRANSA

Bu kullanma talimatı 09.12.2013 tarihinde onaylanmıştır.