

KULLANMA TALİMATI

MUSCORİL 4 mg kapsül

Ağız yoluyla alınır.

- **Etkin madde:** Her bir kapsülde 4 mg Tiyokolşikosid
- **Yardımcı maddeler:** Laktoz monohidrat, mısır nişastası, magnezyum stearat

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

1.MUSCORİL nedir ve ne için kullanılır?

2.MUSCORİL' i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3.MUSCORİL nasıl kullanılır?

4.Olası yan etkiler nelerdir?

5.MUSCORİL'in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1.MUSCORİL nedir ve ne için kullanılır?

MUSCORİL, kapsül formunda olup 4 mg tiyokolşikosid etkin maddesini içerir. Her bir kutuda, blisterde 20 kapsül bulunmaktadır. Şeffaf her bir kapsül, açık sarı toz içerir.

MUSCORİL esas olarak kas gevşetici etkinliğe sahiptir. MUSCORİL, yetişkinlerde ve 16 yaştan itibaren ergenlerde ani ortaya çıkan omurilik kaynaklı ağrılı kas kasılmalarının ek tedavisinde kullanılır.

2. MUSCORİL' i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

MUSCORİL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

- Kas veya kasların görev yapamaması (kasılmaması) durumu varsa,
- Etkin maddeye ya da yardımcı maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılığınız varsa,
- Gebelik ve emzirme döneminde iseniz.
- Gebe kalma olasılığınız varsa ve etkili bir doğum kontrol yöntemi kullanmıyorsanız.
- 16 yaşından küçükseniz.

MUSCORİL'i ařağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eęer:

- Sara hastası iseniz veya sara nbeti riskiniz var ise.

-

MUSCORİL kullanırken vcutta oluřan maddelerden biri, MUSCORİL yksek dozlarda kullanıldıęında bazı hcrelerde hasara (anormal kromozom sayısına) neden olabilir. Bu durum hayvanlarda ve laboratuarda yapılan alıřmalarda gsterilmiřtir. İnsanlarda hcrelerde ortaya ıkabilen bu hasar kanser iin risk faktr oluřturur, doęmamıř ocuęa zarar verebilir ve erkeklerde kısırlıęa neden olabilir. Bu nedenle ‘‘Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklıęı iin talimatlar’’ kısmında belirtilen doza ve tedavi sresine sıkı bir řekilde uyunuz. İlacı daha yksek dozlarda ve 7 gnden fazla kullanmayınız. Bařka sorularınız varsa ltfen doktorunuza danıřınız.

MUSCORİL ile tedavi sırasında karacięer sorunları ortaya ıkabilir. Eęer, ařağıdaki belirtilerden biri sizde ortaya ıkarsa derhal doktorunuza bildiriniz: mide (karın) blgesinde aęrı veya rahatsızlık hissi, iřtah kaybı, bulantı, kusma, ciltte veya gz aklarında sararma (sarılık), idrarın normalden koyu renkte olması, kařıntı ve bunların yanı sıra ateř ve yorgunluk (zellikle de daha nce sayılan belirtilerle birlikteyse). Bunlar karacięer sorunlarının belirtileri olabilir.

Eęer tedavi sırasında ishal ortaya ıkarsa MUSCORİL ile tedaviyi kesiniz.

Bu uyarılar gemiřteki herhangi bir dnemde dahi olsa sizin iin geerliyse ltfen doktorunuza danıřınız.

MUSCORİL'in yiyecek ve iecek ile kullanılması

MUSCORİL'in yiyecek ve iecekler ile etkileřimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Hamile iseniz bu ilacı kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduęunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Eęer emziriyorsanız bu ilacı kullanmayınız.

Ara ve makine kullanımı

Klinik alıřmalara gre, tiyokolřikosidin ruhsal aktiviteye baęlı motor etkiler ile ilgili (psikomotor) performans zerine etkisi yoktur. Ancak, ila yaygın olarak uyuklamaya ve sersemlięe neden olabildięinden, ara ve makine kullanırken dikkatli olunuz.

MUSCORİL'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Her bir MUSCORİL 4 mg kapsülde 218.3 mg laktoz bulunmaktadır. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

• MUSCORİL'in kas-iskelet sistemi üzerinde kas gevşetici etki gösteren diğer ilaçlarla birlikte alınması, birbirlerinin etkisini artırabileceklerinden dolayı önerilmemektedir. Aynı sebepten ötürü, düz kaslar üzerine etkili olan bir diğer ilaçla birlikte kullanılması durumunda, istenmeyen etkilerin görülme sıklığının artması ihtimaline karşı dikkatli olunmalıdır.

Bu uyarının belirli bir süre önce kullanılmış veya gelecekte bir zaman kullanılacak ürünlere de uygulanabileceğini lütfen not ediniz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3.MUSCORİL nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

- Önerilen ve günlük maksimum doz, her 12 saatte bir alınmak koşuluyla (12 saat aralık verilerek) günde 2 defa 2 kapsül (8mg tiyokolşikosid)'dür. Yani bir günde 4 kapsülden (toplam 16 mg tiyokolşikosid) fazla MUSCORİL kullanmayınız.
- Normalde MUSCORİL 4 mg kapsül ile tedavi süresi 5-7 gündür. İlacı 7 günden fazla kullanmayınız.

Uygulama yolu ve metodu:

- MUSCORİL sadece ağızdan kullanım içindir. Kapsülleri çiğnemeyiniz.
- Kapsülleri yeterli miktarda su ile (örneğin, bir bardak su ile), yemeklerden sonra alınız.

Önerilen dozu aşmayınız ve uzun süreli kullanımdan kaçınınız.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz. İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

Doktorunuz MUSCORİL ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamazsınız.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı:

Bu ilacı 16 yaşından küçük çocuklarda kullanmayınız.

Yaşlılarda kullanımı:

MUSCORİL'in yaşlı hastalardaki güvenilirlik ve etkinliği incelenmemiştir.

Özel kullanım durumları:**Böbrek/Karaciğer yetmezliği**

MUSCORİL'in böbrek/karaciğer yetmezliği olan hastalardaki güvenlilik ve etkililiği incelenmemiştir.

Eğer MUSCORİL'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla MUSCORİL'i kullandıysanız:

MUSCORİL'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

MUSCORİL'i kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

MUSCORİL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, MUSCORİL'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, MUSCORİL'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da ağzın veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi,
- Kaşıntı, deri ve mukoza üzerindeki şişmeler (anjyonörotik ödem),
- Baygınlık (vazovagal senkop),
- Havale (nöbet).

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin MUSCORİL'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Mide (karın) bölgesinde ağrı veya rahatsızlık hissi, iştah kaybı, bulantı, kusma, ciltte veya göz aklarında sararma (sarılık), idrarın normalden koyu renkte olması, kaşıntı, ateş ve yorgunluk (bunlar karaciğer sorunlarının belirtileri olabilir),
- Sersemlik, uyuklama hali,
- Kaşıntı,
- Deri döküntüleri,
- Tansiyon düşüklüğü, geçici olarak bilinçte bulanıklık, taşkınlık hali.

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

- Bulantı,
- Kusma,
- İshal,
- Mide ağrısı.

Bunlar MUSCORİL'in hafif yan etkileridir.

Bu yan etkiler doz azaltıldığında veya tedavi kesildiğinde kaybolur.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. MUSCORİL'in saklanması

MUSCORİL'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C'nin altındaki oda sıcaklıklarında saklanmalıdır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra MUSCORİL'i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz MUSCORİL'i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi: Sanofi aventis İlaçları Ltd.Şti.

Büyükdere cad. No: 193 Levent 34394- İSTANBUL

Üretim yeri:

Zentiva Sağlık Ürünleri San ve Tic. A.Ş.

Küçükkarıştıran 39780 Lüleburgaz Kırklareli

Bu kullanma talimatı(GG/AA/YYYY) tarihinde onaylanmıştır.