

## KULLANMA TALİMATI

### MAYFEX 180 mg film tablet

Ağızdan alınır

**Etkin madde:** Feksofenadin hidroklorür

**Yardımcı maddeler:** Prejelatinize nişasta, Mikrokristalin selüloz, Sodyum kroskarmeloz, Koloidal silisyumdioksit, Povidon, Magnezyum stearat, Hidroksipropil metilselüloz, Polietilen glikol 4000, Titanyum dioksit, Talk, Sarı demir oksit

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

### **Bu Kullanma Talimatında:**

1. *MAYFEX nedir ve ne için kullanılır?*
2. *MAYFEX'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler*
3. *MAYFEX nasıl kullanılır?*
4. *Olası yan etkiler nelerdir?*
5. *MAYFEX'in saklanması*

**Başlıkları yer almaktadır.**

## 1. MAYFEX nedir ve ne için kullanılır?

MAYFEX'in etkin maddesi feksofenadin hidroklorür'dür. 1 film tablet içinde 180 mg feksofenadin hidroklorür (168 mg feksofenadin) bulunur. Tabletler, sarı renkli, oblong, film kaplıdır. MAYFEX, 10 ve 20 film tabletlik blisterler içeren karton kutu ambalajlarda kullanıma sunulmuştur.

MAYFEX'in 2 dozaj şekli mevcuttur. MAYFEX 180, bir film tablet içinde 180 mg feksofenadin hidroklorür içerir. MAYFEX 120, bir film tablet içinde 120 mg feksofenadin hidroklorür içerir.

MAYFEX, antihistaminik ilaçlar grubundandır. Antihistaminik ilaçlar, saman nezlesi (mevsimsel alerjik rinit) denen hastalıkla ortaya çıkan aksırık, kaşıntılı burun akıntısı, gözlerde kızarma ve sulanma gibi belirtileri ayrıca kronik idiyopatik ürtiker denen hastalıkta görülen ciltte kaşıntı ve kızarma gibi belirtileri iyileştirirler.

Doktorunuz size veya 12 yaşından büyük olan çocuğunuza MAYFEX'i, kronik idiyopatik ürtiker adı verilen hastalığa bağlı olarak gelişen aşağıdaki belirtilerin giderilmesi için reçetelemiş olabilir:

- Ciltte kaşıntı ve kızarıklık

## 2. MAYFEX'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

### **MAYFEX'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ**

Eğer;

- MAYFEX'in içindeki etkin madde olan feksofenadin hidroklorüre karşı veya ilacın içerdiği diğer maddelerden birine karşı alerjiniz varsa

### **MAYFEX'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ**

Eğer;

- Sizde karaciğer ya da böbrek problemleri var ise
- Kalp hastalığı geçirdiyse veya kalp ile ilgili problemlerinizi var ise (MAYFEX gibi ilaçlar kalp atımının hızlanmasına veya düzensiz atmasına sebep olabilir)
- İleri yaşta iseniz
- Hamileyseniz, hamile kalma ihtimaliniz varsa ve bebek emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız.

### **MAYFEX'in yiyecek ve iecek ile kullanılması:**

MAYFEX'i yemeklerden nce alınız.

### **Hamilelik**

*İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

Doktorunuz, MAYFEX'in sađlayacađı faydanın, bebeđiniz iin olası zarardan daha fazla olduđunu dřunuyorsa, ilacı kullanmanızı tavsiye edebilir. Doktorunuza danıřmadan MAYFEX'i kullanmayınız.

*Tedaviniz sırasında hamile olduđunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

### **Emzirme**

*İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

Emzirme sırasında MAYFEX kullanımı nerilmemektedir. Emzirme sırasında MAYFEX ile tedavi edilmeniz gerekiyorsa, bebeđi anne stne geen az miktarda feksofenadin hidroklorrden korumak iin, st vermeyi bırakmanız gerekir.

### **Ara ve makine kullanımı**

Ara ve makine kullanımı zerine bilinen herhangi bir etkisi yoktur.

### **MAYFEX'in ieriđinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında nemli bilgiler**

Bu tıbbi rn her tabletinde 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında 'sodyum iermez'.

### **Diđer ilalar ile birlikte kullanımı**

Alminyum ve magnezyum hidrokisit ieren antasitler (MAYFEX ile bu tip anti-asit ilaların uygulanması arasında 2 saatlik sre bırakılması nerilmektedir.)

*Eđer reeteli ya da reetesiz herhangi bir ilacı řu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise ltfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

## **3. MAYFEX nasıl kullanılır?**

### **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklıđı iin talimatlar:**

Eriřkinler ile 12 yař ve zerindeki ocuklar iin nerilen feksofenadin hidroklorr dozu gnde tek doz olarak 180 mg'dır. (Gnde 1 adet, MAYFEX 180 mg Film Tablet)

### **Uygulama yolu ve metodu:**

MAYFEX ađızdan kullanılır. Tabletleri bir bardak su ile doktorunuzun nerdiđi miktarda yutunuz. Tabletleri, yemeklerden nce alınız.

Hazımsızlık şikâyetleriniz için alüminyum veya magnezyum içeren antasid ilaçlar kullanıyorsanız, bu ilaçların alınmasıyla, MAYFEX'in yutulması arasında 2 saatlik bir zaman aralığı bırakınız.

#### **Değişik yaş grupları:**

##### **Çocuklarda kullanımı:**

MAYFEX 12 yaşından küçük çocuklarda güvenilirliği ve etkinliği henüz kanıtlanmadığı için, kullanılmaz.

##### **Yaşlılarda kullanımı:**

Yaşlı hastaları kapsayan çalışmalar bu hastalarda feksofenadin hidroklorür dozunun ayarlanmasının gerekli olmadığını göstermektedir.

#### **Özel kullanım durumları:**

##### **Böbrek/Karaciğer yetmezliği:**

Özel risk gruplarını (böbrek veya karaciğer bozukluğu olan hastalar) kapsayan çalışmalar bu hastalarda feksofenadin hidroklorür dozunun ayarlanmasının gerekli olmadığını göstermektedir.

*Eğer MAYFEX'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.*

##### **Kullanmanız gerekenden daha fazla MAYFEX kullandıysanız**

*MAYFEX'ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

##### **MAYFEX'i kullanmayı unutursanız**

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.*

##### **MAYFEX ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler**

MAYFEX tedavisini doktorunuzun onayı olmadan bırakırsanız; ciltte kızarıklık ve kaşıntı gibi yakınmalarınız tekrar başlayabilir.

#### **4. Olası yan etkiler nelerdir?**

Tüm ilaçlar gibi MAYFEX'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

**Aşağıdakilerden biri olursa, MAYFEX'i almayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil servisine başvurunuz:**

- Zorlukla ve hırıltılı bir şekilde nefes almaya başlarsanız
- Yüz, dil veya boğazınızda, yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak bir şişme ortaya çıkarsa

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, MAYFEX'e karşı ciddi alerjik reaksiyonunuz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

**Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:**

- Baş ağrısı, uyuşukluk, bulantı, baş dönmesi, yorgunluk.

Bunlar MAYFEX'in zayıf yan etkileridir.

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

## **5. MAYFEX'in saklanması**

*MAYFEX'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında ve orijinal ambalajında saklayınız.*

**Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak saklayınız.**

*Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra MAYFEX'i kullanmayınız.*

### **Ruhsat sahibi:**

Recordati İlaç San. ve Tic. A.Ş.  
Doğan Araslı Cad. No: 219 34510 Esenyurt / İSTANBUL

### **Üretim yeri:**

Recordati İlaç San. ve Tic. A.Ş.  
Doğan Araslı Cad. No: 219 34510 Esenyurt / İSTANBUL

*Bu kullanma talimatı \_\_. \_\_. \_\_\_\_ tarihinde onaylanmıştır.*