

## KULLANMA TALİMATI

### LUXNİD 2/200 mcg inhalasyon için toz içeren blister

Ağızdan solunarak kullanılır.

- **Etkin maddeler:** İnhalasyon için her bir doz 2 mcg karmoterole eşdeğer 2,2 mcg karmoterol hidroklorür ve 200 mcg siklesonid içermektedir.
- **Yardımcı madde:** Laktoz içerir.

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

### **Bu Kullanma Talimatında:**

1. ***LUXNİD nedir ve ne için kullanılır?***
2. ***LUXNİD'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler***
3. ***LUXNİD nasıl kullanılır?***
4. ***Olası yan etkiler nelerdir?***
5. ***LUXNİD'in saklanması***

**Başlıkları yer almaktadır.**

## **1. LUXNİD nedir ve ne için kullanılır?**

LUXNİD 2/200 mcg, 60 dozluk inhalasyon için toz içeren Alü/Alü blister ambalajlarda inhalasyon cihazı içerisinde bulunur.

LUXNİD etkin madde olarak 2 mcg karmoterole eşdeğer 2,2 mcg karmoterol hidroklorür ve 200 mcg siklesonid içermektedir.

LUXNİD'in içeriğindeki karmoterol, hızlı etki başlangıcına sahip ve uzun süreli etki gösteren, akciğere giden ve bronş adı verilen hava yollarını genişletici bir ilaçtır.

LUXNİD'in içeriğindeki siklesonid her gün kullanılması gereken, koruyucu bir ilaçtır (kortikosteroid). Etkisini sadece akciğerde, nefes yolu ile alındıktan sonra göstermek üzere tasarlanmıştır.

LUXNİD,

- Astım belirtilerinin düzeltilmesi ve kontrol altına alınması amacıyla kullanılır. Astım hastalığının basamaklı tedavisinde 3. basamaktan itibaren verilir.
- Orta ve ağır kronik tıkaçıcı (obstrüktif) akciğer hastalığı (KOAH) olan kişilerde hastalığın belirtilerini ve atak sıklığını azaltır.

LUXNİD, nefes darlığı gibi astım belirtilerini ve astım atağı geçirme ihtimalini azaltarak, daha rahat nefes almanızı sağlar. LUXNİD'in koruyucu etkisi zaman içinde gelişir. Bu nedenle kendinizi iyi hissetseniz bile, ilacı kullanmaya her gün devam etmelisiniz.

## **2. LUXNİD'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**

Doktorunuzun ya da eczacınızın size verdiği talimatları, bu kullanma talimatında bulunan bilgilerden farklı olsalar bile dikkatlice uygulamalısınız.

### **LUXNİD'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ**

Eğer,

- Karmoterole, siklesonide ya da LUXNİD'in içerdiği yardımcı madde laktoza karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz (eğer alerjiniz olabileceğini düşünüyorsanız doktorunuzdan tavsiyede bulunmasını isteyiniz),
- Akciğer sisteminizi etkileyen fungal (mantar), viral, bakteriyel enfeksiyon veya akciğer tüberkülozu (TB) tedavisi görüyorsanız veya daha önceden gördüyseniz.

## LUXNİD'i ařağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eęer;

- Belirtileriniz kötüleřiyorsa (öksürük, nefes darlıęı, güçlkle ve hırıltılı solunum, göęüs darlıęı),
- Belirtileriniz yüzünden gece uyanıyorsanız,
- Alerjik rinit (burun ii iltihaplanma) ya da egzama (kařıntılı ve kırmızı cilt) gibi alerjik etkiler gözlemleniyorsa,
- řiddetli astımınız varsa,
- Bulantı, kusma, yüksek ateř veya ishal gibi ciddi semptomlar görülürse,
- Kortikosteroid tableten LUXNİD'e gemiřseniz, kortikosteroidlerle iliřkili olarak böbrek üstü bezi yetmezlięi riski bir süre devam edebilir. Böbrek üstü bezi yetmezlięine ait bulgular (örn. bař dönmesi, halsizlik, bulantı, iřtah kaybı, huysuzluk, sa dökülmesi, güçsüzlük, bař ağrısı, hafıza problemleri, alerji, yeme isteęi ve kan řekeri hastalıkları) bir süre görülebilir.
- Böbrek üstü bezi yetmezlięiniz varsa,
- Kalp hastalıęınız varsa,
- Yüksek kan basıncı (hipertansiyon) probleminiz varsa,
- Tiroid beziniz normalden fazla alıřıyorsa,
- Bir anevrizmanız (atardamar duvarının zayıf olması nedeniyle atardamarın bir torba gibi řiřtięi bir alan) varsa,
- Kalp sorunuz, örneęin "QT aralıęının uzaması" olarak adlandırılan anormal bir elektrik sinyali varsa,
- Diyabetiniz varsa,
- Feokromositomanız varsa (kan basıncını etkileyen bir böbreküstü bezi tümörü),
- Hamileyseniz,
- Emziriyorsanız.

abuk ve kısa etkili (rahatlatıcı) inhaleriniz (ilacınız) sizi rahatlatmıyorsa, derhal doktorunuzla baęlantıya gein.

Eęer LUXNİD kullanırken hırıltı veya nefes alma zorluęu yařarsanız, ilacı kullanmaya devam etmelisiniz, fakat bařka bir ilaç kullanma gereksiniminiz olabileceęinden, mümkün olan en kısa süre iinde doktorunuza gitmelisiniz.

Aşağıdaki durumlar sizin için geçerliyse, LUXNİD kullanmayınız:

- Düşük ila orta bir dozda verilen inhale kortikosteroid gibi diğer bir astım kontrol ilacıyla iyi derecede kontrol ediliyorsanız,
- Sadece kısa etkili beta<sub>2</sub>-agonisti ilaçlara (nadiren) (salbutamol gibi kurtarıcı bir inhaler) gereksinim duyuyorsanız.

Bir astım krizi geçirirken LUXNİD tedavisine başlamayınız ya da doktorunuzun önerdiği dozu aşmayınız.

Eğer astımınız varsa, ani gelişen astım ataklarının tedavisi için LUXNİD kullanmayın. Ani astım belirtilerinizi tedavi etmek için her zaman yanınızda kısa etkili bir beta<sub>2</sub>-agonisti grubundan bir ilaç (salbutamol gibi kurtarıcı bir inhaler) taşıyınız. Doktorunuz bu amaçla size başka bir inhaler ilaç verecektir.

LUXNİD tedavisi kan potasyum düzeyini düşürebilir. Bu sizi anormal bir kalp ritmine karşı daha yatkın hale getirebilir. Bu nedenle, özellikle de şiddetli astımınız varsa, doktorunuz kan potasyum düzeyinizi izleyebilir.

### **Benzer ilaçlar için önemli bilgi:**

LUXNİD'in içeriğindeki karmoterol, uzun etkili beta<sub>2</sub>-agonistleri (LABA) olarak adlandırılan bir ilaç sınıfına dahildir. Farklı bir uzun etkili beta<sub>2</sub>-agonisti (salmeterol) ile yapılan büyük bir çalışmada astıma bağlı ölüm riskinde artış görülmüştür. Karmoterolün böyle bir etkisinin olup olmadığını incelemek için herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Astımınızı LUXNİD ile tedavi etmenin fayda ve riskleri konusunda doktorunuzla konuşunuz

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

### **LUXNİD'in yiyecek ve içecek ile birlikte kullanılması**

LUXNİD'in uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

### **Hamilelik**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

Hamileyseniz ya da hamile kalmayı planlıyorsanız, bunu doktorunuza bildiriniz.

Doktorunuz önermediği sürece, hamilelik sırasında LUXNİD kullanmamalısınız.

Doktorunuz, hamilelik sırasında LUXNİD kullanmanın potansiyel riskleri konusunda sizi bilgilendirecektir.

Hamileliđiniz sırasında kortikosteroid kullandıysanız ocuđunuzun bbrek st bezi fonksiyonları dikkatle takip edilecektir.

*Tedaviniz sırasında hamile olduđunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

### **Emzirme**

*İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

Eđer emziriyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz. Emzirmenin durdurulup durdurulmayacađına veya LUXNİD tedavisinin durdurulup durdurulmayacađına doktorunuz karar verecektir.

### **Ara ve makine kullanımı**

LUXNİD'in ara ve makine kullanımı zerindeki etkileri bilinmemektedir. LUXNİD kullanımı sırasında bařınız dnerse, ara ya da makine kullanmayın ya da dikkat gerektiren diđer iřleri yapmayın.

### **LUXNİD'in ieriđinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında nemli bilgiler**

LUXNİD'in ierisinde laktoz bulunmaktadır. Eđer daha nceden doktorunuz tarafından bazı řekerlere karřı intoleransınız olduđu sylenmiře bu tıbbi rn almadan nce doktorunuzla temasa geiniz.

### **Diđer ilalar ile birlikte kullanımı**

Eđer ařađıdaki ilalardan herhangi birini kullanıyorsanız, LUXNİD'i kullanmadan nce doktorunuza bildirin.

- Depresyon ve duygu-durum bozukluklarını tedavi etmek iin kullanılan monoamin oksidaz inhibitrleri (MAO inhibitrleri) ya da trisiklik antidepresanlar,
- Astım ve burun tıkanıklıđını tedavi etmek iin kullanılan adrenalın benzeri ilalar olan semptomimetik ilalar,
- Alerjik bir yanıtın ana belirtilerini tedavi etmek ya da nlemek iin yaygın olarak kullanılan alerjik hastalıklara karřı etkili ilalar olan antihistaminikler,
- ođunlukla astım ya da diđer iltihabi hastalıkları tedavi etmek iin kullanılan steroidler (yaygın olarak bilinen adıyla kortizonlar [rn, prednizolon]),
- dem (su tutulması), kalp yetmezliđi ve yksek kan basıncını tedavi etmek iin kullanılan hidroklorotiyazid gibi diretik adı verilen idrar sktrc ilalar,

- Yüksek kan basıncı, kalp yetmezliği, göğüs ağrısı, anksiyete (kaygı, endişe), anormal kalp ritmini tedavi etmek için kullanılan bir ilaç tipi olan beta-blokörler (glokom [göz içi basıncının artması] tedavisinde kullanılan bazı göz damlaları beta-blokör içerebilir [örn, timolol içeren göz damlaları]),
- Anormal kalp ritmini tedavi etmek için kullanılan ilaçlar olan kinidin, disopiramid ve prokainamid,
- Şizofreni (bir tür psikiyatrik hastalık), mani (taşkınlık nöbeti), psikotik durumlar ve anksiyete (kaygı, endişe) gibi zihinsel bozuklukları kontrol eden bir ilaç grubu olan fenotiyazin türevleri,
- Kalp yetmezliği ve anormal kalp ritmini tedavi etmek için kullanılan bir ilaç olan digitalis,
- Astım ve kronik obstrüktif (tıkayıcı) hava yolu hastalıklarını tedavi etmek için kullanılan bir ilaç sınıfı olan ksantin türevleri (örn, teofilin),
- Makrolid antibiyotikler (örneğin eritromisin, azitromisin),
- Mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan ilaçlar (örneğin ketokonazol veya itrakonazol),
- Virüs enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan ilaçlar (örneğin nelfinavir veya ritonavir),
- Cerrahi sırasında kullanılan halojenli hidrokarbonlar (örneğin halotan) gibi inhale anestezipler. Eğer anestezi altında ameliyat olacaksınız, LUXNİD kullandığımız konusunda doktorunuzu bilgilendiriniz.
- Dikkat eksikliği/ hiperaktivite sendromu tedavisi için kullanılan atomoksetin,
- Antikolinergik ilaçlar (örneğin ipratropiyum bromür).

Yukarıdaki durumlarda doktorunuzun dozu değiştirmesi, hatta ilaçlardan birini kesmesi bile gerekebilir.

Doktorunuz size akciğer durumunuza bağlı olarak düzenli bir şekilde kullanmanız için başka ilaçlar vermiş olabilir. Eğer öyleyse, bu ilaçları düzenli olarak almanız önemlidir. Kendinizi daha iyi hissetseniz bile ilacı almayı bırakmayın ya da dozunu azaltmayın.

*Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

### **3. LUXNİD nasıl kullanılır?**

#### **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:**

LUXNİD, yalnızca inhalasyon yoluyla kullanılmak içindir.

LUXNİD'i her zaman doktorunuzun size tarif ettiği şekilde kullanınız. Eğer nasıl kullanacağınızdan emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışmalısınız.

Astım ve KOAH hastaları

Astım ve KOAH hastalarında önerilen doz günde bir kez, bir veya iki LUXNİD inhalasyon dozunun inhale edilmesidir.

İnhalasyon her gün, aynı saatte yapılmalıdır.

Doktorunuz LUXNİD ile tedavinizin ne kadar süreceğini ve hangi dozda almanız gerektiğini size anlatacaktır.

LUXNİD'i akut astım ve KOAH ataklarınızın rahatlatılması için kullanmayınız. Akut ataklar meydana geldiğinde, doktorunuz tarafından önerilen kısa etkili bir beta<sub>2</sub>-agonist (rahatlatıcı inhaler) kullanmalısınız.

Eğer gerekiyorsa; doktorunuz kortikosteroid tablet ve/veya iltihaplanma durumunda antibiyotik verebilir.

Doktorunuz astımınızın veya KOAH'ınızın kontrol altına alınması için gerekli en düşük dozu ayarlayacaktır.

İlacı kullanmaya başladıktan sonra belirtilerinizde (öksürük, nefes darlığı, hırıltılı solunum, göğüs darlığı) 24 saat içinde bir iyileşme fark etmelisiniz.

Kendinizi iyi hissetseniz bile, LUXNİD'i düzenli olarak her gün kullanmanız önemlidir. Eğer çabuk ve kısa etkili (rahatlatıcı) inhalerinizi daha sık kullanıyorsanız, ilacınızı gözden geçirmesi için doktorunuza bu durumu bildirmeniz gerekir.

Doktorunuz ya da eczacınız soluma cihazının kullanımı hakkında sizi bilgilendirmelidir.

#### **Uygulama yolu ve metodu:**

LUXNİD'i ağız yoluyla inhalasyon şeklinde kullanınız.

İnhalasyon cihazı yoluyla nefes aldığınızda ilaç akciğerlerinize ulaşır. Bu nedenle, cihazın ağız parçası aracılığıyla derin ve güçlü nefes almanız önemlidir.

İnhalasyon cihazının kullanımı, doktor veya bir başka sađlık personeli tarafından size gsterilecektir.

İlacınızı kullandıktan sonra ađzınızı su ile iyice alkalayınız ve alkaladıktan sonra ađzınızdaki suyu tükürünüz. Bunu yapmak, ađzınızda mantar enfeksiyonu (pamukuk) gelişmesi riskini azaltır.


LUXNİD'i doktorunuzun talimatlarına göre, düzenli olarak kullanmanız önemlidir. Eđer ne kadar süre LUXNİD kullanacađınız hakkında sorularınız varsa, doktorunuza ya da eczacınıza danıřınız.

Kullanıma iliřkin detaylı bilgi kullanma talimatında mevcuttur. İnhalasyon cihazının dođru kullanımı için ařađıda verilen kuralları dikkatle izleyiniz.

### **İnhalasyon cihazı kullanım talimatları**


#### **KAPALI**

İnhalasyon cihazını kutusundan ıkardıđınızda, kapalı durumda olacaktır.



#### **AIK**

Kullanılmamıř bir inhalasyon cihazı iinde, ayrı ayrı korunmuř olarak, toz halde 60 dozluk ila bulunur. Doz gstergesi, inhalasyon cihazı iinde ka doz ila kaldıđını gsterir.



Her doz, tam olarak olülmüř olup hijyenik řartlara uygun olarak korunmaktadır. Bakıma veya yeniden doldurmaya gerek yoktur.



İnhalasyon cihazının üst kısmındaki doz göstergesi kaç doz kaldığını gösterir. İnhalasyon cihazını kullanmak kolaydır. İlacı alacağınız zaman yapacaklarınız aşağıdaki üç basamakta gösterilmiştir:

1. Açma
2. İçine çekme
3. Kapatma

### **LUXNİD İnhalasyon Cihazı Nasıl Çalışır?**

Dış kapak itilince, ağızlık içinde küçük bir delik açılır ve bir dozluk ilaç inhale edilmek için hazırdır. İnhalasyon cihazı kapatılınca, dış kapak ilk pozisyonuna döner ve bir sonraki kullanım için hazır hale gelir. Dış kapak, kullanılmadığı zamanlarda inhalasyon cihazını korur.

#### **1. Açma-İnhalasyon cihazını nasıl kullanmalısınız?**

İnhalasyon cihazını açmak ve inhalasyon için hazır hale getirmek için dış kapağı itmeniz yeterli olacaktır. İnhalasyon cihazını, ağızlığı size dönük olacak şekilde tutunuz. İnhalasyon cihazı artık kullanıma hazırdır. Dış kapağın her açılışında inhalasyon için bir doz hazır hale gelir. Bu, doz göstergesinde görülür. İlacı ziyan etmemek için dış kapak ile oynamayınız.

#### **2. İçine çekme**

- İlacı içinize çekmeden önce bu bölümü dikkatli bir şekilde okuyunuz.
- İnhalasyon cihazını ağızınızdan uzak tutunuz. Nefesinizi rahatça yapabileceğiniz kadar dışarı veriniz.

Unutmayınız, asla inhalasyon cihazının içine nefes vermeyiniz.

- Ağızlığı dudaklarınıza yaslayınız. Uzun ve derin nefes alınız, nefesi burnunuzdan değil, inhalasyon cihazının içinden alınız.
- İnhalasyon cihazını ağızınızdan uzaklaştırınız.
- 10 saniye veya rahatça tutabildiğiniz kadar uzun bir süre nefesinizi tutunuz.
- Yavaşça nefes veriniz.

#### **3. Kapatma**

- İnhalasyon cihazını kapatmak için dış kapağı ilk pozisyonuna kaydırmanız yeterlidir.
- İnhalasyon cihazı yeniden kullanıma hazır hale gelmiştir.

Eğer iki inhalasyon almanız tavsiye edildiyse, 1'den 3'e kadar olan basamakları tekrar etmelisiniz.

### **UNUTMAYINIZ!**

Inhalasyon cihazını kuru tutunuz.

Kullanılmadığı zaman kapalı tutunuz.

Inhalasyon cihazının içine asla nefes vermeyiniz.

Dış kapağı, ilacı almaya hazır olduğunuzda açınız.

Söylenen dozdan daha fazla almayınız.

### **Değişik yaş grupları:**

#### **Çocuklarda kullanım:**

18 yaş altı çocuklarda karmoterol kullanımına yönelik veri mevcut değildir. Bu nedenle LUXNİD çocuklarda ve ergenlerde kullanılmamalıdır.

#### **Yaşlılarda kullanım:**

LUXNİD'in yaşlılarda kullanımına yönelik veri mevcut değildir.

#### **Özel kullanım durumları:**

##### **Böbrek yetmezliği:**

LUXNİD'in böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanımına yönelik veri mevcut değildir.

##### **Karaciğer yetmezliği:**

LUXNİD'in karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanımına yönelik veri mevcut değildir.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

Doktorunuz LUXNİD ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir.

Doktorunuz ile konuşmadan başka bir ilaç kullanmayınız (reçetesiz ilaçlar da dahil olmak üzere).

*Eğer LUXNİD'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.*

### **Kullanmanız gerekenden daha fazla LUXNİD kullandıysanız**

Doktorunuzun size söylediğinden daha fazla LUXNİD yanlışlıkla aldıysanız, mide bulantısı hissedebilir veya kusabilirsiniz ya da titreme, baş ağrısı, sersemlik (yüksek kan basıncına

bağlı bir etki olabilir), hızlı kalp atışı yaşayabilir veyahut kendinizi uykulu hissedebilirsiniz. Uzun süre kullanmanız gerekenden fazla LUXNİD kullandıysanız, belli seviyede böbreküstü bezi baskılanması olabilir ve böbrek üstü bezi fonksiyonlarınızın kontrolü gerekebilir. Derhal doktorunuzla konuşun ya da en yakın acil servise başvurun. Tıbbi tedavi görmeniz gerekebilir (Kullanmakta olduğunuz ilaçları yanınızda götürmeyi unutmayınız).

*LUXNİD'ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

### **LUXNİD'i kullanmayı unutursanız**

İlacınızı almayı unutursanız, unuttuğunuzu fark eder etmez bu dozu alınız ve sonraki dozu her zamanki saatte alınız.

İlacınızı almayı unuttuğunuzu fark ettiğinizde, sonraki dozun saati yaklaşmış ise, unuttuğunuz dozu atlayınız.

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.*

### **LUXNİD ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler**

İlacı kullanmayı doktorunuza danışmadan aniden kesmeyiniz.

Doktorunuzun önerisi dışında tedaviyi sonlandırmanız, hastalığınızın şiddetlenmesine ve tedavinin aksamasına neden olabilir.

Kendinizi iyi hissetseniz bile LUXNİD'i doktorunuz kullanmamanızı söyleyene kadar kullanın.

### **4. Olası yan etkiler nelerdir?**

Tüm ilaçlar gibi LUXNİD'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

LUXNİD'i kullanırken ciddi astım krizleri (nefes darlığında, öksürükte, hırıltıda şiddetli artış ya da hastaneye yatış ile sonuçlanabilecek göğüs sıkışması) gözlenebilir. Böyle bir etki ile karşılaşırsanız DERHAL doktorunuzu arayınız.

Bazı yan etkiler ciddi olabilir;

- Alerjik reaksiyonlar, örneğin baygınlık hissi (düşük kan basıncı), deri döküntüsü, kaşıntı ya da yüzünüzde ve boğazınızda şişme (anjyonörotik ödem),
- Solunum yollarında beklenmeyen bir daralma (bronkospazm),

- Kas güçsüzlüğü, kas kasılmaları (kas spazmları) veya anormal bir kalp ritmini içeren belirtiler (bu, kan potasyum seviyenizin düşük olduğu anlamına gelebilir),
- Düzensiz kalp atışı (hızlı kalp atışını da içeren),
- Baskı tarzında göğüs ağrısı (anjina pektoris adı verilen kalbi besleyen damarların daralması/tıkanması ile ortaya çıkan göğüs ağrısı).

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın	:10 hastanın en az 1'inde görülebilir.
Yaygın	:10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan	:100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek	:1.000 hastanın birinden az görülebilir.
Çok seyrek	:10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Sıklığı bilinmeyen	:Eldeki veriler ile belirlenemeyecek kadar az hastada görülebilir.

#### **Yaygın olmayan:**

- Ses kısıklığı/boğukluğu, inhalasyon sonrası öksürük ve hırıltının artması,
- Hoş olmayan tat, ağızda veya boğazda yanma, iltihaplanma, iritasyon, kuruluk,
- Bulantı, kusma,
- Ağız içinde aft (ağız mantar enfeksiyonları),
- Baş ağrısı,
- Deride kaşınma ve kızarıklığa neden olan döküntü ve/veya egzama.

#### **Seyrek:**

- Yüksek kan basıncı, çarpıntı,
- Karın ağrısı ve hazımsızlık.

#### **Bilinmiyor:**

- Titreme,
- Astımın kötüleşmesi,
- Aşırı susama, normalden daha fazla idrara çıkma, kilo kaybı ile seyreden iştah artışı, yorgunluk, yüksek kan şekeri düzeyi (diyabet),
- Yüksek kan şekeri düzeyi,

- Bař ađrısı ve sersemlik (yüksek kan basıncına bađlı bir etki olabilir),
- Göğüste rahatsızlık hissi (kalple bađlantılı olmayan),
- Karıncalanma ya da uyuřma (parestezi),
- Öksürük,
- Huzursuzluk (ajitasyon),
- Kaygı, endiře (anksiyete),
- Sinirlilik,
- Kendini aşırı heyecanlı veya gergin hissetme, depresyon, uyku bozuklukları, davranıř deđiřiklikleri (özellikle çocuklarda),
- Uykusuzluk,
- Bař dönmesi,
- Kas krampları,
- Kaslarda ya da kemiklerde ađrı,
- Kas kasılması,
- Tat alma bozuklukları,
- Eller, ayak bilekleri ya da ayaklarda řiřme (ödem),
- Yanaklarda ya da alında basınç ya da ađrı hissi (sinüslerde iltihap),
- Burun akıntısı,
- Burun ve yutak iltihabı,
- Bođaz ađrısı,
- Sođuk algnlıđı benzeri belirtiler: bođaz ađrısı, burun akıntısı, burun tıkanıklıđı, hapřırma, öksürük, bař ađrısı belirtilerinden biri ya da birkaçı,
- Denge bozukluđundan kaynaklanan bař dönmesi (vertigo),
- Üst solunum yolu enfeksiyonu.

LUXNİD siklesonid içermektedir. Siklesonid, vücudunuzda steroidlerin normal üretimini etkileyebilir. Bu durum, genellikle uzun süre ve yüksek dozda tedavi gören hastalarda gözlenir. Bu etkiler:

- Kemiklerin incelmesi,
- Göz lensinde muhtemel bulanmalara (katarakt) yol açarak netliđi bozulan görüř,
- Gözde yüksek tansiyona bađlı olarak görme kaybı (glokom),
- Aydede yüz, vücudun üst kısmında kilo artışı, kol ve bacaklarda incelme (Cushing'e benzer özellikler, Cushing sendromu).

Steroid tabletler, LUXNİD gibi bir inhalerden daha fazla yan etkiye neden olabilir. Eğer LUXNİD kullanımını sırasında veya daha önce steroid tablet aldıysanız, tabletlere bağlı yan etki oluşma riski bir süre daha devam edebilir.

Doktorunuzun gözetiminde düzenli sağlık kontrolü yaptırmanız, sizin için doğru olan LUXNİD dozunu aldığınızdan emin olmanızı sağlar. Düzenli kontroller aynı zamanda oluşabilecek yan etkilerin kısa zamanda fark edilmesini sağlar ve kötüleşme ihtimalini engeller.

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

### **5. LUXNİD'in saklanması**

*LUXNİD'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.*

25 °C'nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru yerde saklayınız.

### **Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.**

*Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra LUXNİD'i kullanmayınız.*

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz, LUXNİD'i kullanmayınız.

***Ruhsat Sahibi :*** Neutec İnhaler İlaç San. ve Tic. A.Ş.  
Sakarya 1. Organize Sanayi Bölgesi  
2. Yol No:3  
Arifiye / Sakarya  
Tel: 0850 201 23 23  
Faks: 0212 482 24 78  
e-mail: info@neutecinhaler.com

***Üretim Yeri :*** Neutec İlaç San. Tic. A.Ş.  
1.OSB. 1.Yol No:3 Adapazarı / SAKARYA

*Bu kullanma talimatı 05.02.2014 tarihinde onaylanmıştır.*