

KULLANMA TALİMATI

BROMEK Şurup, 100 mL

Ağızdan alınır.

- **Etkin madde:** Her ölçek (5 ml) 4 mg Bromeksin hidroklorür içerir.
- **Yardımcı maddeler:** Şeker, alkol, sakkarin, benzoik asit, esans frambuaz, sitrik asit (pH 3.5-4.5), deiyonize su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

1. ***BROMEK nedir ve ne için kullanılır?***
2. ***BROMEK'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler***
3. ***BROMEK nasıl kullanılır?***
4. ***Olası yan etkiler nelerdir?***
5. ***BROMEK'in saklanması***

Başlıkları yer almaktadır.

1. BROMEK nedir ve ne için kullanılır?

BROMEK Şurup, 100 ml'lik bal renkli şişede 5 ml'lik ölçekle beraber sunulan ve her ölçekte etkin madde olarak 4 mg bromeksin hidroklorür (0.8 mg/ml) içeren bir şuruptur.

BROMEK Şurup, geçmeyen öksürüklerde balgam sökmekte zorlanılıyorsa, balgam sökücü olarak kullanılır.

2. BROMEK'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

BROMEK'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Bromeksin hidroklorür veya BROMEK Şurup'un içeriğindeki maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa bu ilacı kullanmayınız.

BROMEK'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Hamileliğinizin ilk üç ayında doktorunuza danışmadan kullanmayınız. Mide ülseriniz var ise doktor tavsiyesi ile kullanılmalıdır.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız.

BROMEK'in yiyecek ve iecek ile kullanılması

Yiyecek veya ieceklerle kullanılmasında herhangi bir sorun yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

BROMEK řurup iin, hamilelikte kullanımı ile ilgili yeterli deneyim bulunmamaktadır. Hayvan deneylerindeki tedavi dozlarında kullanıldıđında fetüste herhangi bir hasar olduđuna dair kanıt bulunamamıřtır.

Gerekli olduđu durumlarda doktorunuzun kontrolü altında kullanınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduđunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danıřınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

BROMEK řurup az da olsa anne sütüne geçmektedir. Doktorunuza danıřmadan kullanmayınız.

Ara ve makine kullanımı

ok seyrek de olsa bař dönmesine sebep olabileceđinden, ara ve makine kullanımı sırasında dikkatli olunmalıdır.

BROMEK'in ieriđinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

BROMEK řurup her dozda (5 mL'de) 2,33 g glikoz ierir. Bu, diabetes mellitus hastalarında göz önünde bulundurulmalıdır. Eđer daha önceden doktorunuz tarafından bazı řekerlere karřı intoleransınız olduđu söylenmiřse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz. Nadir glukoz-galaktoz malabsorpsiyon hastalıđı olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.

BROMEK řurup, hacmin %9,73'ü kadar etanol (alkol) ierir; örneđin her dozda (5 mL'de) 486,66 mg'a kadar, her dozda 9,73 ml biraya eřdeđer, her dozda 4,06 ml řaraba eřdeđer gibi. Alkol bađımlılıđı olanlar iin zararlı olabilir. Hamile veya emziren kadınlar, çocuklar ve karaciđer hastalıđı ya da epilepsi gibi yüksek risk grubundaki hastalar iin dikkate alınmalıdır.

Diđer ilalar ile birlikte kullanımı

Antitüssif (öksürük kesici) ve ifrazatı kurutan atropin ve benzeri ilalarla bir arada kullanılmamalıdır.

Eđer reeteli ya da reetesiz herhangi bir ilacı řu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. BROMEK nasıl kullanılır?

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıka, bu talimatları takip ediniz.

İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklıđı iin talimatlar:

BROMEK řurup balgam sökülmesine yardımcı olur ve bronřiyal salgıları artırır. ok uzun süreli kullanımlar iin uygun deđildir. Tekrar kullanımlar iin doktora danıřılmalıdır.

Yetiřkinler ve 12 yař üzeri çocuklar:

Günde 3 kez 1 – 2 ölek (5 – 10 ml)

Uygulama yolu ve metodu:

BROMEK Şurup sadece ağızdan kullanım içindir. Ölçek kaşığı kullanılarak içilir. Çok uzun süreli kullanımlar için uygun değildir. Tedaviye başladıktan sonra 14 günde belirtilerde düzelme olmaz veya şiddetlenirse doktora danışılmalıdır.

Değişik yaş grupları:**Çocuklarda kullanım:**

6 – 12 yaş arası çocuklarda günde 3 kez 1/2 (yarım) – 1 ölçek

2 – 6 yaş arası çocuklarda günde 3 kez 1/2 (yarım) ölçek

Yaşlılarda kullanım:

Doz ayarlaması gerekli değildir.

Özel kullanım durumları**Böbrek, karaciğer yetmezliği**

Böbrek yetmezliği durumlarında dikkatli olunmalıdır.

Ağır karaciğer hastalarında doktor kontrolünde alınmalıdır.

Pediyatrik popülasyon:

BROMEK Şurup pediyatrik hastalarda uygulama yolu ve metodu kısmında belirtildiği gibi uygulanmalıdır. İki yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

Eğer BROMEK'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla BROMEK kullandıysanız :

BROMEK'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

BROMEK'i kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

BROMEK ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

BROMEK Şurup tedavisi sonlandırıldığında herhangi bir olumsuz etki oluşması beklenmemektedir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, BROMEK'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa BROMEK'i kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz :

Deri döküntüleri, yüz, dudaklar, ağız, dil ve boğazda şişme ve şişmeye bağlı yutma veya nefes alma güçlüğü.

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan sizde mevcut ise, sizin BROMEK'e karşı ciddi alerjik reaksiyonunuz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz :
Bulantı, ishal, hazımsızlık, şişkinlik, kabızlık, baş ağrısı, baş dönmesi, terleme.

Bunlar BROMEK'in zayıf yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. BROMEK'in saklanması :

BROMEK'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. Işıktan koruyarak, 25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki/şişedeki son kullanma tarihinden sonra BROMEK'i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz BROMEK'i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi : KOÇAK FARMA İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
Bağlarbaşı, Gazi Cad., No:64-66
Üsküdar / İstanbul

İmal yeri : KOÇAK FARMA İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi
Çerkezköy / Tekirdağ

Bu kullanma talimatı gg.aa.yyyy tarihinde onaylanmıştır.