

KULLANMA TALİMATI

KALOBA oral çözelti

Ağızdan alınır.

• **Etkin madde** : Her 1 ml (20 damla) çözelti 0,018468 g *Pelargonium sidoides* kökü kuru ekstresi içerir.

• **Yardımcı maddeler** : Propilen glükol, gliserin, potasyum sorbat, sodyum benzoat, deiyonize su.

Bu tıbbi ürünü kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATININ tümünü dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*

- *Bu tıbbi ürün reçetesiz satılmaktadır. Bununla birlikte, ondan en iyi sonucu elde etmek için KALOBA' yı yine de dikkatlice kullanmanız gerekir.*

- *Bu tıbbi ürünün kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu tıbbi ürünü kullandığınızı söyleyiniz.*

- *Eğer daha fazla bilgi veya tavsiyeye ihtiyaç duyarsanız doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.*

Bu Kullanma Talimatında:

1. KALOBA nedir ve ne için kullanılır?

2. KALOBA'yı kullanmaya başlamadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. KALOBA nasıl kullanılmalı?

4. Olası yan etkileri

5. KALOBA'nın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. KALOPA nedir ve ne için kullanılır?

KALOPA, *Pelargonium sidoides* kökünün ekstresini içeren açık kahverengi ve kıvılcımsı kahverengi arası renkte bir çözeltilidir. Her 1 ml (20 damla) çözeltili 0,018468 g *Pelargonium sidoides* kökü kuru ekstresi içerir.

Kutuda, 20 ml ve 50 ml' lik oral çözeltili içeren ağzı beyaz renkli, kilitli vidalı, HDPE kapak ile kapatılmış, şişe ağzında şeffaf LDPE damlalık bulunan amber renkli Tip III cam şişede kullanıma sunulmuştur.

KALOPA; soğuk algınlığı, bronşit ve sinüzit gibi akut üst solunum yolları hastalıklarının boğaz ağrısı, öksürük, burun akması veya tıkanıklığı gibi belirtilerinin hafifletilmesinde kullanılır.

2. KALOPA'yı kullanmaya başlamadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Aşağıdaki durumlarda KALOPA'yı KULLANMAYINIZ:

Eğer,

- Etkin madde veya KALOPA'nın herhangi bir bileşenine aşırı duyarlı (alerjik) iseniz,
- Karaciğer veya böbrek hastalığınız varsa,
- Kanama eğiliminiz yüksek düzeydeyse veya Kumarin türevleri gibi pıhtılaşmayı azaltıcı ilaçlar alıyorsanız,
- 6 yaşın altındaki çocuklarda.

Aşağıdaki durumlarda KALOPA'yı DİKKATLE KULLANINIZ:

- KALOPA kullanmanıza rağmen, hastalığınız bir hafta içinde düzelmezse,
- Birkaç gündür süren bir ateşiniz varsa veya nefes darlığı ya da kanlı balgam yakınmanız varsa bir doktora danışınız.

Ürünün kullanımı ile ilgili karaciğer üzerine zararlı etki (karaciğer toksisitesi) ve karaciğer iltihabı (hepatit) vakaları bildirilmiştir. Karaciğer üzerine zararlı etkisine dair bir belirti görülmesi halinde derhal ürünün kullanımı durdurulmalı ve doktora danışılmalıdır.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

KALOPA' nın etkisine tesir edebilecek besinlerle ve içeceklerle kullanılması

KALOPA'nın yiyecek ve içecek ile kullanılmasıyla ilgili herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Hamilelik

Bu tıbbi ürünü kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu hasta grupları için yeterli veri olmadığından ürünü hamile kadınlar kullanmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

Bu tıbbi ürünü kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu hasta grupları için yeterli veri olmadığından ürünü emziren kadınlar kullanmamalıdır.

Araç ve makine kullanımı

KALOPA' nın araç ve makine kullanma kabiliyeti üzerinde etkisine ilişkin bir çalışma bulunmamaktadır.

KALOPA'nın bazı bileşenleri hakkında önemli bilgiler:

Bu tıbbi ürün propilen glikol, gliserin, potasyum ve sodyum içermektedir. Alınan günlük dozlarda bu maddeler ile ilgili herhangi bir uyarı gerektirmemektedir.

KALOPA ile birlikte diğer tıbbi ürünleri kullanmak

Bugüne kadar bir ilaç etkileşimi bildirilmemiştir.

Ancak, KALLOBA'nın pıhtılařma ölçütlerindeki potansiyel etkisi nedeniyle bu ürün Kumarin türevleri gibi pıhtılařma azaltıcı ilaçların etkilerini arttırabilir ve bu yüzden bu ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır.

Eđer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı řu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. KALLOBA nasıl kullanılmalı?

Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:

KALLOBA'yı kullanırken her zaman doktorunuzun talimatlarına kesin olarak uyunuz.

Emin olmadığımızda doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

Doktorunuz tarafından başka şekilde tavsiye edilmediğı takdirde;

Yetişkinlerde ve gençlerde (12 yaş üzeri):

Günde 3 kez 30 damla (3 x 30 damla)

Çocuklar (6-12 yaş):

Günde 3 kez 20 damla (3 x 20 damla)

Uygulama yolu ve metodu:

Yeterli damla miktarı doğrudan bir kaşıkla alınabilir veya tercihen yarım bardak suyla karıştırılabilir, bu durumda bardağın tamamı hemen içilmelidir. Tercihen yemeklerden yarım saat önce alınmalıdır.

Doz sabah, gün ortasında ve akşam alınacaktır.

Belirtiler geçtikten sonra tekrarlanmamaları için 2-3 gün daha kullanılması önerilmektedir.

Tedavi süresi 2 haftayı aşmamalıdır.

Değişik yaş grupları :

Çocuklarda kullanımı :

6 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı ile ilgili yeterli bilgi ve veri bulunmadığı için kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı :

Yaşlılarda doz ayarlamasına ilişkin çalışma bulunmamaktadır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek / Karaciğer yetmezliği:

Böbrek / Karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Eğer KALOPA'nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Eğer almanız gerekenden daha fazla KALOPA kullanırsanız:

KALOPA'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Eğer KALOPA'yı kullanmayı unutursanız

Unuttuğunuz dozu tamamlamak için çift doz almayınız.

KALOPA ile tedavi kesildiğinde görülen etkiler

KALOPA ile tedavi kesildiğinde beklenmeyen bir etki ile karşılaşırsanız doktor veya eczacınıza danışınız.

4. Olası yan etkileri

Tüm ilaçlar gibi KALOPA'nın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

İstenmeyen etkilerin değerlendirilmesi aşağıdaki sıklıklara dayanarak yapılır :

Çok yaygın ($\geq 1/10$); yaygın ($\geq 1/100$ ila $< 1/10$); yaygın olmayan ($\geq 1/1.000$ ila $< 1/100$); seyrek ($\geq 1/10.000$ ila $< 1/1.000$); çok seyrek ($< 1/10.000$), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

Aşağıdakilerden biri olursa, KALOPA'yı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Yüz şişmesi
- Nefes tıkanması
- Kan basıncında düşme
- Karaciğer işlevlerinde sıkıntı belirtileri [karaciğer üzerine zararlı etki (karaciğer toksisitesi), karaciğer iltihabı (hepatit), karaciğer enzim değerlerinde artış gibi]

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin KALOPA'ya karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini farkederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Dişetlerinde veya burunda hafif kanama
- Aşırı duyarlılık reaksiyonları, örneğin: Cilt döküntüsü, kurdeşen, deride ve mukoz zarlarda kaşınma

Bu yan etkilerin hepsi seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini farkederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

- İshal
- Mide ekşimesi
- Karın ağrısı
- Mide bulantısı, kusma

Bunlar KALOPA'nın yaygın olmayan yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında değinilmeyen herhangi bir yan etki fark ederseniz, doktorunuz veya eczacınıza bildiriniz.

5. KALOPA'nın saklanması

KALOPA'yı çocukların göremeyeceđi, erişemeyeceđi yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Eđer üründe ve / veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz KALOPA'yı kullanmayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra KALOPA'yı kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi: TALU İLAÇ ve KOZMETİK DAĞITIM ve PAZARLAMA LTD. ŞTİ.

İnönü Mahallesi Kartal Caddesi No: 44 / 2 Küçükbakkalköy - Ataşehir / İSTANBUL

Tel : 0-216-574 24 60

Faz : 0-216-576 34 31

e-mail: info@istanbulkoz.com.tr

Üretim Yeri : DENTORAL MEDİFARMA İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.

Koşuyolu Mah. Vakıf Sok. No : 4 Kadıköy / İstanbul

Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.

SADECE ECZANELERDE SATILIR.