

KULLANMA TALİMATI

GAVISCON likit **Ağız yoluyla alınır.**

Her bir 5 ml süspansiyon;

- **Etkin madde:** 250,00 mg sodyum aljinat ve 133,50 mg sodyum bikarbonat ve 80 mg kalsiyum karbonat,
- **Yardımcı maddeler:** Karbomer, Sodyum sakarin, Metil paraben (E218), Propil paraben (E216), Nane aroması, Sodyum hidroksit, Saf su içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük doz kullanmayınız.***

Bu Kullanma Talimatında;

- 1. GAVISCON nedir ve ne için kullanılır?**
 - 2. GAVISCON'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
 - 3. GAVISCON nasıl kullanılır?**
 - 4. Olası yan etkiler nelerdir?**
 - 5. GAVISCON'un saklanması**
- Başlıkları yer almaktadır.**

1. GAVISCON nedir ve ne için kullanılır?

GAVISCON; opak, krem-beyaz renkli, nane kokulu ve nane tadında yoğun kıvamlı bir sıvıdır.

GAVISCON; karton kutu içerisinde amber renkli 200 ml lik şişede temin edilir.

GAVISCON, reflü özofajit (yemek borusu iltihabı) kaynaklı şikayetleri olan hastalarda, gebelikte ya da yemeklerden sonra oluşan (reflüden kaynaklanan) hazımsızlık, mide yanması ve mideden ağza asit gelmesi gibi gastroözofageal reflü (mide ve yemek borusu iltihabı) belirtilerinin tedavisinde kullanılır.

2. GAVISCON'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

GAVISCON'u aşağıdaki durumda KULLANMAYINIZ

- GAVISCON içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı alerjiniz varsa (Nefes almada güçlük veya deri döküntüleri meydana gelmişse)

GAVISCON'u ařağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Ařağıda belirtilen durumlardan herhangi biri sizin için söz konusuysa, tedaviniz doktorunuz tarafından dikkatli bir řekilde dzenlenmelidir:

- Doktorunuz tarafından sodyum ve/veya kalsiyum kısıtlaması önerilmiřse,
- Böbrek ya da kalp rahatsızlıęınız varsa ya da gemiřte olduysa (bazı tuzlar bu tür durumları etkileyebilir),
- Midenizdeki asit seviyesi ok dűřükse (bu durumda ilacın etkisi azalabilir),
- řiddetli böbrek yetmezlięiniz varsa,
- Yedi gün sonra belirtilerde dűzelme olmazsa.

Metil paraben (E218) ve propil paraben (E216) ierdięinden (muhtemelen gecikmiř) alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

Bu uyarılar gemiřteki herhangi bir dözemde dahi olsa sizin için geerliyse lűtfen doktorunuza danıřınız.

GAVISCON'un yiyecek ve iecek ile kullanılması
GAVISCON yemeklerden sonra ağız yoluyla uygulanır.

Hamilelik:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

GAVISCON, gebelik dözeminde kullanılabilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduęunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Emzirme:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

GAVISCON, emzirme dözeminde kullanabilir.

Ara ve makine kullanımı:

GAVISCON'un ara ve makine kullanımını etkilemesi beklenmemektedir.

GAVISCON'un ierięinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün her bir 10 ml'sinde 141 mg (6,2 mmol) sodyum ierir. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Bu tıbbi ürün her bir 10 ml'sinde 160 mg (1,6 mmol) kalsiyum karbonat ierir. Kanda kalsiyum miktarı yüksek olan ve tekrarlayan böbrek tařı olan hastalarda dikkatli olunmalıdır.

Bu tıbbi ürün metil paraben (E218) ve propil paraben (E216) ierdięinden (muhtemelen gecikmiř) alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

Dięer ilalar ile birlikte kullanımı

Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında GAVISCON'un ya da kullanılan diğer ilacın etkisi değişebilir. Aşağıdaki ilaçlarla birlikte GAVISCON kullanımı arasında 2 saat ara verilmelidir:

- H₂-antihistaminikler (mide yanması için),
- Tetrasiklinler, norfloksasin gibi kinolon grubu antibiyotikler (enfeksiyon tedavisi için),
- Demir içeren ilaçlar,
- Ketokonazol (mantar için),
- Tiroksin (tiroid hastalığı için),
- Atenolol, metoprolol, propanolol gibi beta-blokörler ve digoksin (kalp hastalıkları için),
- Nöroleptikler (sinir hastalıkları için)
- Glukokortikoid (bir çeşit hormon ilacı)
- Klorokin (sıtma için)
- Bifosfonatlar (kemik erimesi için)

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz

3. GAVISCON nasıl kullanılır?

Doktorunuz alacağınız doz miktarını ve GAVISCON ile yapılacak tedavi süresini belirleyecektir. Tedaviyi kendi kendinize kesmeyiniz ve uzatmayınız.

Doktorunuz başka şekilde önermemişse, GAVISCON'u aşağıdaki gibi kullanınız.

- **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:**

GAVISCON, ağızdan alınarak kullanılır.

GAVISCON, yetişkinler ve 12 yaşından büyük çocuklarda yemeklerden sonra ve yatarken 10-20 ml (1-2 tatlı kaşığı) kullanılır.

- **Uygulama yolu ve metodu:**

GAVISCON, ağızdan alınarak kullanılır.

- **Değişik yaş grupları:**

- **Çocuklarda kullanımı:**

6-12 yaş arası çocuklarda yemeklerden sonra ve yatarken 5-10 ml (1-2 çay kaşığı).

12 yaşından büyük çocuklar için yemeklerden sonra ve yatarken 10-20 ml'dir (1-2 tatlı kaşığı).

12 yaşın altındaki çocuklarda sadece doktor tavsiyesi üzerine verilmelidir.

6 yaş altındaki çocuklarda kullanımı önerilmez.

Yaşlılarda kullanımı: Doz ayarlaması gerekmez.

- **Özel kullanım durumları:**

Böbrek yetmezliği: Kalsiyum ve sodyum içerdiğinden dolayı böbrek bozukluğu olan hastalarda dikkatli olunmalıdır.

Karaciğer yetmezliği: Özel kullanımı yoktur.

Eğer GAVISCON'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuza veya eczacınıza ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla GAVISCON kullandıysanız:

GAVISCON'u kullanmanız gerekenden daha fazla kullandıysanız herhangi bir zarar oluşması beklenmez, ancak karnınızda şişkinlik hissedebilirsiniz.

GAVISCON'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

GAVISCON'u kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.
GAVISCON'u belirtildiği gibi kullanmaya devam ediniz.

GAVISCON ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Doktorunuza danışmadan tedavinizi yarım bıraktığınız takdirde hastalığınızın belirtileri tekrar ortaya çıkabilir.

7 gün sonunda belirtiler düzelmediği takdirde doktorunuza danışınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, GAVISCON'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkileri olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, GAVISCON'u kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Deri döküntüleri
- Nefes almada güçlük
- Baş dönmesi
- Yüz, dudaklar, dil veya boğazda şişme

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin GAVISCON'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. GAVISCON'un saklanması

GAVISCON'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

30°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Buzdolabına koymayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra GAVISCON'u kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi: Reckitt Benckiser Tem. Mal. San. ve Tic. A.Ş.
Hakkı Yeten Cad. Selenium Plaza Kat:7 34349
Fulya-İstanbul

Üretici: Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
İngiltere

Bu kullanma talimatı ../../.. tarihinde onaylanmıştır.