

KULLANMA TALİMATI

TUSCOD 7.5 mg/5 ml Şurup Ağız yoluyla alınır.

- **Etkin madde:** Her 5 ml şurup, 7,5 mg butamirat sitrat içerir.
- **Yardımcı maddeler:** : Sodyum sakarin dihidrat, sodyum siklamat anhidrus, benzoik asit, gliserol, sorbitol, kayısı aroması, sodyum hidroksit % 10 a/a veya hidroklorik asit % 10 a/a, saf su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu kullanma talimatında:

1. **TUSCOD nedir ve ne için kullanılır?**
 2. **TUSCOD'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
 3. **TUSCOD nasıl kullanılır?**
 4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
 5. **TUSCOD'un saklanması**
- Başlıkları yer almaktadır.**

1. TUSCOD nedir ve ne için kullanılır?

- TUSCOD etkin madde olarak butamirat sitrat içeren, renksiz ve homojen çözelti görünümünde, şurup formunda bir ilaçtır.
- TUSCOD "öksürük baskılayıcı ilaçlar" olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir.
- TUSCOD 100 ml ve 200 ml'lik amber renkli cam şişede, 5 ml'lik kaşık ölçekle birlikte karton kutu içerisinde kullanıma sunulmaktadır.
- TUSCOD çeşitli nedenlerden kaynaklanan öksürüğün şikayetlere yönelik (semptomatik) tedavisinde kullanılır.

2. TUSCOD'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

TUSCOD'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer sizin/çocuğunuzun butamirat veya TUSCOD'un bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı (yardımcı maddeler listesine bakınız) alerjiniz/alerjisi varsa

TUSCOD'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer siz/çocuğunuz aynı zamanda başka balgam söktürücü ilaçlar alıyorsanız, dikkatli olmalısınız. TUSCOD'un bu tür ilaçlarla aynı anda kullanılmaması önerilir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin/çocuğunuz için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Öksürük 7 günden daha uzun süre devam ederse doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile iseniz, ilk üç ay TUSCOD kullanmamanız önerilmektedir. Daha sonraki dönemde, ancak doktorunuz kesin gereklilik olduğuna karar verirse TUSCOD kullanabilirsiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bebeğinizi emziriyorsanız, TUSCOD almadan önce doktorunuza danışınız.

Araç ve makine kullanımı

TUSCOD uyukulu hissetmenize neden olabilir. Bu nedenle araç ve makine kullanırken veya dikkat gerektiren diğer işleri yaparken dikkatli olunuz.

TUSCOD'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

- TUSCOD sorbitol içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
- Bu tıbbi ürün her 5 ml'lik dozunda 1 mg sodyum sakarin dihidrat ve 1.5 mg sodyum siklamat anhidrus ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.
- Bu tıbbi ürün benzoik asit içermektedir. Ancak kullanım yolu nedeniyle herhangi bir yan etki beklenmemektedir.
- Bu tıbbi ürün gliserin içermektedir. Bu nedenle baş ağrısı, mide bulantısı ve ishale sebebiyet verebilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer balgam söktürücü özelliği olan başka ilaçlar kullanıyorsanız doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. TUSCOD nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde kendiniz/çocuğunuz için belirtilen dozlarda kullanınız:

3-6 yaş arasındaki çocuklarda: Günde 3 defa 1 kaşık (5 ml)

6-12 yaşındaki çocuklarda: Günde 3 defa 2 kaşık (10 ml)

Ergenlerde (adolesanlarda): Günde 3 defa 3 kaşık (15 ml)

Yetişkinlerde: Günde 4 defa 3 kaşık (15 ml)

Doktorunuz farklı bir tavsiyede bulunmadıkça, TUSCOD'u bir haftadan daha uzun süre kullanmayınız.

Uygulama yolu ve metodu:
TUSCOD ağız yoluyla kullanılır.

İlacınızın dozunu ayarlamak için kaşık ölçeği kullanınız. Kaşık ölçeği her kullanımda yıkayıp kurulaınız.

Değişik yaş grupları:
Çocuklarda kullanımı:

TUSCOD Şurup'un 3 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı araştırılmamıştır.

Yaşlılarda kullanımı:

TUSCOD'un yaşlılarda kullanımı araştırılmamıştır.

Özel kullanım durumları:

TUSCOD böbrek veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda araştırılmamıştır.

Eğer TUSCOD'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuza veya eczacınıza ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla TUSCOD kullandıysanız:

TUSCOD'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor ve eczacı ile konuşunuz.

TUSCOD'u kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Aşırı dozda TUSCOD alınması halinde şu belirtiler görülebilir: Uyku hali, bulantı, kusma, ishal, sersemlik ve tansiyon düşmesi. Bu etkiler doz azaltılınca veya tedavi kesilince ortadan kalkabilir. Eğer ilaç kesildiğinde bu etkiler devam ediyorsa doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

TUSCOD ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, TUSCOD'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa TUSCOD'u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Ciltte döküntü

Bu çok ciddi bir yan etkidir. Eğer sizde mevcut ise, sizin TUSCOD'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etki oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

- Uyku hali
- Bulantı
- İshal

Bunlar TUSCOD'un hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. TUSCOD'un saklanması

TUSCOD'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra TUSCOD'u kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz TUSCOD'u kullanmayınız.

Ruhsat sahibi : Karfarma İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Ferhatpaşa Mah. Karadeniz Cad. 16. Sok.
No: 2/2 34888 Ataşehir / İstanbul
Tel: 0 216 545 10 16 – 17 (2 hat)
Fax: 0 216 545 10 18
e-mail: info@karfarma.com.tr

Üretim Yeri : Berko İlaç ve Kimya San. A.Ş
Adil Mh. Beykoz Cd. Tanıdık Sk. No:1
Sultanbeyli – İstanbul

Bu kullanma talimatı 07/04/2014 tarihinde onaylanmıştır.