

KULLANMA TALİMATI

HYPERIUM 1 mg tablet

Ağız yoluyla alınır.

Etkin madde: Her bir tablet 1 mg Rilmenidin içermektedir.

Yardımcı maddeler: 4.5 mg Sodyum nişasta glikolat, Mikrokristalin selüloz, 47 mg Laktoz, Parafin 54/56, Anhidr koloidal silis, Magnezyum stearat, Talk, Beyaz balmumu

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

1. **HYPERIUM nedir ve ne için kullanılır?**
2. **HYPERIUM'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **HYPERIUM nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkileri nelerdir?**
5. **HYPERIUM'un saklanması**

Başlıkları yer almaktadır

1. HYPERIUM nedir ve ne için kullanılır?

- HYPERIUM yüksek kan basıncını (hipertansiyon) düşürmeye yarayan bir ilaç olup antihipertansif ilaçlar grubuna aittir
- HYPERIUM, 30 tablet içeren blister ambalajlarda bulunmaktadır.
- Hipertansiyon (yüksek tansiyon) tedavisinde kullanılmaktadır.

2. HYPERIUM'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Aşağıdaki durumlarda HYPERIUM'u KULLANMAYINIZ

- Tablet içeriğindeki etkin madde veya yardımcı maddelerden birine karşı aşırı duyarlılık
- Şiddetli depresyon
- Şiddetli böbrek yetmezliği (kreatinin klirensi 15 mL/dak altında ise)
- Sultoprid ile birlikte

Bu ilaç genel olarak aşağıdaki durumlarda kullanılmamalıdır:

- Alkol ile birlikte
- Kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan beta-blokerler ile birlikte (bisoprolol, karvedilol, metoprolol)

HYPERIUM'u ařağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

- Tedavi ani olarak kesilmemeli, doz yavaş yavaş azaltılmalıdır.
- Bu tedavi tıbbi gözetim altında uygulanmalıdır.
- Tedavi süresince alkol kullanılmamalıdır.
- HYPERIUM'u kullanmadan önce doktorunuzu bilgilendiriniz.
- Eğer böbrek yetmezliğiniz ya da kalp hastalığınız varsa doktorunuzu bilgilendiriniz.

"Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız".

HYPERIUM'un yiyecek ve içecek ile kullanılması

Dozlar, sabahları yemekten önce bir bardak su ile bütün olarak yutulmalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

- Gebe kadınlarda ilacın güvenli olduğunu gösteren çalışma yoktur. Bu nedenle gebelikte kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

- *İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- Emziriyorsanız bu ilacı kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

Normal dozlardan daha yüksek dozlada alındığında veya dikkati azaltıcı etkileri bilinen diğer ilaçlarla beraber kullanıldığında, araç, makine vs. kullanan kişilerde muhtemel bir uyku hali görülebilir. Bu durumda araç ve makine kullanılmamalıdır.

HYPERIUM'un içeriğinde bulunan bazı maddeler hakkında önemli bilgiler

HYPERIUM, her tablette:

- 47mg laktoz içermektedir. Doktorunuz tarafından bazı şeker türlerine karşı duyarlılığınız ve alerjiniz olduğu belirtilmişse veya şeker hastalığınız (diyabet) varsa bu ilacı kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışınız.
- 4.5 mg sodyum nişasta glikolat içermektedir. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Diğer ilaçlarla etkileşimi engellemek için doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz, özellikle sultoprid, alkol ve kalp yetmezliğinde kullanılan beta blokerler (bisoprolol, karvedilol, metoprolol) ile birlikte kullanmayınız.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. HYPERIUM nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz sıklığı için talimatlar

Tavsiye edilen doz 1 mg'dır.

Bir ay zarfında yeterli yanıt alınmazsa, günlük doz bir sabah, bir akşam alınmak üzere (yemeklerden önce) 2 mg'a çıkarılabilir.

Uygulama yolu ve metodu

Ağızdan kullanılır.

Yemekten önce bir bardak su ile bütün olarak yutulmalıdır.

"Tabletlerinizi hergün aynı saatte almanız kan basıncınız üzerinde en iyi etkiyi elde etmenizi sağlayacaktır ve tabletleri ne zaman alacağınızı hatırlamanıza yardımcı olacaktır"

Değişik yaş grupları

Sadece yetişkinlerin kullanımını içindir

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği

Prensip olarak, kreatinin klerensi 15mL/dak'dan yüksek olan böbrek yetmezliği olan hastalarda dozlar aynıdır.

Karaciğer yetmezliği

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

- Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.
- Tabletlerinizi her gün aynı saatte almanız kan basıncınız üzerinde en iyi etkiyi elde etmenizi sağlayacaktır. Aynı zamanda, tabletleri ne zaman alacağınızı hatırlamanıza yardımcı olacaktır.
- Doktorunuz HYPERIUM ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz çünkü hipertansiyon uzun süreli tedavi gerektiren bir hastalıktır.
- *Eğer HYPERIUM'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.*

Eğer kullanmanız gerekenden daha fazla HYPERIUM kullandıysanız

HYPERIUM'dan almanız gerekenden fazlasını almışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Bugüne dek hiçbir doz aşımı vakası bildirilmemiş olmakla beraber teorik olarak aşırı doz alımlarında görülecek belirtiler, hipotansiyon (düşük kan basıncı) ve dikkat bozuklukları olacaktır. Bu durumda derhal mide yıkanmalı ve takiben semptomimetik ilaçlar uygulanmalıdır.

Eğer HYPERIUM'ı almayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. Bir sonraki dozunuzu normal zamanında almaya devam ediniz.

HYPERIUM ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

İlacın kesilmesine bağlı kan basıncında yükselme olabilir. İlacı birden bire kesmeyiniz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, HYPERIUM'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın : 10 hastanın en az 1 inde görülebilir.

Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek : 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Yaygın:

Çarpıntı

Uyku hali

Pruritis (kaşıntı)

Cilt sorunları (dökülme, kaşınma)

Cinsel fonksiyonda bozulma

Mide ağrısı

Ağız kuruluğu

İshal

Kabızlık

Kaslarda kramp

Yorgunluk

Ellerde ve ayaklarda soğukluk hissi

Ödem

Anksiyete

Depresyon

Uykusuzluk

Yaygın olmayan:

Ayağa kalkıldığında tansiyon düşmesi

sıcak basması

bulantı

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz .

5. HYPERIUM 1 mg'in saklanması

HYPERIUM 1 mg'ı çocukların görebileceği veya ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.

Ambalajında, kuru yerde 30C°'ın altında, oda sıcaklığında saklayınız.

Ruhsat Sahibi: LES LABORATOIRES SERVIER – FRANSA lisansı ile
Servier İlaç ve Araştırma A.Ş.
Beybi Giz Kule, Meydan Sok. No.1, Kat: 22-23-24
34398 Maslak İstanbul
Tel: 0212 329 14 00, Faks: 0212 290 20 30

Üretici: Les Laboratoires SERVIER Industrie
45520 Gidy, FRANSA

Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır: