

KULLANMA TALİMATI

PEPSOR 500 mg+267 mg +160 mg/10 ml oral süspansiyon

Ağızdan alınır.

- **Etkin maddeler:** Her 5 mL süspansiyonda 250 mg sodyum aljinat, 133,5 mg sodyum bikarbonat ve 80 mg kalsiyum karbonat bulunur.
- **Yardımcı maddeler:** Sodyum metil paraben (E219), sodyum propil paraben (E217), karbomer, sodyum hidroksit, sodyum sakkarin, nane aroması ve deiyonize su içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

1. **PEPSOR nedir ve ne için kullanılır?**
2. **PEPSOR'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **PEPSOR nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **PEPSOR'un saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. PEPSOR nedir ve ne için kullanılır?

PEPSOR opak, krem-beyaz renkli, nane kokulu ve nane tadında yoğun kıvamlı bir sıvıdır.

PEPSOR; karton kutu içerisinde amber renkli 200 mL'lik şişede temin edilir.

PEPSOR, reflü özofajit (yemek borusu iltihabı) kaynaklı şikayetleri olan hastalarda, gebelikte ya da yemeklerden sonra oluşan (reflüden kaynaklanan) hazımsızlık, mide yanması ve mideden ağza asit gelmesi gibi gastroözofageal reflü (mide ve yemek borusu iltihabı) belirtilerinin tedavisinde kullanılır.

2. PEPSOR'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

PEPSOR'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

- PEPSOR içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı alerjiniz varsa (Nefes almada güçlük veya deri döküntüleri meydana gelmişse).

PEPSOR'u ařađıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Ařađıda belirtilen durumlardan herhangi biri sizin iin sz konusuysa, tedaviniz doktorunuz tarafından dikkatli bir řekilde dzenlenmelidir:

- Doktorunuz tarafından sodyum ve/veya kalsiyum kısıtlaması nerilmiřse,
- Bbrek ya da kalp rahatsızlıđınız varsa ya da gemiřte olduysa (bazı tuzlar bu tr durumları etkileyebilir),
- Midenizdeki asit seviyesi ok dřkse (bu durumda ilacın etkisi azalabilir),
- řiddetli bbrek yetmezliđiniz varsa,
- Yedi gn sonra belirtilerde dzelme olmazsa.

Bu uyarılar, gemiřteki herhangi bir dnemde dahi olsa sizin iin geerliyse ltfen doktorunuza danıřınız.

PEPSOR'un yiyecek ve iecek ile kullanılması

PEPSOR, yemeklerden sonra ađızdan alınır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

PEPSOR, gebelik dneminde kullanılabilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduđunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

PEPSOR, emzirme dneminde kullanılabilir.

Ara ve makine kullanımı

PEPSOR'un ara ve makine kullanımına olumsuz bir etkisi yoktur.

PEPSOR'un ieriđinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında nemli bilgiler

Bu tıbbi rn sodyum metil paraben (E219) ve sodyum propil paraben (E217) ierdiđinden, (muhtemelen gecikmiř) alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

Diđer ilalar ile birlikte kullanımı

Bazı ilalar ile birlikte kullanıldıđında PEPSOR'un ya da kullanılan diđer ilacın etkisi deđiřebilir. Ařađıdaki ilalarla birlikte PEPSOR kullanımını arasında 2 saat ara verilmelidir:

- Tetrasiklinler, norfloksasin gibi kinolon grubu antibiyotikler (enfeksiyon tedavisi iin)
- Demir ieren ilalar
- Ketokonazol (mantar iin)
- Atenolol, metoprolol, propanolol gibi beta-blokrler ve digoksin (kalp hastalıkları iin)

- Nöroleptikler (sinir hastalıkları için)
- Glukokortikoid (bir çeşit hormon ilacı)
- Klorokin (sıtma için)
- Bifosfonatlar (kemik erimesi için)
- Estramustin (prostat bezi kanseri için)
- Antihistamikler (Alerji ve kaşıntıyı önleyici ilaçlar)

Levotiroksin içeren ilaçların (tiroid hastalıklarının tedavisinde kullanılan) PEPSOR ile birlikte alındığında emilimi bozulduğundan, iki ilacın en az 2 saat ara verilerek alınması gerekmektedir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. PEPSOR nasıl kullanılır?

Doktorunuz alacağınız doz miktarını ve PEPSOR ile yapılacak tedavi süresini belirleyecektir. Tedaviyi kendi kendinize kesmeyiniz ve uzatmayınız.

Doktorunuz başka şekilde önermemişse, PEPSOR'u aşağıdaki gibi kullanınız.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

PEPSOR, ağızdan alınarak kullanılır. Kullanmadan önce iyice çalkalayınız.

PEPSOR, yetişkinler ve 12 yaşından büyük çocuklarda günde en fazla dört defa olmak üzere yemeklerden sonra ve yatarken 10-20 mL (2-4 tatlı kaşığı) kullanılır.

Uygulama yolu ve metodu:

PEPSOR, ağızdan alınarak kullanılır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

6-12 yaş arası çocuklarda yemeklerden sonra ve yatarken 5-10 mL (1-2 tatlı kaşığı).

12 yaşın altındaki çocuklarda, sadece doktor tavsiyesi üzerine verilmelidir.

6 yaş altındaki çocuklarda kullanımı önerilmez.

Yaşlılarda kullanımı:

Doz ayarlaması gerekmez.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Kalsiyum ve sodyum içerdiğinden dolayı, böbrek bozukluğu olan hastalarda dikkatli olunmalıdır.

Karaciğer yetmezliği:

Özel kullanımı yoktur.

Eğer PEPSOR'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuza veya eczacınıza ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla PEPSOR kullandıysanız:

PEPSOR'u kullanmanız gerekenden daha fazla kullandıysanız, herhangi bir zarar oluşması beklenmez; ancak karnınızda şişkinlik hissedebilirsiniz.

PEPSOR'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

PEPSOR'u kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

PEPSOR ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Doktorunuza danışmadan tedavinizi yarım bıraktığınız takdirde, hastalığınızın belirtileri tekrar ortaya çıkabilir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, PEPSOR'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, PEPSOR'u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Deri döküntüleri
- Nefes almada güçlük
- Baş dönmesi
- Yüz, dudaklar, dil veya boğazda şişme

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin PEPSOR'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuza veya eczacınıza bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. PEPSOR'un saklanması

PEPSOR'u çocukların göremeyeceđi, erişemeyeceđi yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Buzdolabına koymayınız veya dondurmayınız.

Kullanmadan önce iyice çalkalayınız.

Açıldıktan sonra 25°C altındaki oda sıcaklığında saklanmak koşulu ile 6 ay içinde kullanılmalıdır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Şişe açıldıktan sonra 6 ay içinde kullanılmalıdır.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra PEPSOR'u kullanmayınız.

Eđer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz PEPSOR'u kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat Sahibi : Neutec İlaç San. Tic. A.Ş.
Esenler/İSTANBUL
Tel : 0850 201 23 23
Faks : 0212 481 61 11
E-mail : bilgi@neutec.com.tr

Üretim Yeri : Neutec İlaç San. Tic. A.Ş.
Arifiye / SAKARYA

Bu kullanma talimatı 28.09.2023 tarihinde onaylanmıştır.