

## KULLANMA TALİMATI

### NAZETİN 0.14 mg/püskürtme burun spreyi, çözelti

Burun içine püskürtülerek uygulanır.

- **Etkin madde:** Her bir sprey püskürtmesi (0,14 ml) 0,14 mg azelastin hidroklorür içerir.
- **Yardımcı maddeler:** Disodyum EDTA, hidroksi propil metilselüloz, disodyum monohidrojen fostat dodekahidrat, sitrik asit monohidrat, sodyum klorür, sukraloz ve saf su.

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

### **Bu Kullanma Talimatında:**

1. **NAZETİN nedir ve ne için kullanılır?**
2. **NAZETİN' i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **NAZETİN nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **NAZETİN' in saklanması**

### **Başlıkları yer almaktadır.**

#### **1. NAZETİN nedir ve ne için kullanılır?**

- NAZETİN, 10 ml ve 20 ml berrak çözelti içeren cam şişelerde sunulan anti-alerjik bir burun spreyidir.
- NAZETİN, etkin madde olarak her bir püskürtmede 0,14 mg azelastin hidroklorür içermektedir.
- Azelastin, alerji belirtilerini gidermede kullanılan anti-alerjik bir ilaçtır.
- NAZETİN, yetişkinler, ergenler ile 6 yaş ve üstü çocuklardaki mevsimsel ve mevsimsel olmayan (yıl boyu) alerjik rinit (burun kaşıntısı, hapşırma, burun tıkanıklığı, burun akıntısı) belirtilerinin tedavisinde kullanılır.

#### **2. NAZETİN' i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**

Herhangi bir ilacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

## **NAZETİN' i ařađıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ**

- Azelastin hidroklorür veya NAZETİN'in iđerdiđi yardımcı maddelerden herhangi birine karřı aşırı duyarlılıđınız (alerji) varsa
- 6 yařın altındaki çocuklarda

## **NAZETİN' in yiyecek ve iecek ile kullanılması**

Bugüne kadar yiyecek ve ieceklerle herhangi bir etkileřim bildirilmemiřtir. Ancak, genel bir kural olarak ila kullanan kiřilerin alkollü ieceklerin tüketiminden kaınması gerekir.

## **Hamilelik**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

Eđer hamileyseniz, hamile olabileceđinizi düřünüyorsanız veya çocuk sahibi olmayı planlıyorsanız, bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Laboratuvar hayvanlarında, tedavi için kullanılan dozların çok üstündeki dozlarda bile anne karnındaki cenin üzerine herhangi bir zararlı (toksik) etki göstermemesine rađmen, günümüzdeki tıbbi yaklařım, hamileliđin ilk üç ayında NAZETİN'in kullanılmaması yönündedir.

Hamilelik döneminde NAZETİN' in kullanımına doktorunuz karar verecektir.

*Tedaviniz sırasında hamile olduđunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

## **Emzirme**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

Emzirme dönemi sırasında bu ilacın güvenliliđine ait yeterli klinik deneyim olmadıđından, NAZETİN'i emzirme döneminde kullanmayınız.

## **Ara ve makine kullanımı**

NAZETİN kullanılırken, hastalıđın kendisinin de neden olabileceđi tek tük vakalar halinde halsizlik, yorgunluk, bitkinlik, bař dönmesi veya güçsüzlük hissi görülebilir. Benzer řikayetleriniz oluyor ise ara ve makine kullanma yeteneđiniz etkilenebilir. Bu etkiler, alkol ve uyarılara tepki verme zamanı üzerine olumsuz etkisi olan diđer ilalar ile birlikte kullanım durumunda artabileceđi için, özel dikkat göstermelisiniz. Ara veya makine kullanırken dikkatli olunuz.

## **NAZETİN' in ieriđinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler**

NAZETİN'in ierdiđi yardımcı maddelere karřı herhangi bir etki oluřması beklenmemektedir.

### **Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı**

Diğer ilaçlarla herhangi bir etkileşim bildirilmemiştir.

*Eğer reçeteli veya reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

### **3. NAZETİN nasıl kullanılır?**

- **Uygun kullanım ve doz/ uygulama sıklığı için talimatlar:**

NAZETİN daima doktorunuzun veya eczacınızın önerdiği biçimde kullanılmalıdır.

Kullanım konusunda emin olmadığınız durumlarda doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doktor tarafından farklı bir biçimde önerilmedikçe, tavsiye edilen kullanım:


NAZETİN'i her bir burun deliğinize günde 2 defa 1 kez püskürtünüz (sabah ve akşam; günlük toplam doz 0,56 mg azelastin hidroklorüre eşdeğer).

- **Uygulama yolu ve metodu:**


NAZETİN' i başınız dik pozisyonda iken uygulayınız (Aşağıdaki şekil ve talimatları takip ediniz).



Şekil 1: Koruyucu kapağını çıkarınız.



Şekil 2: Sadece ilk kez kullanılırken, püskürtme görünene kadar birkaç kez püskürtünüz.



Şekil 3: Başımız dik durumdayken her bir burun deliğinize bir kez püskürtünüz. Koruyucu kapağını tekrar yerine yerleştiriniz.

### **Tedavi süresi:**

NAZETİN ile tedavi süresi şikayetlerin tipine, şiddetine ve gelişimine bağlıdır.

NAZETİN uzun dönem tedavide kullanılabilir.

- **Değişik yaş grupları**

#### **Çocuklarda kullanımı:**

NAZETİN' i 6 yaşından küçük çocuklarda kullanmayınız.

**Yaşlılarda (65 yaş ve üzeri) kullanımı:**

Yaşlılarda kullanımı için özel bir önlem yoktur. Normal dozlarda kullanabilirsiniz.

**• Özel kullanım durumları:**

Özel kullanımı yoktur.

*Eğer NAZETİN'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.*

**Kullanmanız gerekenden daha fazla NAZETİN kullandıysanız:**

*NAZETİN'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

NAZETİN, burun içerisine lokal olarak kullanılır. Lokal olarak aşırı doz durumunda bile, aktif madde içeriği çok düşük olduğundan dolayı herhangi bir zehirlenme belirtisi beklenmez. Ancak, amaçlanan kullanımının dışında daha yüksek miktarlarda kullanılması (örneğin, şişe içerisindeki çözeltinin tamamının bir çocuk tarafından yutulması) durumunda tıbbi yardım sağlanmalıdır. Söz konusu doz aşımı çok yeni gerçekleşmiş ise mide yıkanması önerilir.

İnsanlarda azelastin hidroklorürün zehirli (toksik) dozlarının uygulamasına ait deneyim bulunmamaktadır. Son derece yüksek aşırı dozda veya zehirlenmede merkezi sinir sistemi belirtileri (sersemlik, bilinç bulanıklığı, bilinç kaybı, kalbin normalden hızlı atımı, kan basıncı (tansiyon) düşüklüğü), hayvan deneylerinin sonuçlarına dayalı olarak beklenebilir. Dolayısıyla bu bozuklukların tedavisi belirtilere yönelik olmalıdır.

**NAZETİN' i kullanmayı unutursanız:**

Eğer NAZETİN' i uygulamayı unutursanız, özel bir önlem almanıza gerek yoktur. Sonraki dozu her zamanki saatte alınız. Gerekteğinde iki uygulama zamanı arasında da NAZETİN'i kullanabilirsiniz.

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.*

**NAZETİN ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:**

NAZETİN ile tedaviye belirtileriniz geçinceye kadar düzenli olarak devam ediniz.

NAZETİN'i kullanmayı bırakırsanız, rahatsızlığınızın tipik belirtileri kısa sürede yeniden ortaya çıkabilir.

Bu ürünün kullanımıyla ilgili herhangi bir sorunuz olursa, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

**4. Olası yan etkiler nelerdir?**

Tüm ilaçlar gibi, NAZETİN'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkileri olabilir.

Yan etkiler görülme sıklıklarına göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır:

Çok yaygın: 10 hastanın en az 1'inde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın 1'inden az, fakat 100 hastanın 1'inde veya 1'inden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın 1'inden az, fakat 1.000 hastanın 1'inde veya 1'inden fazla görülebilir.

Seyrek: 1.000 hastanın 1'inden az, fakat 10.000 hastanın 1'inde veya 1'inden fazla görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın 1'inden az görülebilir.

Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

**Aşağıdakilerden biri olursa, NAZETİN'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:**

- Aşırı duyarlılık reaksiyonları

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin NAZETİN'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

**Diğer yan etkiler:**

**Yaygın:**

- Uygun olmayan uygulama (baş arkaya yatırılarak uygulama, bkz. 3. NAZETİN nasıl kullanılır?) nadiren bulantıya sebep olabilen acı tat oluşturabilir.

**Yaygın olmayan:**

- Sprey uygulandığında iltihaplı burun mukozasında tahriş (yanma, karıncalanma), hapşırma ve burun kanaması.

**Seyrek:**

- Bulantı

**Çok seyrek:**

- Döküntü
- Kaşıntı
- Kurdeşen (ürtiker)
- Hastalığın kendisinden de kaynaklanabilecek olan halsizlik (yorgunluk, bitkinlik), baş dönmesi veya güçsüzlük hissi

Bahsedilen yan etkiler, genelde geçicidir. Dolayısıyla özel bir önlem alınmasına gerek olmayacaktır.

NAZETİN'in kullanımından sonra ağzınızda acı tat hissederseniz, bu acı tadı gidermek için alkol içermeyen meyve suyu veya süt gibi bir içecek içerek giderebilirsiniz.

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

### Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri [www.titck.gov.tr](http://www.titck.gov.tr) sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

### **5. NAZETİN’in Saklanması**

*NAZETİN’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.*

25 °C altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Buzdolabında (+8 °C’nin altında) saklamayınız.

Yanlışlıkla buzdolabı gibi +8 °C’nin altındaki bir sıcaklıkta uzun süre bırakılırsa, NAZETİN’in etkin maddesi bir ölçüde kristalleşmeye başlar. Şişeyi ışığa tuttuğunuzda bu kristaller görünür hale gelecektir. Böyle bir çözeltiyi kullanmayınız.

Ancak çözeltiyi birkaç saat oda ısısında bırakırsanız, kristaller tamamen kaybolacaktır, bu berrak çözeltiyi (daha fazla kristalleşme görünmemeli) yeniden kullanabilirsiniz.

### **Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.**

*Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra NAZETİN’i kullanmayınız.*

*Açıldıktan sonra kullanım süresi:*

Şişenin ilk açılımdan sonra NAZETİN’i, 6 aydan daha uzun süre ile kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

### ***Ruhsat Sahibi:***

Berko İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.

Yenişehir Mah. Özgür Sok. No: 16-18 Ataşehir/İstanbul

0 216 456 65 70 (Pbx)

0 216 456 65 79 (Faks)

[info@berko.com.tr](mailto:info@berko.com.tr)

### ***Üretim Yeri:***

Berko İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.

Adil Mah. Yörükler Sok. No: 2 Sultanbeyli/ İstanbul

0 216 592 33 00 (Pbx)

0 216 592 00 62 (Faks)

*Bu kullanma talimatı .././.... tarihinde onaylanmıştır.*