

## KULLANMA TALİMATI

### DİCLORAL® Gargara 200 mL

#### Ağız çalkalamak için

- **Etkin madde:** Her 1 mL 0,74 mg diklofenak (serbest asit şeklinde) içerir.
- **Yardımcı maddeler:** Kolin çözeltisi, sorbitol, sodyum benzoat, disodyum edetat, potasyum asesülfam, nane yağı, şeftali aroması, ponceau kırmızısı (E124), sodyum hidroksit, saf su.

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

#### **Bu Kullanma Talimatında:**

1. **DİCLORAL® nedir ve ne için kullanılır?**
2. **DİCLORAL® kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **DİCLORAL® nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **DİCLORAL®'ın saklanması**

**Başlıkları yer almaktadır.**

#### **1. DİCLORAL® nedir ve ne için kullanılır?**

DİCLORAL® 15 mL'lik ölçekle birlikte 200 mL şişelerde sunulan bir ağız gargarasıdır.

DİCLORAL® etkin madde olarak diklofenak içerir. Diklofenak ağrı kesici, inflamasyon giderici ve ateş düşürücü bir ilaç grubu olan nonsteroid antienflamatuvar ilaçlarından biridir.

DİCLORAL® ağız boşluğunuz ve boğazınızda ağrılı, iltihaplı olaylarda (örn. diş eti iltihabı, ağız içinde ya da yutağınızda enfeksiyon), diş çekimi ya da diş girişimleri sonrası gelişen ağrılı durumlarda ağrı ve iltihabın azaltılmasına yardımcı olur.

#### **2. DİCLORAL® kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**

##### **DİCLORAL®'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ**

Diklofenak ya da DİCLORAL®'in yardımcı maddelerden herhangi birine ya da aspirin ve diğer nonsteroid antienflamatuvar ilaçlara karşı aşırı duyarlılığınız varsa.

## **DİCLORAL®'i ařađıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ**

- Özellikle uzun süreli tedavide, ürüne karşı duyarlılık geliřtirirseniz tedaviyi kesip başka uygun tedavi başlanabilir.
- Gargara yaparken yutmamaya dikkat ediniz.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danıřınız.

## **DİCLORAL®'ın yiyecek ve iecek ile kullanılması**

Yiyecek ve ieceklerle birlikte kullanılmasının önemi yoktur.

## **Hamilelik**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

Hamilelik döneminde doktor kontrolünde ve gerekten gerekli olduđunda kullanınız.

*Tedaviniz sırasında hamile olduđunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

## **Emzirme**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

Emzirirken doktor kontrolünde ve gerekten gerekli olduđunda kullanınız.

## **Ara ve makine kullanımı**

Ara ve makine kullanımı üzerine herhangi bir etkisi yoktur.

## **Diđer ilalar ile birlikte kullanımı**

Yutulmadıđından bilinen bir ila etkileřimi yoktur.

*Eđer reeteli ya da reetesiz herhangi bir ilacı řu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

## **3. DİCLORAL® nasıl kullanılır?**

### **Pozoloji/uygulama sıklıđı ve süresi:**

Günde 2-3 kez 1 ölek (15 mL) gargara çözeltili ile ađzınızı alkalamanız önerilir.

### **Uygulama řekli:**

Az miktarda su ile seyrelterek ya da seyreltmeden gargara yapınız.

Yutmayınız.

*Eđer DİCLORAL®'ın etkisinin ok güçlü veya zayıf olduđuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuřunuz.*

### **Kullanmanız gerekenden daha fazla DİCLORAL® kullandıysanız:**

Sadece alkalama ya da gargara için kullanılan bu çözeltiliyi kaza ile yutmanız halinde alınan miktar ok düşük olacađından sizin için risk oluřturmaz.

*DİCLORAL®'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

**DİCLORAL®'ı kullanmayı unutursanız**

Hatırladığınız anda kullanınız.

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.*

**DİCLORAL® ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler**

Herhangi bir etki beklenmemektedir.

**4. Olası yan etkiler nelerdir?**

Tüm ilaçlar gibi DİCLORAL®'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

Çok yaygın:	10 hastanın en az birinde görülebilir.
Yaygın:	10 hastanın en fazla birinde, 100 hastanın en az birinde görülebilir.
Yaygın olmayan:	100 hastanın en fazla birinde, 1000 hastanın en az birinde görülebilir.
Seyrek:	1000 hastanın en fazla birinde görülebilir.
Çok seyrek:	10000 hastanın en fazla birinde görülebilir.
Bilinmiyor:	Eldeki verilerle tahmin edilemiyor.

**Bilinmiyor:**

- Ağız içinin tahriş olması
- Öksürük

*Eğer bu kullanma talimatında söz edilmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

**5. DİCLORAL®'ın Saklanması**

25C°'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

*DİCLORAL®'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.*

**Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.**

*Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra DİCLORAL®'ı kullanmayınız.*

**Ruhsat sahibi:**

Pfizer İlaçları Ltd. Şti.

Muallim Naci Cad. 34347 Ortaköy-İstanbul

**Üretim Yeri:**

Farmaca Srl lisansı ile Montefarmaco Spa.

Via Galilei 7, Pero (Mi), İtalya

*Bu kullanma talimatı .././... tarihinde onaylanmıştır.*