

KULLANMA TALİMATI

TÜM EKİP POTASYUM KLORÜR % 7.5 IV Enjeksiyonluk/İnfüzyonluk Çözelti

Steril

Damar içine uygulanır.

- **Etkin madde:** 10 ml'lik ampul'de 0,75 g Potasyum Klorür içerir.
- **Yardımcı maddeler:** Sodyum hidroksit ve hidroklorik asit (pH ayarı için), enjeksiyonluk su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük doz kullanmayınız.***

Bu Kullanma Talimatında:

- 1. TÜM EKİP POTASYUM KLORÜR nedir ve ne için kullanılır?**
- 2. TÜM EKİP POTASYUM KLORÜR'ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
- 3. TÜM EKİP POTASYUM KLORÜR nasıl kullanılır?**
- 4. Olası yan etkiler nelerdir?**
- 5. TÜM EKİP POTASYUM KLORÜR'ün saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. TM EKİP POTASYUM KLORR nedir ve ne iin kullanılır?

TM EKİP POTASYUM KLORR, 1 ampul'de 0.75g potasyum iermektedir.

TM EKİP POTASYUM KLORR'un etkin maddesi olan potasyum klorr, belirli nedenler sonucu meydana gelen vcuttaki potasyum kayıplarını yerine koymak amacıyla kullanılmaktadır.

Potasyum kaybına neden olan durumlar ise;

- İshal, kusma ve mide-bağırsak sistemindeki fistllerde,
- Birincil ve ikincil hiperaldosteronizmde (aşırı aldosteron salgılanması),
- Mineralokortikoid (Aldosteron) ve glukokortikoid (ACTH, Kortizon v.b.) tedavilerinde,
- Parenteral sıvı tedavisinde (Potasyum ihtiva etmeyen),
- Diyabetik ketoasidoziste (Belirtileri; bulantı, kusma, aşırı miktarda idrar yapma, uyuklama, bilin kaybı),
- Metabolik alkaloziste (vcut sıvılarında baz fazlası olması)
- Digitalis zehirlenmelerinde
- Tuz kaybına neden olan bbrek iltihabı,
- Tiyazid sınıfından diretiklerin (idrar sktrcler) uzun sreli kullanımında,
- Kronik protein yıkımında

2. TM EKİP POTASYUM KLORR' kullanmadan nce dikkat edilmesi gerekenler

TM EKİP POTASYUM KLORR' ařağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

- Eęer TM EKİP POTASYUM KLORR'n bileřenlerine karřı alerjiniz var ise kullanmayınız.
- TM EKİP POTASYUM KLORR', hiperkalemi (kanda potasyum seviyelerinin yksek olması) ile oligri (idrarın normalden az ıkması), anri (idrarın ıkarılmaması) ya da azotemi (kanda aşırı miktarda azot bulunması) ile řiddetli bbrek yetmezlięi sz konusu ise veya tedavi edilemeyen kronik adrenokortikal yetmezlik (Addison Hastalığı) durumlarında,
- Akut dehidratasyon (kısa srede geliřen su kaybı, hiperkloremi (kandaki klorr seviyesinin yksek olması) ve kramp durumlarında kullanmayınız.

TÜM EKİP POTASYUM KLORÜR'ü aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

- Eğer magnezyum eksikliğiniz (hipomagnezemi) varsa,
- Kardiyak rahatsızlığınız varsa, potasyum destekleyiciler ya da plazma potasyum seviyesini arttıran ilaçlarla birlikte kullanacaksanız,

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

TÜM EKİP POTASYUM KLORÜR'ün yiyecek ve içecek ile kullanılması

Uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Hamilelik

- *İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- Bu ilaç doktor tarafından gerekli görülmedikçe hamilelik döneminde kullanılmamalıdır. *Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

TÜM EKİP POTASYUM KLORÜR'ün anne sütüne geçip geçmediği belli değildir. Bu nedenle emzirme döneminde doktor kontrolünde kullanınız.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanma üzerine normal değerlerde kalındığı sürece bilinen bir etkisi bulunmamaktadır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

TÜM EKİP POTASYUM KLORÜR'ü aşağıdaki ilaçlarla birlikte alıyorsanız doktorunuza danışınız.

- ACE inhibitörleri (Yüksek kan basıncının tedavisinde kullanılmaktadır.)
- Amfoterisin, amikasin sülfat, dobutamin hidroklorür ve sabit yağ emülsiyonları
- Amilorid, spironolakton ve triamteren gibi potasyum tutucu diüretikler

- İnsülin, insülin+glukoz, sodyum bikarbonat infüzyonları
- Siklosporin (organ nakli sonrasında kullanılır.)

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. TÛM EKİP POTASYUM KLORÛR nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz hastalığınıza baęlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Genel olarak saatte 20 mEq/L'yi geçmemek kaydıyla günde 20-150 mEq verilebilir.

Maksimum doz 3,7 mEq/kg/24 saattir.

Uygulama yolu ve metodu:

TÛM EKİP POTASYUM KLORÛR, 1000 mL'lik dekstroz solüsyonuna katılır. İntravenöz infüzyon şeklinde verilir. Dozlar vakanın durumuna göre doktor tarafından ayarlanır.

Ağız yoluyla potasyum tedavisi yapmak için ampuller kırılıp, sıvı yiyecekler içine karıştırılarak verilebilir.

Deęişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Maksimum doz 2-3 mEq/kg/24 saattir.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlı hastalarla yapılmış bir çalışma bulunmamaktadır.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezlięi:

Böbrek yetmezlięi olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Karacięer yetmezlięi

Karacięer yetmezlięi olan hastalarla yapılmış çalışma bulunmamaktadır.

Eğer TÛM EKİP POTASYUM KLORÛR'ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduęuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla TM EKİP POTASYUM KLORR kullandıysanız:

TM EKİP POTASYUM KLORR'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

TM EKİP POTASYUM KLORR' kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

TM EKİP POTASYUM KLORR ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler
Bulunmamaktadır.

4. Olası Yan Etkiler Nelerdir?

Tm ilaçlar gibi, TM EKİP POTASYUM KLORR'n ieriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, TM EKİP POTASYUM KLORR' kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Hiperkalemi
- Fel
- Kol ve bacaklarda uyuşma
- Zihin karışıklığı
- Gri deri
- Ciltte soğukluk
- Kan basıncında düşme
- Kardiyak aritmi (ritim bozukluğu)
- Kalp bloęu (kalp ii iletiminin zayıflaması)

Bunların hepsi ok ciddi yan etkilerdir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Nefes darlığı
- Kusma
- İshal

- Kan ve lenf sıvısının içinde bulunduđu damardan dıřarı sızması ve lokal doku hasarı
- Karın ağrısı

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ařađıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

- Güçsüzlük
- Enjeksiyon yerinde ağrı
- Mide gazı

Bunlar **TÜM EKİP POTASYUM KLORÜR'ün** hafif yan etkileridir.

Eđer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemřireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılařtıđınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduđunuz ilacın güvenliliđi hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sađlamıř olacaksınız.

5. TÜM EKİP POTASYUM KLORÜR'ün saklanması

TÜM EKİP POTASYUM KLORÜR'ü çocukların göremeyeceđi, erişemeyeceđi yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklıklarında saklanmalıdır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra TÜM EKİP POTASYUM KLORÜR'ü kullanmayınız.

Eđer üründe ve/veya ambalajında bozukluk fark ederseniz TÜM EKİP POTASYUM KLORÜR'ü kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre , Şehircilik ve İklim Deđişikliği Bakanlıđınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat Sahibi: TM EKİP İLAÇ A.Ş.
İstanbul Tuzla Kimya Organize Sanayi Bölgesi
Aromatik Cad. No:55 34956 Tuzla / İSTANBUL
Tel. no: 0 216 593 24 25 (Pbx)
Faks no: 0 216 593 31 41

retim Yeri: İMARETÇİOĐLU İlaç Sanayii LTD. ŞTİ.
Samsun Serbest Bölge Şubesi
Limaniçi İlkadım/Samsun
Tel No: 0 362 445 01 11
Fax No: 0 362 445 18 11

Bu kullanma talimatı 11/10/2022 tarihinde onaylanmıştır.