

## KULLANMA TALİMATI

### CASFLEX 400 mg film kaplı tablet

Ağızdan alınır.

- **Etkin madde:** Her bir film kaplı tablet 400 mg feniramidol HCl içerir.
- **Yardımcı maddeler:** Mikrokrystalin selüloz, povidon, mısır nişastası, makrogol, prejelatinize nişasta, talk, magnezyum stearat, polivinil alkol, titanyum dioksit, kinolin sarısı, gün batımı sarısı (E 110), sarı demir oksit, indigo karmin

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

### **Bu Kullanma Talimatında:**

1. **CASFLEX nedir ve ne için kullanılır?**
2. **CASFLEX'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **CASFLEX nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **CASFLEX'in saklanması**

**Başlıkları yer almaktadır.**

#### **1. CASFLEX nedir ve ne için kullanılır?**

CASFLEX, kas gevşetici ve ağrı kesici olarak etki gösterir.

CASFLEX, karton kutuda, 24 tabletlik Al ve PVC/PVDC blister ambalajda, kullanma talimatı ile birlikte sunulmaktadır.

CASFLEX; kas-iskelet sistemi ile ilişkili, aniden başlayan ağrılı kas kasılmalarına bağlı belirtilerin azaltılması için kullanılır.

Kaslardaki gerginliği giderir, ağrıyı geçirir ve kramp halindeki iskelet kasının fonksiyonunu sağlar.

## 2. CASFLEX’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

### CASFLEX’i ařağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eęer;

- Feniramidole ya da ierdiği yardımcı maddelerden herhangi birine karřı duyarlılıęınız varsa (alerjik reaksiyon, deride isilik, kařıntı, yz, dudak, el ve ayaklarda řiřme veya nefes almada glk olarak ortaya ıkabilir)
- Karacięer bozukluęunuz var ise

### CASFLEX’i ařağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

CASFLEX zellikle yksek dozlarda yatıřtırıcı ve sakinleřtirici etkilere neden olabilir. Kan basıncınız dřkse CASFLEX’i dikkatli kullanınız.

Bu uyarılar gemiřteki herhangi bir dnemde dahi olsa sizin iin geerliyse ltfen doktorunuza danıřınız.

### CASFLEX’in yiyecek ve iecek ile kullanılması

Uygulama yntemi aısından yiyecek ve ieceklerle etkileřimi yoktur.

### Hamilelik

*İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

Hamileyseniz CASFLEX kullanmamanız nerilmektedir.

CASFLEX’i hamilelikte sadece doktorunuz kesin gereklilik olduęuna karar verirse kullanabilirsiniz.

*Tedaviniz sırasında hamile olduęunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

### Emzirme

*İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

CASFLEX etkin maddesinin ste geip gemedięi bilinmemektedir. Bu nedenle emziriyorsanız, CASFLEX kullanmamalısınız.

### Ara ve makine kullanımı

CASFLEX ile sersemlik hali ya da bař dnmesi grlebilmektedir. Bu nedenle ara ve makine kullanımında dikkatli olunuz.

### CASFLEX’in ierięinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında nemli bilgiler

CASFLEX ierięindeki gn batımı sarısı (E 110) alerjik reaksiyonlara sebebiyet verebilir.

### Dięer ilalar ile birlikte kullanımı

Sara tedavisinde kullanılan bazı ilalarla birlikte kullanıldıęında CASFLEX, bu ilaların kan dzeylerinin artmasına baęlı olarak gz titremesi, hareket kontrolnde zorluęa baęlı yrme bozukluęu ve mental deęiřikliklere neden olabileceęinden bu tip ilaların birlikte kullanımından kaınınız.

Kanın pıhtılaşmasını geciktiren veya önleyen (antikoagölan) ilaçlarla birlikte kullanıldığında kanama zamanının uzaması nedeniyle dikkatli olunuz.

Aynı zamanda feniramidol, şeker hastalığı tedavisinde kullanılan “tolbutamid” ile eş zamanlı kullanıldığında, tolbutamid kan düzeylerinin artışına bağlı olarak uzamış bir hipoglisemi (kan şekeri seviyesinde düşüklük) gözlenmesine neden olabilir. Bu nedenle CASFLEX, tolbutamid ile birlikte kullanıldığında dikkatli olunuz.

Karaciğere zararlı olduğu bilinen ilaçlarla birlikte kullanıyorsanız dikkatli olunuz.

*Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

### **3. CASFLEX nasıl kullanılır?**

CASFLEX ağızdan alınır.

#### **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:**

CASFLEX’i günde 3 kez 1-2 tablet şeklinde kullanınız.

Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde belirtilen dozlarda kullanınız.

#### **Uygulama yolu ve metodu:**

CASFLEX, sadece ağızdan kullanmak içindir. Tabletleri çiğnemeyiniz. Tabletleri yeterli miktarda su ile tok karnına alınız.

#### **Değişik yaş grupları:**

##### **Çocuklarda kullanım:**

Feniramidolün çocuklarda güvenilir bir şekilde kullanılması henüz ispatlanmamıştır. Bu nedenle CASFLEX’in çocuklarda kullanımı önerilmez.

##### **Yaşlılarda kullanım:**

Yaşlılarda dozun azaltılması gerekebilmektedir.

#### **Özel kullanım durumları**

##### **Böbrek/Karaciğer yetmezliği:**

Böbrek veya karaciğer rahatsızlığınız varsa, etkililik ve güvenilirlik bilinmediğinden kullanmayınız.

*Eğer CASFLEX’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.*

##### **Kullanmanız gerekenden daha fazla CASFLEX kullandıysanız:**

Kullanmanız gerekenden çok fazla CASFLEX kullanılması durumunda yüzde kızarma ve tansiyon düşmesi olabilir.

*CASFLEX’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

**CASFLEX’i kullanmayı unutursanız:**

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.*

**CASFLEX ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:**

Şikayetlerinizin düzelmesinden sonra tedaviyi kesmeniz sonucu herhangi olumsuz bir etki beklenmemektedir.

**4. Olası yan etkiler nelerdir?**

Tüm ilaçlar gibi CASFLEX’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

**Aşağıdakilerden biri olursa, CASFLEX’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:**

- Alerjik reaksiyonlar, tansiyon düşmesi, nefes almada zorluk, deride döküntü

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, CASFLEX’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

**Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:**

- Sersemlik hali,
- Bulantı,
- Kusma,
- Uyku bozukluğu,
- Uyuşukluk hali,
- Baş dönmesi,
- İsilik,
- Kaşıntı,
- Dilde yanma hissi

Bunlar CASFLEX’in hafif yan etkileridir.

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

**Yan etkilerin raporlanması**

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri [www.titck.gov.tr](http://www.titck.gov.tr) sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

## **5. CASFLEX'in saklanması**

*CASFLEX'i çocukların göremeyeceđi, erişemeyeceđi yerlerde ve ambalajında saklayınız. CASFLEX'i 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.*

**Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.**

*Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CASFLEX'i kullanmayınız.*

Eđer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz CASFLEX'i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre, Şehircilik ve İklim Deđişikliği Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

### ***Ruhsat sahibi:***

BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.  
Beyođlu-İSTANBUL

### ***Üretim yeri:***

BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.  
Gebze-KOCAELİ

*Bu kullanma talimatı 11.10.2022 tarihinde onaylanmıştır.*