

KULLANMA TALİMATI

NOTUSS 7.5 mg / 5 mL şurup

Ağız yoluyla alınır.

- **Etkin madde:** Her 5 ml şurup, 7,5 mg butamirat sitrat (1,5 mg/ml) içerir.
- **Yardımcı maddeler:** Sitrik asit monohidrat, sodyum sitrat dihidrat, sorbitol %70 non-kristalin, gliserin, propilen glikol, sodyum sakarin, sodyum siklamat, sodyum benzoat, çilek aroması, tutti frutti aroması, deiyonize su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin/çocuğunuz için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin/çocuğunuz için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size/çocuğunuza önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

1. **NOTUSS nedir ve ne için kullanılır?**
2. **NOTUSS'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **NOTUSS nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **NOTUSS'un saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. NOTUSS nedir ve ne için kullanılır?

- NOTUSS etkin madde olarak butamirat sitrat içeren, şurup formunda bir ilaçtır.
- NOTUSS, "öksürük baskılayıcı ilaçlar" olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir.
- NOTUSS, çocuk emniyetli HDPE kapaklı, amber renkli ölçü çizgili 100 ml'lik cam şişelerde 5 ml'lik dereceli ölçekle birlikte kullanıma sunulmaktadır.
- NOTUSS çeşitli nedenlerden kaynaklanan öksürüğün şikayetlere yönelik (semptomatik) tedavisinde kullanılır.

2. NOTUSS'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

NOTUSS'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer sizin/çocuğunuzun butamirat veya NOTUSS'un bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı (yardımcı maddeler listesine bakınız) alerjiniz/alerjisi varsa,

Eğer çocuğunuz 3 yaşın altında ise NOTUSS'u kullanmayınız.

NOTUSS'u ařađıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eđer siz/çocuđunuz aynı zamanda başka balgam söktürücü ilaçlar alıyorsanız, dikkatli olmalısınız. NOTUSS'un bu tür ilaçlarla aynı anda kullanılmaması önerilir.

6 yařın altında önerilmez.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin/çocuđunuz için geçerliyse lütfen doktorunuza danıřınız.

Öksürük kötüleşirse ya da 7 günden daha uzun süre devam ederse ve/veya ateř ya da inatçı baş ağrısı olursa doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

NOTUSS'un yiyecek ve içecek ile kullanılması

NOTUSS'un yiyecek ve içeceklerle etkileřimi yoktur.

NOTUSS'u aç ya da tok karnına kullanabilirsiniz.

Hamilelik

- *İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*
- Hamile iseniz, ilk üç ay NOTUSS kullanmamanız önerilmektedir. Daha sonraki dönemde, ancak doktorunuz kesin gereklilik olduđuna karar verirse NOTUSS kullanabilirsiniz.
- *Tedaviniz sırasında hamile olduđunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

Emzirme

- *İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*
- Bebeđinizi emziriyorsanız, NOTUSS almadan önce doktorunuza danıřınız.

Araç ve makine kullanımı

NOTUSS uykulu hissetmenize neden olabilir. Bu nedenle araç ve makine kullanırken veya dikkat gerektiren diđer işleri yaparken dikkatli olunuz.

NOTUSS'un içeriđinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

NOTUSS sorbitol içermektedir. Eđer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlıđınız olduđu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diđer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eđer balgam söktürücü özelliđi olan başka ilaçlar kullanıyorsanız doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz.

Eđer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı řu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. NOTUSS nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde kendiniz/çocuğunuz için belirtilen dozlarda kullanınız:

6 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı önerilmez.

6 – 12 yaşındaki çocuklarda: Günde 3 defa 2 kaşık (10 ml)

12 yaş üzeri ergenlerde (adolesanlarda): Günde 3 defa 3 kaşık (15 ml)

Yetişkinlerde: Günde 4 defa 3 kaşık (15 ml)

Doktorunuz farklı bir tavsiyede bulunmadıkça, NOTUSS'u 7 günden daha uzun süre kullanmayınız.

Uygulama yolu ve metodu:

NOTUSS ağız yoluyla kullanılır.

İlacınızın dozunu ayarlamak için dereceli kaşığı kullanınız. Dereceli kaşığı her kullanımda yıkayıp kurulumuz.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

NOTUSS 3 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır. NOTUSS'un 6 yaş altındaki çocuklarda kullanımı önerilmez.

Yaşlılarda kullanımı:

Butamirat sitrat'ın yaşlılarda kullanımı araştırılmamıştır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Butamirat sitrat'ın böbrek veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda araştırılmamıştır.

Eğer NOTUSS'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla NOTUSS kullandıysanız:

NOTUSS'tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

NOTUSS'u kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Aşırı dozda NOTUSS alınması halinde şu belirtiler görülebilir: Uyku hali, bulantı, kusma, ishal, sersemlik ve tansiyon düşmesi. Bu etkiler doz azaltılınca veya tedavi kesilince ortadan kalkabilir. Eğer ilaç kesildiğinde bu etkiler devam ediyorsa doktorunuz veya eczacınıza danışınız.

NOTUSS ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, NOTUSS şurubun içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler görülme sıklıklarına göre aşağıdaki şekilde sıralanmıştır.

- Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.
- Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
- Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.
- Seyrek: 1000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
- Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
- Bilinmiyor: Eldeki veriler ile tahmin edilemiyor.

Aşağıdakilerden biri olursa, NOTUSS'u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

Seyrek:

- Uyku hali
- Bulantı, ishal
- Ürtiker (kurdeşen)

Bunlar NOTUSS'un hafif yan etkileridir.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. NOTUSS'un saklanması

NOTUSS'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra NOTUSS'u kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz *NOTUSS'u kullanmayınız.*

Son kullanma tarihi gemiř veya kullanılmayan ilaları öpe atmayınız! evre ve řehircilik Bakanlıęınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi:

Tripharma İla San. ve Tic. A.ř.
Reřitpařa Mah. Eski Büyükdere Cad. No:4 34467
Maslak / Sarıyer/ İstanbul
Tel: 0212 366 84 00
Faks: 0212 276 20 20

Üretim Yeri:

Abdi İbrahim İla San. ve Tic. A.ř.
Orhan Gazi Mahallesi, Tun Cad. No: 3
Esenyurt / İstanbul
Tel: (0212) 622 66 00
Faks: (0212) 623 19 52

Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıřtır.