

KULLANMA TALİMATI

PAINLESS %10+%15 Jel

Cilt üzerine sürülerek kullanılır.

Etkin maddeler: Metil salisilat ve mentol.

Yardımcı maddeler: Hidroksipropil selüloz, polietilen glikol, gliserin ve etanol

Bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu ilaç sizin reçetesiz olarak temin edip, bir doktor yardımı almadan eczacınızın tavsiyesi ile hafif bir hastalığı tedavi etmeniz içindir. Buna karşın, yine de PAINLESS'in en iyi sonuçları alabilmeniz için dikkatli kullanmanız gerekmektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde, doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

1. *PAINLESS nedir ve ne için kullanılır?*
2. *PAINLESS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler*
3. *PAINLESS nasıl kullanılır?*
4. *Olası yan etkiler nelerdir?*
5. *PAINLESS'in saklanması*

Başlıkları yer almaktadır.

1. PAINLESS nedir ve ne için kullanılır?

PAINLESS, berrak, renksiz, karakteristik mentol ve metil salisilat kokulu Jel formunda olup 50g'lık aliminyum t p ambalaj ierisinde ve karton kutuda kullanma talimatı ile beraber kullanıma sunulmaktadır.

PAINLESS'deki etkin maddelerden biri olan metil salisilat, salisilik asit t revleri adı verilen bir ila grubuna aittir. Aėrı kesici (analjezik) ve enflamasyon (yangı) (antienflamatuvar) giderici  zelliklere sahiptir.

Diėer etkin madde olan mentol ise, nane esansından elde edilen doėal bir bileėiktir. Yerel olarak kullanıldıėında derideki damarları geniėletir ve serinlik hissi verir.

PAINLESS aŐaėıdaki hastalıkların lokal tedavisinde aėrı kesici ve enflamasyon (yangı) giderici olarak etkilidir:

- Kirelenme (osteoartrit), eklem enflamasyonu (romatoid artrit), eklem evresindeki dokularda enflamasyon (periartrit), eklem b lgesinde aėrılı ŐiŐlikler (bursit), tendon enflamasyonu (tendinit) ve tendon kılıfı enflamasyonu (tenosinovit) gibi romatizmal hastalıklar,
- Ezilme ve burkulma gibi yumuŐak doku travmaları,
- Aėrı, enflamasyon ve kas gerginliėi ile kendini g steren kas iskelet sistemi hastalıkları.

PAINLESS haricen kullanılan bir aėrı kesici ve enflamasyon (yangı) gidericidir. Aėrılı b lgelere uygulandıėında bu b lgelerdeki damarları geniėleterek serinlik hissi verir ve aėrıyı azaltır. Sinir ve kasların gevŐemesini saėlar.

2. PAINLESS kullanmadan  nce dikkat edilmesi gerekenler PAINLESS'i aŐaėıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

Eėer;

- Metil salisilat, mentol veya PAINLESS'in iindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karŐı alerjik (aŐırı duyarlı) iseniz,
- Cildinizde aık yara varsa veya deriniz tahriŐ olmuŐ ise, bu b lgeler  zerinde kullanmayınız.
- 12 yaŐından k  k ocuklarda kullanmayınız.

PAINLESS'i aŐaėıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

- PAINLESS sadece haricen uygulanmak iindir.
- Sıcak su torbası veya bandaj ile birlikte kullanmayınız.
- ocuklar ve ergenlik aėındaki genlerde viral grip veya suieėi semptomlarında nadir olarak g r lebilen fakat ciddi bir hastalık olan Reye Sendromlu hastalarda,
- G zlere ve aėız ii gibi ince bir tabaka (m k z membran) ile kaplı diėer b lgelere deėdirmemeye dikkat ediniz ve tahriŐ olmuŐ deriden uzak tutunuz.
- Ciltte  nemli tahriŐ oluŐtuėu takdirde tedaviyi kesiniz.
- Aėrı 10 g nden fazla devam eder veya iyileŐmezse hemen bir doktora baŐvurunuz.

Bu uyarılar, gemiŐteki herhangi bir d nemde dahi olsa, sizin iin geerliyse l tfen doktorunuza danıŐınız.

PAINLESS'in yiyecek ve iecek ile kullanılması:

Geerli deęil.

Hamilelik

İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

PAINLESS hamilelik sırasında yarar-risk deęerlendirilmesi yapıldıktan sonra kullanılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduęunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

PAINLESS, emzirme dneminde yarar-risk deęerlendirilmesi yapıldıktan sonra kullanılmalıdır.

Ara ve makine kullanımı

Topikal (haricen) uygulanan PAINLESS'in ara ve makine kullanma zerinde herhangi bir etkisi yoktur.

PAINLESS'in ierięinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında nemli bilgiler:

İerięindeki yardımcı maddelerden dolayı herhangi bir etkisinin olması beklenmez.

Dięer ilalar ile birlikte kullanımı

Asetilsalisilik asitle beraber kullanıldıęında salisilat zehirlenmesi grlebilir.

Varfarin gibi kan sulandırıcı ve kanın pıhtılařmasının saęlayıcı (antikoaglan) ila kullanan hastalarda, PAINLESS'in salisilat iermesinden dolayı olası bir kanama grlebilir.

Eęer reeteli ya da reetesiz herhangi bir ilacı řu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise, ltfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. PAINLESS nasıl kullanılır?

Eriřkinler:

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklıęı iin talimatlar:

PAINLESS aęrılı blgeye gnde 3-4 defa uygulanmalıdır. Ařırı kullanımdan kaınınız.

Uygulama yolu ve metodu:

PAINLESS haricen kullanım iindir. İnce bir tabaka halinde aęrılı blgeyi kapatacak řekilde yeteri kadar srlr ve tamamen emilene kadar yavařca ovuřturulur.

Her uygulamada, bir nceki uygulama alanını iyice temizleyiniz.

Deęiřik yař grupları:

ocuklarda kullanım:

12 yařından kk ocuklarda kullanılmamalıdır.

Yařlılarda kullanım:

zel bir kullanımı yoktur.

zel kullanım durumları:

Bbrek/Karacięer yetmezlięi:

Bbrek/karacięer yetmezlięinde zel bir kullanım durumu yoktur.

Eğer PAINLESS'in etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla PAINLESS kullandıysanız:

PAINLESS'in aşırı kullanımı salisilat toksisitesine sebep olabilir. Yutulması durumunda doktora danışınız.

PAINLESS'ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

PAINLESS kullanmayı unutursanız:

Eğer ilacınızı kullanmayı unutursanız, aklınıza geldiğinde bir sonraki uygulama zamanına uzun süre var ise, uygulayınız. Eğer bir sonraki dozun zamanı yaklaşmış ise uygulamayınız ve olağan zamanlarında uygulamaya devam ediniz. Unuttuğunuz uygulamayı telafi etmek için, her zaman olduğundan daha fazla miktarda Jel kullanmayınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.

Bu ilacın kullanımıyla ilgili başka sorularınız olursa, doktorunuza sorunuz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, PAINLESS'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Ancak bunlar herkeste ortaya çıkmaz.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

El, ayak, bilek, yüz ve dudakların şişmesi ya da ağız ve boğazın yutmayı ve nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi (anjioödem)

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Uygulama bölgesi reaksiyonları (içi su toplamış kabarcık, yanma, kızarıklık, tahriş, ağrı, uyuşma, kaşıntı ve döküntü dahil)

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

Çok yaygın	: 10 hastanın en az birinde görülebilir.
Yaygın	: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan	: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek	: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.
Çok seyrek	: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor	: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Çok seyrek: Anjioödem, nefes darlığı (aşırı hassasiyete bağlı), uygulama bölgesi reaksiyonları (içi su toplamış kabarcık, yanma, kızarıklık, tahriş, ağrı, uyuşma, kaşıntı ve döküntü dahil), baş dönmesi, sersemlik, uyku hali, solunumda yavaşlama (bradipne) ve koma gibi santral sinir sistemi depresyonu semptomları, bulantı, kusma, karın ağrısı.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. PAINLESS’in saklanması

PAINLESS’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra PAINLESS’i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi : SGA Sağlık Hiz. Dan. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Kadıköy / İstanbul

Üretim yeri : Pharma Plant İlaç San ve Tic. A.Ş.
Kadıköy / İstanbul

Bu kullanma talimatı 26.10.2021 tarihinde onaylanmıştır.