

## KULLANMA TALİMATI

### MUKOTİK Fort 375 mg Film Tablet

Ağızdan alınır.

- **Etkin madde:** Her bir film tablette 375 mg karbosistein.
- **Yardımcı maddeler:** Nişasta, laktoz, jelatin, sodyum lauril sülfat, magnezyum stearat, talk, koloidal silikon dioksit.

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.*

#### **Bu Kullanma Talimatında:**

1. **MUKOTİK FORT nedir ve ne için kullanılır?**
2. **MUKOTİK FORT'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **MUKOTİK FORT nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **MUKOTİK FORT'un saklanması**

**Başlıkları yer almaktadır.**

#### **1. MUKOTİK FORT nedir ve ne için kullanılır?**

MUKOTİK FORT, her bir film tablette 375 mg karbosistein içeren mukolitik etkili bir ilaçtır. 20 ve 50 film tablet içeren PVC/Alu blister ambalajlarda piyasaya sunulmuştur.

MUKOTİK FORT, patolojik derecelerde yoğun kıvamlı balgamın oluşması ile birlikte seyreden solunum yolları hastalıklarında kullanılır. Orta kulak iltihabı da buna dahildir.

#### **2. MUKOTİK FORT'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**

**MUKOTİK FORT'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ**

Eğer,

- Karbosistene ve /veya film tabletin içerdği diğer maddelere karşı alerjiniz varsa
- Mide veya duodenum ülseriniz varsa

### **MUKOTİK FORT'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ**

Eğer,

- Emziriyorsanız
- Geçmişinizde ülser hikayesi varsa

Astımı olan hastaların tedavileri esnasında bronkospazm oluşabileceğinden dikkatli kullanılmalıdır. Belirtiler görülürse kullanılmamalıdır .

### **MUKOTİK FORT'un yiyecek ve içecek ile kullanılması**

MUKOTİK FORT yiyecek ve içecek ile birlikte kullanılabilir.

### **Hamilelik**

- *İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- Hamileliğin ilk üç ayında kullanılmamalıdır.
- *Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.*

### **Emzirme**

- *İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

### **Araç ve makine kullanımı**

Araç ve makine kullanımına etkisi ile ilgili bilgi bulunmamaktadır.

### **MUKOTİK FORT'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler**

MUKOTİK FORT, laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Bu tıbbi ürün her dozunda 0.01 mmol (0.265 mg) sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

### **Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı**

Folkodin (opiat türevi öksürtük kesici ilaç) ile geçimsizdir. Folkodin ile karışımı karbosisteinin çökmesine neden olur. Opiat türevi bu tip bileşiklerle aynı anda kullanılmaması tavsiye edilir.

*Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

### 3. MUKOTİK FORT nasıl kullanılır?

#### **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:**

Başlangıç dozu günde 3 kez 2 fort tablet (toplam 2250 mg ).

İdame dozu ise, bölünmüş dozlar halinde günde toplam 1500 mg'dır. Yeterli cevap elde edildikten sonra doz günde 2 kez 1 fort tablete kadar (toplam 750 mg) düşürülebilir .

#### **Uygulama yolu ve metodu:**

Ağızdan alınır.

#### **Değişik yaş grupları:**

##### **Çocuklarda kullanım:**

Çocuklarda kullanılmaz.

##### **Yaşlılarda kullanım:**

Yukarıda belirtilen dozlar kullanılır.

#### **Özel kullanım durumları**

##### **Böbrek yetmezliği:**

Yukarıda belirtilen dozlar kullanılır.

##### **Karaciğer yetmezliği:**

Yukarıda belirtilen dozlar kullanılır.

- Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.
- İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.
- Doktorunuz MUKOTİK FORT ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz.

*Eğer MUKOTİK FORT'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.*

#### **Kullanmanız gerekenden daha fazla MUKOTİK FORT kullandıysanız :**

*MUKOTİK FORT'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

#### **MUKOTİK FORT'u kullanmayı unutursanız:**

Unuttuğunuz dozu hatırladığınız en kısa zamanda alınız ve sonra önceki gibi devam ediniz.

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.*

#### **MUKOTİK FORT ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:**

MUKOTİK FORT ile tedavi sonlandırıldığında herhangi bir etki oluşmaz.

#### 4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, MUKOTİK FORT'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

**Aşağıdakilerden biri olursa MUKOTİK FORT'u kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz :**

- Alerjik reaksiyon (kızarıklık, yutma ya da nefes alma problemleri, dudaklarda, yüzde, boğazda ve dilde şişme)

“Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir.” Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Diğer yan etkiler:

Seyrek

- Kusmukta kan ya da siyah renkli dışkı

Bilinmiyor

- Yüksek tansiyon
- Bulantı
- Baş ağrısı
- Kusma
- Burun kanaması
- Midede rahatsızlık
- İshal

Bunlar MUKOTİK FORT'un zayıf yan etkileridir.

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

#### 5. MUKOTİK FORT'un saklanması :

*MUKOTİK FORT'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.*

25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

**Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.**

*Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra MUKOTİK FORT'u kullanmayınız / son kullanma tarihinden önce kullanınız.*

**Ruhsat sahibi :** KOÇAK FARMA İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.  
Bağlarbaşı, Gazi Cad., No:64-66  
Üsküdar / İstanbul

**İmal yeri :** KOÇAK FARMA İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.  
Organize Sanayi Bölgesi  
Çerkezköy / Tekirdağ

*Bu kullanma talimatı ...../...../..... tarihinde onaylanmıştır.*