

## KULLANMA TALİMATI

### VERAPOMOR 20 mg/2 mL enjeksiyonluk/infüzyonluk çözelti

#### Steril

#### Deri altına uygulanır.

- **Etkin Madde:** Her ampul, etkin madde olarak 20 mg apomorfin hidroklorür içermektedir. Toplam çözelti hacmi 2 mL'dir.
- **Yardımcı maddeler:** Sodyum metabisüfit (E223), enjeksiyonluk su, hidroklorik asit/ sodyum hidroksit (pH ayarı için)

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

#### **Bu Kullanma Talimatında:**

1. **VERAPOMOR nedir ve ne için kullanılır?**
2. **VERAPOMOR'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **VERAPOMOR nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **VERAPOMOR'un saklanması**

#### **Başlıkları yer almaktadır.**

#### **1. VERAPOMOR nedir ve ne için kullanılır?**

VERAPOMOR Ampul, enjeksiyonluk apomorfin çözeltisi içerir. Deri altı alana enjekte edilir (subkütan). VERAPOMOR içerisindeki etkin madde apomorfin hidroklorürdür. Çözeltinin her mililitresinde 10 mg apomorfin bulunur.

Apomorfin, ismine rağmen morfin içermemektedir.

Apomorfin hidroklorür, dopamin agonistleri olarak bilinen ilaç sınıfına dahildir. VERAPOMOR, Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılır. Apomorfin, Parkinson hastalığı için önceden levodopa ve/veya diğer dopamin agonistleri ile tedavi görmüş hastalarda "off" veya hareketsiz durumda geçen zamanı azaltmaya yardımcı olur. Doktorunuz veya hemşireniz ilacı kullanacağınız zamanı gösteren belirtileri tanımanız konusunda size yardımcı olacaktır.

## **2. VERAPOMOR'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**

### **VERAPOMOR' u ařađıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ**

Eđer;

- 18 yařının altındaysanız,
- Solunum glg yařıyorsanız,
- Bunama veya Alzheimer hastalıđınız varsa,
- Sanrılar grme, yanılsama, dřnce bozuklukları, gereklikle iliřkiyi kaybetme gibi belirtilerle kendini gsteren zihinsel bir bozukluđunuz varsa,
- Karaciđer rahatsızlıđınız varsa,
- Levodopa almanıza rađmen řiddetli diskinezi (istemsiz hareketler) ya da řiddetli distoni (hareket zorluđu) yařıyorsanız,
- Apomorfın veya VERAPOMOR bileřenlerinden herhangi birine alerjikseniz (karřı ařırı duyarlılıđınız varsa) (diđer bileřenler iin yardımcı maddeler listesine bakınız),
- Sizde ya da ailenizde herhangi birinde "uzun QT sendromu" olarak isimlendirilen elektrokardiyografi (EKG) anormalliđi olduđu biliniyorsa.

Doktorunuzu bilgilendiriniz.

### **VERAPOMOR'u ařađıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ**

Eđer;

- Bbrek rahatsızlıđınız varsa,
- Akciđer rahatsızlıđınız varsa,
- Kalp rahatsızlıđınız varsa,
- Ayaktayken bař dnmesi, gsz hissetme veya dřk kan basıncı gsteriyorsanız,
- Yksek kan basıncı tedavisi iin bir bařka ila alıyorsanız,
- Bir hastalıđınız varsa veya kendinizi hasta hissediyorsanız,
- Parkinson hastalıđı sizde sanrılar grme ve bilin bulanıklıđı gibi zihinsel problemlere neden oluyorsa,
- Yařlı veya dayanıksız iseniz.

Siz veya aileniz/bakıcınız, sizde olađan olmayan řekilde drt ve řiddetli istek geliřtiđini fark ederseniz/ederse ve size veya bařkalarına zarar verebilecek aktiviteleri yapmak iin drt ve isteklere karřı koyamazsanız doktorunuza syleyiniz. Bunlar drt kontrol bozukluđu olarak adlandırılır ve kumar bađımlılıđı, ařırı yeme veya harcama, anormal derecede fazla cinsel iliřki isteđi ya da cinsel dřnce ya da cinsel hislerde artıř gibi davranıřları ierebilir. Doktorunuz ilacınızın dozunu ayarlama ya da ilacı kesmeye ihtiya duyabilir.

Bu uyarılar, gemiřteki herhangi bir dnemde dahi olsa sizin iin geerliyse ltfen doktorunuza danıřınız.

## **VERAPOMOR'un yiyecek ve iecek ile kullanılması**

Uygulama yolu aısından yiyecek ve ieceklerle bilinen bir etkileşimi bulunmamaktadır.

## **Hamilelik**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

VERAPOMOR, açıka gerekmedike hamilelik sırasında kullanılmamalıdır. Hamileyseniz, hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız ya da hamile kalmayı planlıyorsanız VERAPOMOR kullanmaya başlamadan önce doktorunuzu veya hemşirenizi bilgilendiriniz.

*Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

## **Emzirme**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

VERAPOMOR Ampul'un anne sütüne geip gemediğİ bilinmemektedir. Emzirecekseniz veya emziriyorsanız doktorunuza danışınız. Doktorunuz bu ilacı alıp almamanız gerektiğini veya emzirmeyi sürdürüp sürdürmemeniz gerektiğini size açıklayacaktır.

Herhangi bir ilacı kullanmadan önce doktorunuz veya eczacınıza danışınız.

## **Ara ve makine kullanımı**

VERAPOMOR, sersemlik ve kuvvetli uyuma isteğine yol aabilir. Eğer sizde VERAPOMOR'un bu etkileri gelişirse, ara ve makine kullanmayınız.

## **VERAPOMOR' un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler**

VERAPOMOR, dilde kızarıklık ve şişme, yüzde ve dudaklarda şişme, göz kapaklarında şişkinlik, soluk almada güçlük, deride döküntü ve kaşıntı gibi belirtilerle kendini gösteren nadiren ciddi alerjik reaksiyonlara neden olabilecek sodyum metabisülfid içerir.

Eğer bu etkilerden biri sizde gelişirse, hemen en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

Bu tıbbi ürün her "doz"unda 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder; yani aslında "sodyum içermez".

## **Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı**

VERAPOMOR'un başka ilaçlarla birlikte kullanımı, bu ilaçların etkisini değıştirebilir. Bu durum özellikle;

- bazı zihinsel hastalıkların tedavisinde kullanılan klozapin,
- kan basıncınızı düşüren ilaçlar,
- Parkinson hastalığının tedavisi için kullanılan diğer ilaçlar için geçerlidir.

Doktorunuz ihtiyaç duyulan durumlarda, apomorfin veya kullandığınız diğer ilaçların dozunu değiştirecektir.

Apomorfinle beraber, Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılan bir diğer ilaç olan levodopa alıyorsanız doktorunuz kanınızı düzenli olarak kontrol edecektir.

Kalp atışlarını etkilediği bilinen ilaçlar kullanıyorsanız, bunlar hakkında doktorunuza bilgi veriniz. Bu ilaçlar arasında kalp ritim problemleri için kullanılanlar (kinidin ve amiodaron gibi), depresyon için kullanılanlar (amitriptilin ve imipramin gibi trisiklik antidepresanlar), bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılan ilaçlar (eritromisin, azitromisin ve klaritromisin gibi 'makrolit' antibiyotikler) ve domperidon yer alır.

*Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

### **3.VERAPOMOR nasıl kullanılır?**

VERAPOMOR'u daima doktorunuzun size söylediği şekilde kullanınız. Eğer emin değilseniz doktor veya eczacınıza danışınız.

Hasta olmanızı veya hasta hissetmenizi engellemek amacıyla, VERAPOMOR kullanımına başlanmadan en az 2 gün önce domperidon alınmalıdır.

#### **• Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:**

Kullanmanız gereken VERAPOMOR miktarı ve her gün gereken enjeksiyon sayısı sizin kişisel ihtiyacınıza göre belirlenecektir. Doktorunuz ne kadar sıklıkla ve ne kadar miktarda ilaç enjekte etmeniz gerektiğini size söyleyecektir. Sizin için en uygun olan miktar doktorunuz tarafından belirlenecektir.

- Genel günlük doz 3 mg ve 30 mg arasındadır.
- Günde 100 mg doza kadar ihtiyaç duyabilirsiniz.
- Tipik olarak, her gün 1 ve 10 enjeksiyon arası ihtiyacınız olacaktır.
- Her bir enjeksiyon 10 mg'dan fazla olmamalıdır.

Eğer hastalığınız ayrı enjeksiyonlarla iyi kontrol edilemiyorsa veya günde 10 enjeksiyondan fazlasına ihtiyaç duyuyorsanız, sizin için apomorfinin sürekli enjeksiyonu (infüzyonu) gerekebilir. Doktorunuz veya hemşireniz buna ihtiyacınızın olup olmadığına karar verecektir.

Sürekli infüzyon için:

- Genel doz saatte 1 mg ve 4 mg arasındadır.
- Bu, genellikle siz ayaktayken verilir ve uyumadan önce kesilir.
- Her 12 saate bir farklı bir infüzyon bölgesi kullanılır.

Sürekli enjeksiyon için gereken hangi mini-pompa ve/veya şırınga sürücüsünün sizin için uygun olacağına doktorunuz karar verecektir. Emin değilseniz doktorunuza, hemşirenize veya eczacınıza danışınız.

• **Uygulama yolu ve metodu:**

VERAPOMOR Ampul, sadece deri altına (subkütan) uygulanır. Damar içine enjekte edilmez. Ampul içindeki çözelti yeşil renge dönmüşse kullanmayınız. Çözelti içinde bulanıklık veya yüzen parçacıklar gözlemlerseniz (partiküller) kullanmayınız. VERAPOMOR, ampulün ağzı açıldıktan hemen sonra kullanılmalıdır.


Enjeksiyon için ihtiyaç duyacaklarınız;

-Bir şırınga ve iğne

-Kullanılmış iğne ve cam ambalajların güvenli bir şekilde imha edilebilmesi için gerekli olan “kesici ve delici aletlere” özel bir atık kutusudur.

Bunlar, doktorunuz veya eczacınızda bulunmaktadır. Alternatif olarak, boş bir kavanoz gibi başka bir kap da kullanılabilir.

Tam halkalı ampuller:



-Ampul boynunun en ince kısmında bulunan **halkayı** bulunuz. Bu halka ampulün kırılma noktasıdır.

-Bir elinizle ampulün altından tutunuz.

-Şekilde gösterildiği gibi halkanın hemen yukarisından ampulün boynunu kavrayınız.

-**Geriye doğru** basınç uygulayınız. Bu, ampulün üst kısmının kırılmasını sağlayacaktır.

-Ampulün üst kısmını dikkatlice "kesici delici atık kutusuna" atınız.

**VERAPOMOR, ampul açıldıktan sonra hemen kullanılmalıdır.**

**VERAPOMOR enjeksiyonu:**

-Şırınganın ucuna iğneyi sıkıca takınız.

-Doktorunuz veya hemşireniz tarafından önerilen hacmi ampul içinden çekiniz.

-Kullanım öncesi VERAPOMOR'u seyreltmeniz gerekebilir, doktorunuz bunun gerekli olup olmadığını ve nasıl yapılacağını size açıklayacaktır.

-İlacı doktorunuz veya hemşirenizin gösterdiği şekilde deri altına (subkütan olarak) enjekte ediniz.

-Kullanılmış şırıngaları, iğneleri ve ampulleri “kesici-delici atık kutusuna” (doktorunuz veya eczacınızda bulunur) ya da boş bir kavanoz gibi uygun bir kutuya atınız.

-Çözeltiliyi, yeşile boyayabileceği için üzerinize ya da halıya sıçratmamaya çalışınız.

• **Değişik yaş grupları:**

**Çocuklarda kullanımı:** VERAPOMOR 18 yaşının altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

**Yaşlılarda kullanımı:** VERAPOMOR yaşlılarda dikkatli ve doktor tarafından önerilen dozlarda kullanılmalıdır.

• **Özel kullanım durumları:**

Böbrek ve karaciğer rahatsızlığınız varsa doktorunuza bildirin. Bu durumlarda VERAPOMOR doktor kontrolünde ve ayarlanmış dozlarda kullanılmalıdır.

Karaciğer yetmezliğinde kullanılmamalıdır.

*Eğer VERAPOMOR'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izlemiş var ise doktorunuza veya eczacınıza ile konuşunuz.*

**Kullanmanız gerekenden daha fazla VERAPOMOR kullandıysanız:**

Fazla miktarda kullandıysanız hemen doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

Fazla miktarda kullanımda, kalp hızında yavaşlama, aşırı hasta hissetme, aşırı uyku hali ve/veya solunum güçlüğü gelişebilir. Düşük kan basıncı sebebiyle kendinizi bitkin hissedebilirsiniz ve özellikle ayağa kalktığınızda başınız dönebilir. Uzanmak ve ayaklarınızı kaldırmak daha iyi hissetmenizi sağlayabilir.

*VERAPOMOR'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

**VERAPOMOR'u kullanmayı unutursanız:**

Bir sonraki alacağınız zamanda gereken miktarda dozu alınız.

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.*

**VERAPOMOR ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:**

Doktorunuzun bilgisi olmadan tedaviyi kesmeyiniz.

Bu ilacın kullanımıyla ilgili başka sorularınız varsa doktorunuza, hemşirenize veya eczacınıza sorunuz.

#### 4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, VERAPOMOR' un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

**Aşağıdakilerden biri olursa, VERAPOMOR'u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:**

- Deride döküntü
- Nefes almada güçlük
- Yüz, dudaklar, boğaz ve dilde şişme

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın	: 10 hastanın en az 1'inde görülebilir.
Yaygın	: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan	: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek	: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.
Çok seyrek	: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor	: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

#### **Çok yaygın:**

- Enjeksiyon bölgesinde şiddetli, rahatsız edici ve kırmızı ve kaşıntılı olabilen deri altı yumruları. Bu yumruların oluşmasını engellemek için her enjeksiyonda enjeksiyon bölgesini değiştirmeniz önerilmektedir.

#### **Yaygın:**

- Özellikle VERAPOMOR ile tedavi başlangıcında kendini hasta hissetme.  
Eğer domperidon aldıysanız ve hala hasta hissediyor iseniz ya da domperidon almadıysanız ve hasta hissediyorsanız mümkün olduğu kadar çabuk doktorunuza ya da hemşirenize söyleyiniz.
- Yorgunluk ve aşırı uyku hissi,
- Bilinç bulanıklığı veya sanrılar görme,
- Esneme,
- Ayağa kalkarken baş dönmesi veya bayılma hissi.

**Yaygın olmayan:**

- İstemsiz hareketlerde artış ve “on” periyodu boyunca titremede artış.
- Hemolitik anemi, kan damarlarındaki veya vücudun herhangi bir yerindeki kırmızı kan hücrelerinin anormal olarak bozulması. Bu, aynı zamanda levodopa alan hastalarda meydana gelebilen yaygın olmayan bir yan etkidir.
- Aniden uyuyakalmak,
- Ciltte döküntü,
- Solunum güçlüğü,
- Enjeksiyon bölgesinde yaralar,
- Soluk almada güçlük, kuvvetsizlik, deri renginin sararmasına sebep olabilen kırmızı kan hücrelerinin azalması,
- Kanama ve morarma riskini artıran kandaki pıhtılaşma hücrelerinde (platelet) azalma.

**Seyrek:**

- Alerjik reaksiyon,
- Kan veya vücut dokularındaki beyaz kan hücrelerinin aşırı miktarda artması (eozinofili).

**Bilinmiyor:**

- Ayaklarda, bacaklarda veya parmaklarda şişme,
- Size ya da başkalarına zarar verebilecek bir aktiviteyi yapma isteği ya da dürtüsüne karşı koymada yetersiz kalma.

Aşağıda belirtilen durumlar buna dahil edilebilir:

- Ciddi şahsi ve ailevi sonuçlarına rağmen aşırı derecede kumar oynamaya yönelik güçlü dürtü.
- Değişen ya da artan cinsel ilgi ve artan cinsel istek gibi sizi ve başkalarını ilgilendiren önemli davranış değişiklikleri.
- Kontrol edilemeyen aşırı alışveriş veya harcama.
- Aşırı yeme (kısa zaman aralıklarında çok miktarda yiyecek yeme) ya da kompulsif yeme (normalden fazla ve açlığınızı gidermek için ihtiyacınız olandan daha fazla yemek).

**Bu davranışlardan herhangi birini yaşamanız halinde doktorunuza söyleyiniz.**

**Doktorunuz bu belirtileri azaltma veya yönetme yollarını size anlatacaktır.**

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

**Yan etkilerin raporlanması**

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri [www.titck.gov.tr](http://www.titck.gov.tr) sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne



bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduđunuz ilacın gvenliliđi hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sađlamıř olacaksınız.

#### **5.VERAPOMOR' un saklanması**

*VERAPOMOR'u ocukların gremeyeceđi, erişemeyeceđi yerlerde ve ambalajında saklayınız.*

25°C'nin altındaki oda sıcaklıđında saklayınız. Iřıktan korumak amacıyla orijinal ambalajı iinde saklayınız.

VERAPOMOR, ampul aıldıktan sonra hemen kullanılmalıdır.

Ampul iindeki zelti berrak ve renksiz olmalıdır.

Tek kullanımlıktır. Kullanılmayan veya arta kalan zelti atılmalıdır.

#### **Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.**

*Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra VERAPOMOR'u kullanmayınız.*

Kullanılmıř řırıngalar, iđneler ve ampuller "kesici ve delici aletler" atık kutusuna veya bařka uygun bir kaba (rn. boř bir kavanoz) atılmalıdır. "Kesici ve delici aletler" atık kutunuz veya kabınız dolduysa, gvenli řekilde imhası iin ltfen doktorunuza veya eczacınıza teslim ediniz.

İlalar atık suya veya evsel atıđa atılmamalıdır. Daha fazla ihtiya duyulmayan ilaların imhası iin eczacınıza danıřınız. Bu nlemler evreyi korumaya yardımcı olacaktır.

Son kullanma tarihi gemiř veya kullanılmayan ilaları pe atmayınız! evre ve řehircilik Bakanlıđınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

#### ***Ruhsat sahibi:***

Haver Farma İla A.ř.  
Akbaba Mah. Marař Cad. No.:52/2/1  
Beykoz / İSTANBUL

#### ***retim yeri:***

Osel İla Sanayi ve Ticaret A.ř.  
Akbaba Mah. Marař Cad. No: 52  
Beykoz / İSTANBUL

*Bu kullanma talimatı 07.07.2021 tarihinde onaylanmıřtır.*