

KULLANMA TALİMATI

BEVESPİ AEROSPHERE® 7.2 mcg/5.0 mcg basınçlı inhalasyon süspansiyonu **Solunum yoluyla uygulanır.**

Etkin madde: Her püskürtme 7,2 mikrogram glikopironyuma eşdeğer 9 mikrogram glikopironyum bromür ve 5 mikrogram formoterol fumarat dihidrat içerir.

Yardımcı maddeler: Hidrofloroalkan (HFA-134a), poröz partiküller (kalsiyum klorür ve 1,2-distearoil-sn-glisero-3-fosfokolin (DSPC) içerir).

▼ Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Meydana gelen herhangi bir yan etkiyi raporlayarak yardımcı olabilirsiniz. Yan etkilerin nasıl raporlanacağını öğrenmek için 4. Bölümün sonuna bakabilirsiniz.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

1. **BEVESPİ AEROSPHERE nedir ve ne için kullanılır?**
2. **BEVESPİ AEROSPHERE'yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **BEVESPİ AEROSPHERE nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **BEVESPİ AEROSPHERE'nin saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. BEVESPİ AEROSPHERE nedir ve ne için kullanılır?

- BEVESPİ AEROSPHERE inhalasyon (solunum) yoluyla kullanılan ve ilacınızı içeren bir inhalerdir. BEVESPİ AEROSPHERE turuncu toz kapaklı beyaz plastik püskürtme kabına yerleştirilmiş, doz göstergesi bulunan basınçlı tüp içinde beyaz inhalasyon süspansiyonu içeren bir inhalerdir. BEVESPİ AEROSPHERE içinde nem çekici bulunan alüminyum folyo poşette bir adet inhaler içeren ambalajlarda kullanıma sunulmuştur. Her bir inhaler kullanıma hazırlandıktan sonra 120 püskürtme içerir.
- BEVESPİ AEROSPHERE etkin madde olarak glikopironyum ve formoterol fumarat dihidrat içerir. Glikopironyum ve formoterol fumarat dihidrat “bronkodilatörler (bronşları genişletici)” adı verilen bir ilaç grubuna dahildir.
- BEVESPİ AEROSPHERE, kronik tıkaçıcı akciğer hastalığı (KOAH) olarak adlandırılan bir akciğer hastalığı nedeniyle solunum güçlükleri yaşayan yetişkin hastalar için solunumu kolaylaştırmak için kullanılır. KOAH, genellikle sigara kullanımının neden olduğu, akciğerlerin solunum yollarında görülen uzun vadeli bir hastalıktır. KOAH'ta, solunum yollarının çevresindeki kaslar daralarak solunumu zorlaştırır.

BEVESPİ AEROSPHERE akciğerlerdeki bu kasların daralmasını engelleyerek havanın akciğerlere girişini ve çıkışını kolaylaştırır.

- BEVESPİ AEROSPHERE, siz nefes alırken etkin maddeleri doğrudan akciğerlerinize iletir. Eğer bu ilacı günde iki kez kullanırsanız, ilaç KOAH'ın günlük yaşamınız üzerindeki etkilerinin azaltılmasına yardımcı olacaktır.

2. BEVESPİ AEROSPHERE'yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

BEVESPİ AEROSPHERE'yi aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

- Glikopironyuma, formoterol fumarat dihidrata veya bu ilacın bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa.

BEVESPİ AEROSPHERE'yi aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

BEVESPİ AEROSPHERE, KOAH'a yönelik bir idame (uzun vadeli) tedavisi olarak kullanılmaktadır. Bu ilacı, ani bir nefes darlığı ya da hırıltı atağını tedavi etmek için kullanmayınız.

Aşağıdaki durumlardan biri sizin için geçerliyse, BEVESPİ AEROSPHERE'yi kullanmaya başlamadan önce doktorunuzla veya eczacınızla görüşünüz:

Eğer:

- Astım hastalığınız varsa (Bu ilaç astım tedavisinde kullanılmamalıdır),
- Kalp problemlerinizi varsa,
- Şeker hastalığınız varsa,
- Kanınızda potasyum düzeyi düşükse,
- Akciğer hastalığınız için BEVESPİ AEROSPHERE'ye benzer (aynı sınıftan) etkin maddeler içeren herhangi bir ilaç kullanıyorsanız ("Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı" bölümüne bakınız),
- Tiroid bezlerinizle ilgili problemlerinizi varsa (tirotoksikoz),
- Dar açılı glokom olarak adlandırılan bir göz probleminizi varsa,
- Prostat probleminizi varsa ya da idrara çıkarken güçlük yaşıyorsanız,
- Ağır derecede böbrek veya karaciğer problemlerinizi varsa dikkatli kullanınız.
- Soluk alma veya yutkunmada güçlük, dilde, dudaklarda ve yüzde şişkinlik gibi alerjik reaksiyon belirtileri yaşıyorsanız BEVESPİ AEROSPHERE kullanmayı durdurunuz.

Diğer sağlık problemlerinizi konusunda her zaman doktorunuzu bilgilendiriniz.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

BEVESPİ AEROSPHERE'nin yiyecek ve içecek ile kullanılması:

BEVESPİ AEROSPHERE solunum yoluyla uygulanır. Bu nedenle yiyecek ve içeceklerle etkileşmesi beklenmemektedir. Bununla birlikte ilacın solunması esnasında yiyecek ve içecek tüketilmesinden kaçınılmalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz, hamile olabileceğini düşünüyorsanız veya hamile kalmayı planlıyorsanız,

BEVESPİ AEROSPHERE'yi kullanmadan önce doktorunuzla veya eczacınızla konuşunuz. Hamileyseniz, doktorunuz aksini söylemedikçe BEVESPİ AEROSPHERE'yi kullanmayınız. *Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziriyorsanız BEVESPİ AEROSPHERE'yi kullanmadan önce doktorunuzla görüşünüz.

Araç ve makine kullanımı

BEVESPİ AEROSPHERE'nin araç ve makine kullanma becerinizi etkilemesi olası değildir. Bununla birlikte bu ilaç sersemlik veya mide bulantısına neden olabilir (bkz. Bölüm 4 "Olası yan etkiler nelerdir?"). Bu ilacı kullanıyorken sersemlik hali ya da mideniz bulanıyormuş gibi hissediyorsanız araç kullanmayınız.

BEVESPİ AEROSPHERE'nin içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

BEVESPİ AEROSPHERE'nin içeriğinde özel uyarı gerektiren herhangi bir yardımcı madde bulunmamaktadır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Başka ilaçlar kullanıyorsanız, yakın zamanda kullandıysanız veya kullanma ihtimaliniz varsa doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz.

Özellikle aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz:

- BEVESPİ AEROSPHERE'ye benzer olabilen tüm ilaçlar (antikolinerjik veya beta-adrenerjik ilaçlar gibi benzer etkin maddeleri içeren ilaçlar); yani, tiotropiyum, ipratropiyum, aklidinyum, umeklidinyum, salmeterol, vilanterol, olodaterol ya da indakaterol gibi benzer etkin maddeler içeren ilaçlar. Emin değilseniz doktorunuza ya da eczacınıza danışınız. BEVESPİ AEROSPHERE'nin bu ilaçlarla birlikte kullanılması önerilmemektedir.
- Kanınızdaki potasyum miktarını düşüren ilaçlar. Bunlara aşağıdakiler dahildir:
 - ağızdan alınan steroid ilaçlar (prednizolon gibi)
 - yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan "idrar söktürücü" olarak da bilinen diüretiklerler (furosemid veya hidroklorotiyazid gibi)
 - solunum rahatsızlıklarını tedavi etmek için kullanılan bazı ilaçlar (teofilin gibi)
- Yüksek tansiyon veya diğer kalp problemlerini (atenolol ya da propranolol gibi) veya göz içi basıncındaki artışı (glokom) tedavi etmek için (timolol) kullanılacak, beta blokör olarak adlandırılan ilaçlar
- Kalbin elektriksel aktivitesinde QT aralığı uzaması olarak bilinen bir değişikliğe yol açabilen ilaçlar (monoamin oksidaz inhibitörleri, trisiklik antidepresanlar gibi)

Eğer yukarıdakilerden herhangi biri sizin için geçerliyse veya emin değilseniz, BEVESPİ AEROSPHERE'yi kullanmadan önce doktorunuz veya eczacınızla görüşünüz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. BEVESPİ AEROSPHERE nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

- Bu ilacı her zaman tam olarak doktorunuzun size söylediği şekilde kullanınız. Eğer emin değilseniz, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
- BEVESPİ AEROSPHERE'yi, o anda KOAH belirtileriniz olmasa dahi, her gün kullanmaya devam etmeniz önemlidir.

Önerilen doz günde iki kez 2 inhalasyondur (sabah iki inhalasyon ve akşam iki inhalasyon).

Uygulama yolu ve metodu:

Kullanım talimatları: Bu Kullanma Talimatı'nın sonundaki "Kullanım ile İlgili Talimatlar"a bakınız. BEVESPİ AEROSPHERE'yi nasıl kullanacağınızdan emin değilseniz, doktorunuz veya eczacınızla iletişime geçiniz.

Hava haznesinin kullanımı

Eğer aynı anda hem nefes alıp hem de inhalelerin düğmesine basmak size zor geliyorsa, doktorunuz veya eczacınızla konuşmalısınız; çünkü inhalelerinize birlikte bir hava haznesi kullanmanız gerekebilir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

BEVESPİ AEROSPHERE 18 yaşın altındaki çocuklarda ve ergenlerde kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlı hastalar için doz ayarlaması yapılması gerekli değildir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

BEVESPİ AEROSPHERE, hafif ila orta derecede böbrek yetmezliği olan hastalarda önerilen dozda kullanılabilir. Ağır derecede böbrek yetmezliği olan veya diyalize ihtiyaç duyan son evre böbrek hastalığı olan hastalarda ancak, beklenen yarar ortaya çıkabilecek muhtemel risklerden daha fazla olduğunda kullanılmalıdır.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliği olan hastalar için doz ayarlaması yapılması gerekli değildir.

Eğer BEVESPİ AEROSPHERE'nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla BEVESPİ AEROSPHERE kullandıysanız:

Bulanık görme, ağız kuruluğu, mide bulantısı, kas spazmı, tremor, baş ağrısı, daha hızlı kalp atışı veya çarpıntı ve tansiyon değerlerinde yükseklik gibi yan etkilerin görülme riski artabilir.

BEVESPİ AEROSPHERE'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

BEVESPİ AEROSPHERE’yi kullanmayı unutursanız:

Bir doz almayı unutursanız, hatırlar hatırlamaz alınız. Bununla birlikte neredeyse bir sonraki doz zamanı gelmişse, unutilan dozu atlayınız. Aynı gün günde iki kez iki inhalasyondan daha fazla ilaç almayınız.

Unutilan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

BEVESPİ AEROSPHERE ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Bu ilaç uzun süreli kullanıma yöneliktir. Bu ilacı, doktorunuzun tavsiye ettiği süre boyunca kullanınız. İlaç, yalnızca kullanmayı sürdürürseniz etkili olacaktır.

Kendinizi iyi hissetseniz dahi, doktorunuz söylemedikçe ilacı kullanmayı sonlandırmayınız; çünkü belirtileriniz kötüleşebilir. Eğer ilacı kullanmayı sonlandırmak istiyorsanız, ilk önce doktorunuzla konuşunuz; çünkü belirtileriniz kötüleşebilir. Eğer bu ilacın kullanımı ile ilgili başka sorularınız varsa, doktorunuzla, eczacınızla veya hemşirenizle konuşunuz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, BEVESPİ AEROSPHERE’nin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir; fakat yan etkiler herkeste görülmez.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın	: 10 hastanın en az 1’inde görülebilir.
Yaygın	: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan	: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek	: 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Çok seyrek	: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor	: Eldeki veriler ile belirlenemeyecek kadar az hastada görülebilir

Aşağıdakilerden biri olursa, BEVESPİ AEROSPHERE’yi kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Özellikle ağız çevresi olmak üzere (dil ve/veya boğaz ve/veya yutkunma gücü) yüzde şişme, solunum gücü ile birlikte deri döküntüsü ya da kurdeşen (anjiyoödem) ve/veya ani bayılma hissi. Bunlar alerjik reaksiyonun belirtileri olabilir.
- Ani göğüs sıkışması, öksürük, hırıltı ya da nefes darlığı. Bunlar, “paradoksal bronkospazm” olarak adlandırılan bir tıbbi durumun belirtileri olabilir.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

BEVESPİ AEROSPHERE’nin diğer olası yan etkileri şunlardır:

Yaygın

- Baş ağrısı
- Ağız kuruluğu
- Bulantı
- Ağrılı ve sık idrara çıkma (idrara yolu enfeksiyonu belirtileri olabilir)
- Kas krampları
- Göğüs ağrısı
- Endişelilik hali

- Sersemlik

Yaygın olmayan

- Yüksek kan şekeri düzeyleri
- Gerginlik
- Huzursuzluk
- Uykusuzluk
- Kalp atımının hızlanması, çarpıntı, kalp atım hızında düzensizlikler
- Aşırı duyarlılık
- Titreme
- İdrara çıkmada zorlanma

Bilinmiyor

- İnhalasyondan hemen sonra göğüs sıkışması ile birlikte, öksürük, hırıltılı solunum veya nefes alamama (bronkospazm)
- Işıkların etrafında ışık halkaları veya kırmızı gözle ilişkili renkli şekiller görmek (glokom)

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. BEVESPI AEROSPHERE’nin saklanması

BEVESPI AEROSPHERE’yi çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Tüpün, folyo poşetin ve kartonun üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra BEVESPI AEROSPHERE’yi kullanmayınız.

Son kullanma tarihi belirtilen ayın son gününü ifade etmektedir.

30°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Poşet ilk açıldıktan sonra 3 ay içinde kullanılmalıdır.

Uyarı: Tüp, basınçlı sıvı içerir. Görünüşte boş olsa dahi, tüpü kırmayınız, delmeyiniz veya yakmayınız. Isı ya da çıplak alev yakınında kullanmayınız ya da saklamayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi:

AstraZeneca İlaç San. ve Tic. Ltd.Şti.
Büyükdere Cad.Yapı Kredi Plaza,
B Blok, Kat: 3-4 Levent/ İstanbul

Üretim yeri: AstraZeneca Dunkerque Production,
Dunkerque/Fransa

Bu kullanma talimatı --/--/---- tarihinde onaylanmıştır.

Kullanım ile İlgili Talimatlar

BEVESPİ AEROSPHERE® 7.2 mcg/5.0 mcg basınçlı inhalasyon süspansiyonu


Bu Kullanım ile İlgili Talimatlar dokümanını BEVESPİ AEROSPHERE kullanmaya başlamadan önce ya da yeni bir inhaler aldığınız zamanlarda okuyunuz. Yeni bilgiler olabilir. Bu bilgiler, tıbbi durumunuz ya da tedavinizle ilgili olarak doktorunuzla yapacağınız konuşmanın yerini almaz.

Önemli Bilgiler:

- **Yalnızca solunum yoluyla kullanıma yöneliktir.**
- BEVESPİ AEROSPHERE'yi tam olarak doktorunuzun size söylediği şekilde kullanınız.
- İnhalerinizin kullanımı ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa, doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

BEVESPİ AEROSPHERE inhalerinizin parçaları (Bkz. Şekil 1):

- BEVESPİ AEROSPHERE, doz göstergesi olan püskürtme kabı içine yerleştirilmiş tüp olarak temin edilir.
 - BEVESPİ AEROSPHERE püskürtme kabını, başka bir inhalerin ilaç tüpüyle **kullanmayınız.**
 - BEVESPİ AEROSPHERE tüpünü, başka bir inhalerin püskürtme kabı ile **kullanmayınız.**



Şekil 1

- BEVESPİ AEROSPHERE'de, tüpün üstünde bir doz göstergesi bulunur (**Bkz. Şekil 1**). Doz göstergesi penceresi, kaç püskürtmelik ilacınız kaldığını gösterir. Doz göstergesinin ortasına her basışınızda ilaç püskürtülür.

BEVESPİ AEROSPHERE’yi ilk defa kullanmadan önce, doz göstergesindeki imlecin, doz göstergesi penceresinde bulunan “120” inhalasyon işaretinin sağını gösterdiğinden emin olunuz (**Bkz. Şekil 1**).

- BEVESPİ AEROSPHERE ile 10 püskürtme yapıldıktan sonra imleç 120’yi gösterecektir. Bu, tüpte 120 püskürtmelik ilaç kaldığı anlamına gelir (**Bkz. Şekil 2a**).
- 10 püskürtme daha yapıldıktan sonra imleç 100 ve 120 arasını gösterecektir. Bu, tüpte 110 püskürtmelik ilaç kaldığı anlamına gelir (**Bkz. Şekil 2b**).
- 10 püskürtme daha yapıldıktan sonra imleç 100’ü gösterecektir. Bu, tüpte 100 püskürtmelik ilaç kaldığı anlamına gelir (**Bkz. Şekil 2c**).



Şekil 2a
120
püskürtme



Şekil 2b
110
püskürtme



Şekil 2c
100
püskürtme

- Doz göstergesi penceresi her 10 püskürtmeden sonra hareket etmeyi sürdürecektir. Doz göstergesi penceresindeki sayı, her 20 püskürtmeden sonra değişmeye devam edecektir.




Şekil 2d

- İnhallerde yalnızca 20 püskürtmelik ilaç kaldığında, gölgeli alanda görüldüğü gibi, doz göstergesi penceresindeki renk kırmızı olacaktır (**Bkz. Şekil 2d**).

BEVESPİ AEROSPHERE inhallerinizin kullanıma hazırlanması:

- BEVESPİ AEROSPHERE, kullanılmadan önce oda sıcaklığında olmalıdır.
- BEVESPİ AEROSPHERE inhalleriniz, nem çekici paket (kurutucu madde) içeren folyo poşet içinde yer alır.
 - BEVESPİ AEROSPHERE inhalleri folyo poşetinden çıkartınız.
 - Poşeti ve kurutucu paketi atınız. Kurutucu paketin içeriğini yemeyiniz ya da içinize çekmeyiniz.




Şekil 3

BEVESPI AEROSPHERE inhalerinizin hazırlık amaçlı olarak çalıştırılması:


BEVESPI AEROSPHERE'yi ilk defa kullanmadan önce, inhale hazırlık amaçlı olarak çalıştırmanız gerekir.

- Kapağı ağızlıktan çıkartınız (Bkz. Şekil 3). Kullanmadan önce ağızlığın içinde herhangi bir nesne olup olmadığını kontrol ediniz.
- İnhaleri yüzünüzden uzakta dik bir şekilde tutunuz ve iyi bir şekilde çalkalayınız (Bkz. Şekil 4).



Şekil 4

- Ağızlıktan ilacın püskürtülmesi için, tüp püskürtme kabı içinde hareket etmeyi durdurana kadar doz göstergesinin merkezine sıkıca bastırınız (Bkz. Şekil 5). Doz göstergesinin sayacı kullanım sırasında aşağı doğru hareket ederken bir klik sesi duyabilirsiniz.




Şekil 5

- **Hazırlama adımlarını 3 kere daha tekrarlayınız (Bkz. Şekil 4 ve Şekil 5).** Hazırlama amaçlı her bir püskürtme öncesinde inhaleyi iyi bir şekilde çalkalayınız.
- 4 kere yapılan hazırlama amaçlı püskürtmeden sonra, doz göstergesi “120”nin sağını göstermelidir ve inhaleleriniz kullanıma hazırdır.


BEVESPI AEROSPHERE inhalelerinizin kullanılması:

Adım 1: Kapağı ağızlıktan çıkartınız (bkz. Şekil 6).




Şekil 6

Adım 2: Her kullanımdan önce inhaleyi çalkalayınız (Bkz. Şekil 7).




Şekil 7

Adım 3: İnhaleri, ağızlığı size bakacak şekilde tutunuz ve ağızınızdan rahat bir şekilde verebileceğiniz kadar nefes veriniz (**Bkz. Şekil 8**).




Şekil 8

Adım 4: Dudaklarınızla ağızlığın çevresini kapatınız ve dilinizi ağızlığın altına koyarak kafanızı geriye doğru yaslayınız (**Bkz. Şekil 9**).




Şekil 9

Adım 5: Derin ve yavaş bir şekilde nefes alırken, tüp püskürtme kabı içinde hareket etmeyi durdurana ve ilaç buharı serbest bırakılana kadar doz göstergesinin ortasındaki düğmeye basınız (**Bkz. Şekil 10**). Daha sonra doz göstergesine basmayı bırakınız.




Şekil 10

Adım 6: Nefes almayı bitirdiğinizde, ağızlığı ağızınızdan çıkartınız ve yaklaşık 10 saniyeye kadar kendinizi rahat hissettiğiniz süre boyunca nefesinizi tutunuz (**Bkz. Şekil 11**).




Şekil 11

Adım 7: Nazikçe nefes veriniz (**Bkz. Şekil 12**). BEVESPI AEROSPHERE ile ikinci kez ilaç püskürtmek için **2 ila 7 arasındaki adımları tekrarlayınız.**



Şekil 12


Adım 8: Kullanımdan sonra ağızlık kapağını deęiřtiriniz (Bkz. Őekil 13).



Őekil 13


BEVESPI AEROSPHERE inhalerinizin temizlenmesi:

İnhaleleri ilk 3 hafta boyunca haftada bir kez temizleyiniz. İnhalelerinizi temiz tutmanız ok nemlidir; bu Őekilde ila birikmeyecek ve ağızlık yoluyla yapılan pskrtmeyi engellemeyecektir (Bkz. Őekil 14).



Őekil 14


Adım 1: Tüpü püskürtme kabından çıkartınız (Bkz. Şekil 15). Tüpü temizlemeyiniz ya da ıslatmayınız.



Şekil 15

Adım 2: Kapağı ağızlıktan çıkartınız.

Adım 3: Püskürtme kabını musluğun altına getiriniz ve yaklaşık 30 saniye boyunca, içinden su geçecek şekilde sıcak suya tutunuz. Püskürtme kabını ters çeviriniz ve yaklaşık 30 saniye boyunca, su ağızlığın içinden geçecek şekilde yıkayınız (Bkz. Şekil 16).




Şekil 16

Adım 4: Sallayarak mümkün olduğunca fazla suyun püskürtme kabından uzaklaşmasını sağlayınız.


Adım 5: Püskürtme kabına ve ağızlığa bakarak herhangi bir ilaç kalmadığından emin olunuz. Herhangi bir birikim varsa, “**BEVESPI AEROSPHERE inhalerinizin temizlenmesi**” bölümündeki 3 ila 5 arasındaki adımları tekrarlayınız.

Adım 6: Püskürtme kabını bir gece boyunca havayla kurumaya bırakınız (Bkz. Şekil 17). Eğer halen ıslaksa, tüpü püskürtme kabına yerleştirmeyiniz.



Şekil 17

Adım 7: Püskürtme kabı kurduğunda, tüpü hafifçe bastırarak püskürtme kabına yerleştiriniz (Bkz. Şekil 18). Tüpe çok sert bir şekilde bastırmayınız. Bu ilacın püskürtülmesine yol açabilir.



Şekil 18

Adım 8: Her temizlikten sonra **BEVESPİ AEROSPHERE** için hazırlık amaçlı çalıştırma adımlarını yeniden uygulayınız. İnhalerin hazırlanması için, inhaleleri iyi bir şekilde çalkalayınız ve yüzünüzden uzağa havaya toplamda iki kez ilaç püskürtmek için doz göstergesinin ortasına 2 defa bastırınız. İnhaleriniz kullanıma hazırdır.

Eğer BEVESPİ AEROSPHERE'yi 7 günden daha uzun süre kullanmazsanız, kullanımdan önce hazırlık amaçlı çalıştırma adımlarını tekrarlamamız gerekecektir.

İnhalerin hazırlanması için, inhaleleri iyi bir şekilde çalkalayınız ve yüzünüzden uzağa havaya toplamda iki kez ilaç püskürtmek için doz göstergesinin ortasına 2 defa bastırınız. İnhaleriniz kullanıma hazırdır.