

## KULLANMA TALİMATI

### PROMESTER 50 mg/ml I.M. enjeksiyonluk çözelti

Kas içine uygulanır.

Steril

- **Etkin madde:** Her bir ml'lik yağlı enjeksiyonluk çözelti 50 mg progesteron (soya sterolleri kaynaklı) içerir.
- **Yardımcı madde(ler):** Benzil alkol ve etil oleat

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

### **Bu Kullanma Talimatında:**

1. **PROMESTER nedir ve ne için kullanılır?**
2. **PROMESTER'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **PROMESTER nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **PROMESTER'in saklanması**

**Başlıkları yer almaktadır.**

### **1. PROMESTER nedir ve ne için kullanılır?**

Her bir flakon etkin madde olarak 50 mg progesteron içerir.

Her kutuda kas içine uygulanan, 5 adet flakon bulunmaktadır.

PROMESTER kadınlarda aşağıdaki durumlarda kullanılır:

- Adet görememe
- Rahimdeki kanama bozuklukları

- Yeterli miktarda progesteronun üretilmediği ve 3 ya da daha fazla açıklanamayan düşüğün olduğu durumlarda hamileliğin erken döneminde devam etmesine yardımcı olmak için
- Bazı durumlarda, örneğin *in vitro* fertilizasyon (IVF) ya da gamet fallop içi transfer (GIFT) infertilite tedavi tekniklerine yardımcı olmak için

## **2. PROMESTER’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**

### **PROMESTER’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ**

Eğer:

- Progesterona veya ilacın içeriğindeki diğer maddelere alerjiniz varsa
- Adet döneminizde olduğunuzdan daha fazla vajinal kanamanız varsa
- Atlamış ya da tamamlanmamış kürtaj durumunuz varsa
- Meme kanseri veya üreme organları ile ilgili kanserinizi varsa ya da daha önceden olduysa
- Damarlarınızda kızarıklık, şişme, ağrı veya diğer ilgili problemlerinizi varsa
- İnme ya da beyin kanaması geçirdiyse
- Karaciğer hastalığınız varsa

### **PROMESTER’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ**

Eğer:

- Kan basıncınız yüksekse, kalp hastalığınız veya böbrek hastalığınız varsa
- Epilepsiniz (sara) varsa
- Geçmişinizde depresyon öyküsü var ise ya da şu anda depresyon yaşıyorsanız
- Şeker hastalığınız varsa
- Porfiriniz (kalıtsal bir kan hastalığı) varsa
- Işığa duyarlılığınız varsa
- Migreniniz var ise
- Karaciğer veya hormonlarınızın kontrolü için düzenli kan testleri yaptırıyorsanız

Emziriyorsanız PROMESTER’i kullanmanız tavsiye edilmez.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

## **PROMESTER'in yiyecek ve iecek ile kullanılması**

Yiyecek ve iecek ile kullanımında herhangi bir kısıtlama olmamakla birlikte, bazı hastalarda bař dnmesi ve uyuklama hali yapabileceğinden gece yatmadan nce alınması tavsiye edilir.

## **Hamilelik**

*İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

PROMESTER hamilelik esnasında sadece muhtemel yararı muhtemel riskinden fazla olduėu durumlarda kullanılmalıdır.

*Tedaviniz sırasında hamile olduėunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

## **Emzirme**

*İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

PROMESTER anne stne geer, bu yzden emziren annelerin kullanması tavsiye edilmez.

## **Ara ve makine kullanımı**

Ara ve makine kullanımı zerine etkisi bilinmemektedir. PROMESTER alındıktan sonra uykulu hissedilirse, ara ve makine kullanılmamalıdır.

## **PROMESTER'in ieriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında nemli bilgiler**

PROMESTER her 1 ml'de 100 mg benzil alkol ierir. Prematre bebekler ve yeni doėanlara uygulanmaması gerekir. Bebeklerde ve 3 yařına kadar olan ocuklarda toksik ve alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

## **Diėer ilalar ile birlikte kullanımı**

Bromokriptin (parkinson tedavisinde, kanda ok fazla prolaktin hormonu bulunmasına neden olan kořulların tedavisinde kullanılır) veya siklosporin (organ nakillerinde ve baėıřıklık sisteminin bazı hastalıklarında baėıřıklık sistemini baskılamak iin kullanılır) kullanıyorsanız bu konuda doktorunuza bilgi veriniz.

*Eėer reeteli ya da reetesiz herhangi bir ilacı řu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise ltfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

### **3. PROMESTER nasıl kullanılır?**

#### **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:**

Yetişkin ve ergenlerde kullanımı:

#### Adet görememe durumlarında:

Birbirini takip eden 6-10 gün süreyle 5-10 mg/gün dozunda veya kas içine tek doz olarak 100-150 mg enjekte edilir.

#### Rahim kanamalarında:

Genel doz, beklenen adet döngüsü başlangıcından 2 gün öncesine kadar 5-10 gün boyunca günde 5-10 mg'dır.

#### Hamileliğin sürdürülmesinde:

Genel doz, yaklaşık 15. günden ya da embriyo ya da gamet transferinin yapıldığı günden başlayarak plasentadan progesteron salgılanmasının gerektiği gebeliğin 8-16 haftasına kadar haftada iki defa (ya da daha sık) 25 -100 mg'dır.

Günlük doz, doktorunuzun görüşüne bağlı olarak 200 mg'a yükseltilebilir. Uygun doza doktorunuz karar verecektir. Emin değilseniz doktorunuza danışınız.

#### **Uygulama yolu ve metodu:**

PROMESTER size doktorunuz ya da hemşireniz tarafından uygulanacaktır. Hangi koşul için tedavi edildiğinize bağlı olarak, doktor uygun dozu kas içine (kalçaya derin enjeksiyon olarak) enjekte ederek verecektir.

#### **Değişik yaş grupları:**

##### **Çocuklarda kullanımı:**

PROMESTER'in çocuklardaki güvenilirlik ve etkililiği incelenmemiştir.

##### **Yaşlılarda kullanımı:**

PROMESTER'in yaşlı hastalardaki güvenilirlik ve etkililiği incelenmemiştir.

#### **Özel kullanım durumları:**

##### **Böbrek yetmezliği:**

PROMESTER sıvı retansiyonuna neden olacağından böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastaların şikâyetleri artabilir, dikkatli kullanınız.

**Karaciğer yetmezliđi:**

Karaciğer fonksiyon testleri ile hasta izlenmelidir. PROMESTER'i ağır karaciğer yetmezliđiniz varsa kullanmayınız.

*Eđer PROMESTER'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduđuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.*

**Kullanmanız gerekenden daha fazla PROMESTER kullandıysanız:**

Aşırı doz durumunda tedavisi gözlem sonucu yapılır ve gerekirse hasta semptomatik ve destekleyici tedavi almalıdır.

*PROMESTER'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

**PROMESTER'i kullanmayı unutursanız**

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.*

**PROMESTER ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler**

Bulunmamaktadır.

**4. Olası yan etkiler nelerdir?**

Tüm ilaçlarda olduđu gibi, PROMESTER'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiđi şekilde tanımlanmıştır:

Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın en az birinde görülebilir.

Seyrek: 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın en az birinde görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

**Aşağıdakilerden biri olursa PROMESTER almayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:**

- Alerjik reaksiyonlar (deri döküntüsü veya ani ağrı, şişlik, nefes darlığı veya ateş)

**Bilinmiyor:**

- Akne (sivilce)
- Ateş
- Bulantı
- Enjeksiyon bölgesinde iritasyon (tahriş)
- Gözdeki herhangi bir şişlik
- Görme sorunları (bulanık görme, kısmı görme, ani kısa süreli ya da tam görme kaybı gibi)
- Migren tipi baş ağrısı
- Ani kanamalar, adet kanama miktarında değişiklikler, atlanmış adet dönemleri, vajinal salgıda değişiklikler
- Memede değişiklikler
- Sıvı tutulması nedeniyle şişlik
- Kilo alma
- Kilo kaybı
- Sarılık (gözde ya da ciltte sarı renk)
- Yüz renginde koyulaşma
- Depresyon
- Uyku bozukluğu (geceleri uyku zorluğu veya gün boyunca uykuya dalmak)
- Bulantı
- Saç dökülmesi
- Vücut ya da yüzde aşırı kıllanma

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

**Yan etkilerin raporlanması**

Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri [www.titck.gov.tr](http://www.titck.gov.tr) sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

## **5. PROMESTER'in saklanması**

*PROMESTER'i çocukların göremeyeceđi, erişemeyeceđi yerlerde ve ambalajında saklayınız.  
25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.*

### **Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.**

*Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra PROMESTER'i kullanmayınız.*

Eđer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz PROMESTER'i kullanmayınız.  
Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik  
Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

### ***Ruhsat sahibi:***

VEM İlaç San. ve Tic. A.Ş  
Maslak Mahallesi AOS 55. Sokak  
42 Maslak A Blok Sit. No: 2/134  
Sarıyer/İSTANBUL

### ***Üretim yeri:***

VEM İlaç San. ve Tic. A.Ş.  
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi  
Karaağaç Mah. Fatih Blv. No:38  
Kapaklı / TEKİRDAĞ

*Bu kullanma talimatı .../.../... tarihinde onaylanmıştır.*