

Fiyat ve Detaylar: <https://www.ilacprospektusu.com/ilac/43/thomapyrin-n-20-tablet>

ATC Kodu: <https://www.ilacprospektusu.com/ara/ilac/atc/N02BA51>

## KULLANMA TALİMATI

### THOMAPYRIN® Tablet

Ağız yoluyla alınır.

- **Etkin madde:** Asetilsalisilik asit, parasetamol ve kafein.  
Her bir THOMAPYRIN® Tablet, 250 mg asetilsalisilik asit, 200 mg parasetamol ve 50 mg kafein içerir.
- **Yardımcı maddeler:** Mısır nişastası, laktoz, stearik asit.

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

### **Bu Kullanma Talimatında:**

1. **THOMAPYRIN® nedir ve ne için kullanılır?**
2. **THOMAPYRIN®'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **THOMAPYRIN® nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **THOMAPYRIN®'in saklanması**

**Başlıkları yer almaktadır.**

#### 1. THOMAPYRIN® nedir ve ne için kullanılır?

- THOMAPYRIN®, tablet formunda üretilmektedir.  
THOMAPYRIN® Tablet, 20 tablet içeren blister ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır.
- THOMAPYRIN® üç etkin maddenin bir kombinasyonudur; asetilsalisilik asit, parasetamol ve kafein.

Asetilsalisilik asit ve parasetamol, ağrı kesici etkilerinin üst üste eklenmesiyle sonuçlanan bütünlüyci bir aktivite gösterirler. Kafeinin bu kombinasyona eklenmesi, asetilsalisilik asit+parasetamolün ağrı kesici etkisini yaklaşık % 40 oranında artırır.

- THOMAPYRIN® 16 yaş üstü ergenler ve yetişkinlerde, hafif ve orta dereceli ağrılar ve ateşli durumlar için kullanılmaktadır.

## 2. THOMAPYRIN®'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

### THOMAPYRIN®'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

Eğer;

- Salisilatlarla, parasetamola, kafeine veya THOMAPYRIN® içindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjik (aşırıduyarlı) iseniz;
- Daha önceden salisilik asit ve türevleri veya başka bir non-steroid antiinflatuar ilaç (NSAİİ) içtikten sonra astım belirtileri, burun polipleri (burun içinde şişlikler/tomurcuklanmalar), yüz, ağız ya da boğazda soluk almanızı zorlaştıran şişmeler (anjioödem) veya kurdeşen geçirdiyseniz,
- Mide ya da onikiparmak bağırsağınızda halen aktif yaralar (ülser) varsa,
- Kanama bozuklukları (örn. hemofili) varsa,
- Hamileliğin son üç aylık dönemi içindeyseniz,
- Suçiçeği ya da grip hastalığı geçirmekte olan bir çocuk ya da ergen iseniz (Reye sendromu riski nedeniyle),
- 16 yaşın altında iseniz,
- Ağır karaciğer hastalığınız varsa,
- Ağır böbrek hastalığınız varsa,
- Kontrol altında olmayan şiddetli kalp yetmezliğiniz varsa,
- Haftada 15 mg ya da üzeri metotresat tedavisi görüyorsanız,
- Doktorunuz sizde galaktozemi, Lapp laktaz yetmezliği ya da glukoz-galaktoz malabsorpsiyonu gibi ender rastlanan kalıtsal galaktoz intoleransı hastalıklarından biri olduğunu söylediye.

### THOMAPYRIN®'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

Eğer;

- Doktorunuz sizde glukoz-6-fosfat-dehidrojenaz eksikliği olduğunu söylediye,
- Astım, alerjik rinit (burun iltihabı) ve nazal polipleriniz (burun içinde şişlikler/tomurcuklanmalar) varsa,
- Süreğen veya tekrarlayan mide veya onikiparmak bağırsağı şikayetleriniz varsa,
- Halen veya daha önce mide-bağırsak yaraları (ülser), kanama ya da delinme varsa,
- Non-steroid anti-enflatuar ilaçlara karşı aşırıduyarlı iseniz,
- Karaciğer fonksiyon bozukluğu varsa (örn. süreğen alkol bağımlılığına, hepatite (karaciğer iltihabı) bağlı),
- Böbrek fonksiyonlarınız bozuk ise,
- Gilbert sendromu adı verilen karaciğer-safra yolları hastalığınız varsa,
- Aşağıdaki ilaçlardan birini kullanıyorsanız:
  - Ağızdan alınan kan sulandırıcılar (oral antikoagülanlar),
  - Kan pulcuklarının aktivitesini engelleyen ajanlar (antitrombositer ilaçlar),
  - Sistemik etkili heparin ve pıhtı çözücüler (trombolitikler),

- SSRI grubu depresyon (ruhsal çöküntü) ilaçları,
- Cerrahi girişim geçirecekseniz.

Doktorunuz başka türlü söylemediği sürece, THOMAPYRIN®'i ağrı için 10 günden fazla veya ateş için 3 günden fazla süreyle kullanmayınız. Eğer, ağrı veya ateş devam eder ya da kötüleşirse, yeni belirtiler ortaya çıkarsa veya kızarıklık ya da şişlik oluşursa doktorunuza başvurunuz, çünkü bunlar ciddi bir rahatsızlığın işaretleri olabilir.

Aşırı doz almaktan korunmak için, parasetamol içeren diğer ilaçlar ile birlikte kullanmaktan kaçınınız. Önerilenden fazla doz alınırca karaciğer harabiyeti oluşabilir.

Uzun süreli kullanımdan sonra, doktorunuz sizden bazı kan ve idrar tetkikleri yaptırmanızı isteyebilir.

Uzun süreyle yüksek dozda ağrı kesici kullanılması, baş ağrılarını tetikleyebilir. Böyle bir durumda, baş ağrısını gidermek için daha yüksek dozlarda ağrı kesici ilaç almayınız ve doktorunuza başvurunuz.

Ağrı kesicilerin uzun süreler boyunca yüksek dozlarda kullanıldıktan sonra aniden bırakılması, yoksunluk belirtilerine yol açabilir (örn. baş ağrısı, yorgunluk, sinirlilik); bu durum tipik olarak birkaç gün içerisinde ortadan kalkar. Ağrı kesicilerin yeniden alınması doktor tavsiyesine bağlı olmalıdır ve yoksunluk belirtileri iyileşmiş olmalıdır.

Şiddetli ani aşırı duyarlılık reaksiyonları ve şok oluşabilir. Kan basıncında ani düşme, yüz ve boğazda şişme, aniden ortaya çıkan döküntü, kızarıklık durumlarında derhal bir doktora başvurunuz.

Asetilsalisilik asit, ürik asidin atılımını azaltabilir ve duyarlı kişilerde gut hastalığının ortaya çıkmasını kolaylaştırabilir.

Asetilsalisilik asit kullanımı, enfeksiyon belirtilerini maskeleyebilir.

THOMAPYRIN®, ergenler ve çocuklardaki ateşli hastalık tablolarında sadece doktor tavsiyesi üzerine ve sadece diğer önlemler etkisiz kaldığında kullanılmalıdır. Bu hastalarda, ender ama yaşamı tehdit edici bir tablo olan Reye sendromu gelişme riski vardır. Reye sendromu mikrobik kökenli (enfeksiyöz) olmayan ensefalopati (beyin hastalığı) ve karaciğer yetmezliğinden oluşur ve tipik olarak ateşli bir hastalığın (suçiçeği, grip benzeri hastalık) esas belirtileri geçtikten sonra ortaya çıkar. Belli başlı özellikleri uzun süreli ve aşırı kusma, baş ağrısı ve bilinç bozukluğudur.

Bütün non-steroid anti-enflamatuar ilaçlar ile mide-bağırsak kanalında ölümcül olabilen kanama, yaralar (ülserler) ve delinme görülmüştür. Bu nedenle, özellikle de yaşlı iseniz, olağan dışı herhangi bir karın ağrısı, ağızdan kan gelmesi ya da dışkı renginde kararırma hissederseniz, hemen doktora başvurunuz.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

### **THOMAPYRIN®'in yiyecek ve içecek ile kullanılması:**

THOMAPYRIN® bir bardak su ile alınmalıdır.

## **Hamilelik**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

Hamileliğin ilk altı ayında, açık bir şekilde gerekli olmadığı sürece THOMAPYRIN® kullanmayınız. Hamile kalmaya çalışıyorsanız veya hamileliğin ilk altı ayı içindeyseniz, THOMAPYRIN® kullanmanız gerektiğinde, dozu olabildiğince düşük tutunuz ve tedaviyi olabildiğince kısa sürede sonlandırınız.

Hamileliğin son üç ayında non-steroid antiinflamatuvarlar grubundaki bütün ilaçlar, anne karnındaki bebekte kalp-akciğer ve böbrek bozukluklarına sebep olabilmektedir. Doğum zamanında ise anne ve yenidoğanda aşırı kanamalar ve doğum eyleminde gecikme ya da uzamayla sonuçlanabilmektedir.

Uzun süreyle yüksek miktarlarda kafein alınması, hamile kadınlarda kendiliğinden düşük ya da erken doğuma öncülük edebilir.

Hamileliğin son üç ayında THOMAPYRIN® kullanmayınız.

*Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

## **Emzirme**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

Parasetamol ve asetilsalisilik asit anne sütüne geçerler. Kafein de anne sütüne geçer ve bebeğin durumunu ya da davranışlarını etkileyebilir.

THOMAPYRIN®'in uzun süreli kullanılması ya da yüksek dozlarda alınması durumunda emzirmeye son verilmelidir.

## **Araç ve makine kullanımı**

THOMAPYRIN®'in araç ve makine kullanma becerileri üzerindeki etkilerine yönelik çalışma yürütülmemiştir.

Ancak tedavi sırasında uyukulu hal, görme bozuklukları ve baş dönmesi gibi istenmeyen etkiler ortaya çıkabilir. Eğer sizde bu türlü belirtiler ortaya çıkmış ise araç kullanma ve makine işletme gibi tehlikeli olabilecek işlerden uzak durunuz.

## **THOMAPYRIN®'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler**

THOMAPYRIN® laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı tahammülsüzlüğünüz (intolerans) olduğu söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

## **Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı**

Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birisini kullanıyorsanız, THOMAPYRIN® almadan önce mutlaka doktorunuza haber veriniz.

### Asetilsalisilik asit:

Asetilsalisilik asit ařađıdaki ilaların etkisini ve zehirleyici etki (toksikite) riskini artırabilir.

- Non-steroid antiinflamatuvar ilalar (NSAİİ), kortikosteroidler ya da alkol: Mide-bađırsak kanalıyla ilgili yan etki riskinde artıř (örn. kanama),
- Digoksin, lityum,
- Pıhtı önleyiciler (antitrombositler ilalar, antikoagülanlar), pıhtı özücüler (trombolitikler), SSRI'lar: Kanama riskinde artıř,
- Kan řekerini dıřürücü ilalar, valproik asit, metotreksat.

Asetilsalisilik asit idrar söktürücü (diüretik) ve yüksek kan basıncını dıřürücü (antihipertansif) ilaların etkisini azaltabilir.

THOMAPYRIN® aynı zamanda, spironolaktonun idrarla sodyum attırıcı etkisini azaltabilir ve idrarla üre attırıcı<sup>1</sup> ilaların etkisini (örn., probenesid, sülfınpirazon) engelleyebilir.

### Parasetamol:

- Probenesid, salisilamid: Parasetamolün vücuttan atılmasında gecikme, zehirli etki (toksikite) artıřı,
- Kolestiramin bađırsaklardan parasetamol emilimini azaltır.

Eđer kan sulandırıcı ila alıyorsanız, uzun süreli parasetamol kullanımı yalnızca doktor gözetimi altında yapılmalıdır.

Diđer türlü zararsız olan parasetamol dozları, bazı uyku ilaları (hipnotikler) ve sara ilaları (anti-epileptikler, örn. glutetimid, fenobarbital, fenitoin, karbamazepin) ve rifampisin gibi ilalarla birlikte alındıđı takdirde, karaciđer harabiyetine yol aabilir. Aynı durum, karaciđere zararlı olabilecek maddeler ve aşırı alkol alımı için de geçerlidir.

Mide boşalmasını yavařlatan ilalarla birlikte kullanıldıđında, parasetamolün emilim hızı azalabilir ve sonuç olarak etkisinin başlaması gecikebilir. Mide boşalmasının hızlandırılması (örn. metoklopramid uygulamasından sonra) emilim hızının artmasına ve etki bařlangıcının hızlanmasına yol aar.

Kloramfenikol ile kombinasyon, kloramfenikolün vücuttan atılmasını uzatabilir, ve bu durum zehirleyici etki (toksikite) riskinde artıř ile birlikte dir.

Parasetamol ve AZT'nin (zidovudin) eř-zamanlı olarak kullanılması akyuvar sayısında azalma (nötropeni) yönündeki eğilimi artırır. Bu nedenle THOMAPYRIN® ile birlikte AZT, doktor tavsiyesi olmaksızın alınmamalıdır.

Parasetamol alınması, laboratuarda ürik asit ve kan řekeri tayinini etkileyebilir. Bu nedenle doktorunuz bu tetkikleri istediđinde, doktorunuza parasetamol almakta olduđunuzu söyleyiniz.

### Kafein:

Kafein çeşitli ilaçların (örn., barbitüratlar, antihistaminikler) sakinleştirici (sedatif) etkisini ortadan kaldırabilir. Ayrıca, diğer ilaçların neden olduğu kalp atışlarını hızlandırıcı etkiyi artırabilir (örn., sempatomimetikler, tiroksin). Doğum kontrol hapları, simetidin, fluvoksamin ve disülfiram karaciğerde kafein metabolizmasını azaltırken, barbitüratlar ve sigara artırır.

Kafein, teofilin atılımını azaltır. Birlikte kullanılan ağrı kesicilerin bağımlılık yapabilme potansiyelini artırmaz.

Kinolon grubu antibiyotikler, kafeinin vücuttan atılımını geciktirebilir.

*Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

### **3. THOMAPYRIN® nasıl kullanılır?**

#### **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:**

THOMAPYRIN®'i her zaman için tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde alınız. Eğer emin değilseniz, doktorunuza ya da eczacınıza sormalısınız.

Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde:

#### 16 yaş üstü ergenler ve yetişkinler:

Günde 1-2 tableten 6 tablete kadar. En yüksek günlük doz 1500 mg asetilsalisilik asit, 1200 mg parasetamol ve 300 mg kafeindir.

Dozlar arasında en az 4 saat geçmelidir.

#### **Uygulama yolu ve metodu:**

THOMAPYRIN® bir bardak su ile alınmalıdır.

#### **Değişik yaş grupları:**

**Çocuklarda kullanımı:** THOMAPYRIN® 16 yaşın altındaki çocuklar ve ergenlerde kullanılmamalıdır.

**Yaşlılarda kullanımı:** THOMAPYRIN®'in yaşlı kişilerde kullanımıyla ilgili özel bir veri bulunmamaktadır.

#### **Özel kullanım durumları:**

**Böbrek ve karaciğer yetmezliği:** THOMAPYRIN® ağır böbrek veya ağır karaciğer hastalarında kullanılmamalıdır.

*Eğer THOMAPYRIN®'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.*

## **Kullanmanız gerekenden daha fazla THOMAPYRIN® kullandıysanız**

*THOMAPYRIN®'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

Aşırı dozda parasetamol alınması durumunda zehirlenme olasılığı vardır. Karaciğer harabiyeti gelişebilir. Solgunluk, iştahsızlık, karın ağrısı, bulantı ve kusma parasetamol aşırı dozajının sık görülen erken belirtileridir. Karaciğer zehirlenmesinden korunmak için derhal tedavi uygulanması gerekir.

Asetilsalisilik asit zehirlenmesinin belirtileri şunlardır; hızlı ve derin nefes alıp verme, baş dönmesi, bulantı, kusma, görme ve işitme bozuklukları, baş dönmesi ve zihin karmaşası. Ağır zehirlenme durumlarında ise, bilinç bozukluğu, saldırganlık, titremeler, kasılma nöbetleri, solunum zorluğu, terleme, kanamalar, vücudun susuz kalması, vücut ısısında yükselme ve koma görülebilir.

Ani (akut) kafein zehirlenmesinin erken belirtileri, genellikle titremeler ve huzursuzluktur. Bunları bulantı, kusma, nabızda hızlanma ve zihin karmaşası izler. Ağır zehirlenme durumlarında, bilinç bozukluğu, saldırganlık, kasılma nöbetleri, kalpte ritim bozuklukları ortaya çıkabilir.

## **THOMAPYRIN® kullanmayı unutursanız**

Eğer ilacınızı almayı unutursanız, bu dozu hatırlar hatırlamaz alınız. Ancak eğer bir sonraki dozun zamanı gelmiş veya yaklaşmış ise, unutilan dozu atlayınız ve ilacınızı normalde olduğu gibi almaya devam ediniz. Aynı anda iki doz almayınız.

*Unutilan dozları dengelemek için çift doz almayınız.*

## **THOMAPYRIN® tedavisi ne zaman durdurulacak?**

THOMAPYRIN®, doktor tavsiyesi olmaksızın, ağrılı durumlarda 10 günden uzun süreyle, ateşli durumlarda ise 3 günden uzun süreyle kullanılmamalıdır.

## **THOMAPYRIN® ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler**

THOMAPYRIN® tedavisi sonlandırıldığında herhangi özel bir etki görülmez.

Bu ilacın kullanımıyla ilgili başka sorularınız olursa, doktorunuza sorunuz.

## **4. Olası yan etkiler nelerdir?**

Tüm ilaçlar gibi, THOMAPYRIN®'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Ancak bunlar ilacı kullanan her insanda ortaya çıkmaz.

Belirtilen yan etkiler şu sıklık derecelerine göre sınıflanmıştır:

Çok yaygın: 10 kişide 1'den fazla

Yaygın: 10 kişide 1'den az, 100 kişide 1'den fazla

Yaygın olmayan: 100 kişide 1'den az, 1,000 kişide 1'den fazla

Seyrek: 1,000 kişide 1'den az, 10,000 kişide 1'den fazla

Çok seyrek: 10,000 kişide 1'den az (bildirilen tekil vakalar dahil)

Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Sabit dozlarda parasetamol, asetilsalisilik asit ve kafein kombinasyonu ile yürütülen klinik çalışmalarda tedavi edilen hastalarda, aşağıdaki yan etkiler bildirilmiştir:

**Psikiyatrik hastalıklar**

Yaygın: Sinirlilik  
Seyrek: Aşırı heyecan ve hareketlilik

**Sinir sistemi hastalıkları**

Yaygın: Baş dönmesi  
Seyrek: Titreme

**Kulak ve iç kulak hastalıkları**

Seyrek: İçkulak kaynaklı baş dönmesi

**Kalp hastalıkları**

Yaygın olmayan: Çarpıntı  
Seyrek: Kalp ritminde hızlanma

**Mide-bağırsak sistemi hastalıkları**

Yaygın: Karın ağrısı, hazımsızlık, bulantı  
Yaygın olmayan: Kusma  
Seyrek: İshal, yemek borusu iltihabı (özofajit)

**Deri ve derialtı dokusu hastalıkları**

Seyrek: Aşırı terleme

**Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar**

Seyrek: Bitkinlik

THOMAPYRIN® içinde bulunan etken maddelerin her biri için, yukarıda söz edilmeyen ek istenmeyen olaylar aşağıda verilmektedir:

**Asetilsalisilik asit**

Asetilsalisilik asit için verilen yan etki listesi, romatizmal hastalıklar nedeniyle uzun dönemli ve yüksek doz ile tedavi edilen hastalardaki gözlemleri de kapsamaktadır.

**Kan ve lenf sistemi hastalıkları**

Bilinmiyor: Ağır kanama, örn. beyin kanaması (özellikle kontrol altında olmayan yüksek tansiyonlu hastalarda ve/veya birlikte kan sulandırıcı tedavi görmekte olan hastalarda görülür ve bazen yaşamı tehdit edici olabilir); kanama, örn. burun kanaması, diş eti kanaması

**Bağışıklık sistemi hastalıkları**

Seyrek: Aşırı duyarlılık (ani alerjik şok, yüz ve boğazda şişme, bronşlarda spazm, kan basıncında düşme, nefes darlığı ve deri reaksiyonları dahil)

**İç salgı bezi hastalıkları**

Çok seyrek: Kan şekerinde düşme



**Sinir sistemi hastalıkları**

Bilinmiyor: Zihinsel karmaşa, uykululuk hali, baş ağrısı

**Göz hastalıkları**

Bilinmiyor: Görme bozuklukları

**Kulak ve içkulak hastalıkları**

Bilinmiyor: İşitmede bozukluk, kulak çınlaması

**Mide-bağırsak sistemi hastalıkları**

Seyrek: Mide bağırsak kanaması (uzun süreli kullanımda demir eksikliği kansızlığıyla sonuçlanabilir), mide-bağırsak ülserleri

Çok seyrek: Mide-bağırsak delinmesi

Bilinmiyor: Mide iltihabı (gastrit), karnın üst bölümünde huzursuzluk hissi

**Karaciğer-safra hastalıkları**

Çok seyrek: Karaciğer fonksiyonlarında anormallik, transaminazlarda artış (karaciğerde üretilen bir madde)

**Deri ve derialtı dokusu hastalıkları**

Seyrek: Şiddetli deri reaksiyonları (eritema multiforme adındaki ağır deri hastalığı dahil)

**Böbrek ve idrar hastalıkları**

Çok seyrek: Böbrek yetersizliği

**Parasetamol****Kan ve lenf sistemi hastalıkları**

Çok seyrek: Çeşitli kan hücrelerinde azalmalar; nedeni belli olmayan ateş, vücut direncinde düşme, vücutta nedensiz bereler, çürükler bu durumun belirtileri olabilir

**Bağışıklık sistemi hastalıkları**

Çok seyrek: Aşırı duyarlılık (ani alerjik şok, yüz ve boğazda şişme, nefes darlığı, deride kızarıklık, kurdeşen, bulantı ve aşırı terleme dahil)

**Solunum ve göğüs hastalıkları**

Çok seyrek: NSAİİ'lere alerjik olan kişilerde bronş spazmı

**Karaciğer-safra hastalıkları**

Seyrek: Transaminazlarda artış (karaciğerde üretilen bir madde)

**Deri ve derialtı dokusu hastalıkları**

Bilinmiyor: İlaç döküntüsü

**Kafein****Sinir sistemi hastalıkları**

Bilinmiyor: Uykusuzluk, huzursuzluk

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuzu ya da eczacınızı bilgilendiriniz.*

#### **5. THOMAPYRIN®'in saklanması**

*THOMAPYRIN®'i çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.*

*25 °C'nin altındaki oda sıcaklığında, serin ve kuru bir yerde, ışıktan koruyarak saklayınız.*

**Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.**

*Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra THOMAPYRIN®'i kullanmayınız.*

*Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz THOMAPYRIN®'i kullanmayınız.*

#### ***Ruhsat sahibi:***

Boehringer Ingelheim İlaç Ticaret A.Ş.  
Büyükdere Cad. USO Center  
No: 245, K: 13-14  
34398 Maslak - İSTANBUL

Tel: (0 212) 329 1100 Faks: (0 212) 329 1101

#### ***Üretici:***

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG  
Ingelheim am Rhein, Almanya

*Bu kullanma talimatı*

*tarihinde onaylanmıştır.*