

## KULLANMA TALİMATI

### SAFLUTAN 15 mikrogram/ml tek dozluk göz damlası

#### Göze uygulanır.

- **Etkin madde:** Her ml'si 15 mikrogram tafluprost içerir. Tek dozluk damlalık (0.3 ml) 4.5 mikrogram tafluprost içerir.
- **Yardımcı maddeler:** Gliserol, sodyum dihidrojen fosfat dihidrat, disodyum edetat, polisorbata 80, hidroklorik asit ve/veya sodyum hidroksit ve enjeksiyonluk su.

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

#### **Bu Kullanma Talimatında :**

1. **SAFLUTAN nedir ve ne için kullanılır?**
2. **SAFLUTAN'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **SAFLUTAN nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **SAFLUTAN'ın saklanması**

#### **Başlıkları yer almaktadır.**

#### **1. SAFLUTAN nedir ve ne için kullanılır?**

SAFLUTAN göz damlası prostaglandin analogları olarak bilinen bir ilaç sınıfına üye olan tafluprost adlı bir madde içerir. SAFLUTAN göz basıncını düşürmek için kullanılır. Göz basıncı çok yüksek olduğunda kullanılır. SAFLUTAN açık açılı glokom adı verilen bir glokom tipini ve aynı zamanda göz hipertansiyonu olarak bilinen bir bozukluğu tedavi etmek için kullanılır. Her iki bozukluk göz içi basıncınızda artışla ilişkilidir ve sonunda görme fonksiyonunuzu etkileyebilirler.

SAFLUTAN, tek dozluk (0.3 ml) plastik ambalajlarda bulunan, berrak, renksiz bir çözeltilidir. Bir folyoda 10 tek dozluk damlalık bulunur. SAFLUTAN 30 veya 90 adet tek dozluk damlalık içeren ambalajlarda sunulur. Tüm ambalaj büyüklükleri pazara sunulmayabilir.

#### **2. SAFLUTAN'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**

#### **SAFLUTAN'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ**

- Tafluprosta veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık (alerjiniz) var ise kullanmayınız.

## **SAFLUTAN'ı ařađıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ,**

SAFLUTAN'ın ařađıdaki etkilere yol aabildiđini ve bunlardan bazılarının kalıcı olabileceđini **lftfen unutmayınız:**

- SAFLUTAN kirpiklerinizin uzamasına, kalınlařmasına, renginin deđiřmesine ve/veya sayısının artmasına neden olabilir ve gz kapaklarınızda sıradıřı tylenmeye yol aabilir.
- SAFLUTAN gzlerinizin etrafındaki derinin rengine koyulařmaya neden olabilir. zlentinin fazlasını derinizden silerek uzaklařtırınız. Bylelikle deride kararma riskini azaltabilirsiniz.
- SAFLUTAN iris (gznz renkli kısmı) renginizi deđiřtirebilir. Eđer SAFLUTAN sadece bir gze uygulanırsa, tedavi edilen gzn rengi diđer gzden kalıcı olarak farklı hale gelebilir.
- Bbrek sorunlarınız var ise,
- Karaciđer sorunlarınız var ise,
- Astımınız var ise,
- Bařka gz hastalıkları

Bu uyarılar gemiřteki herhangi bir dnemde dahi olsa sizin iin geerli ise lftfen doktorunuza danıřın.

## **SAFLUTAN'ın yiyecek ve iecek ile kullanılması**

Kullanım yolu (okler) nedeniyle yiyecek ve ieceklerle etkileřimi yoktur.

## **Hamilelik**

*İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

Gebe kalma olasılıđınız varsa, SAFLUTAN tedavisi sırasında etkili bir dođum kontrol yntemi kullanmanız gerekir. Gebe iseniz SAFLUTAN'ı kullanmayınız.

*Tedaviniz sırasında hamile olduđunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

## **Emzirme**

*İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

Emziriyorsanız SAFLUTAN kullanmayınız.

## **Ara ve makine kullanımı**

SAFLUTAN ara ve makine kullanma becerisi zerinde hibir etki gstermez. SAFLUTAN'ı gznze damlattıktan hemen sonra bir sre iin etrafı bulanık grdđnz fark edebilirsiniz. Grmeniz netleřinceye kadar herhangi bir ara veya makine kullanmayınız.

## **SAFLUTAN'ın ieriđinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında nemli bilgiler**

SAFLUTAN'ın ieriđinde bulunan yardımcı maddelerden hibiri iin uygulama yolu veya dozu nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

## **Diđer ilalar ile birlikte kullanımı**

Bařka gz damlaları kullanıyorsanız, SAFLUTAN ve diđer gz damlaları, aralarında en az 5 dakikalık bir sre olacak řekilde uygulayınız.

*Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

### **3. SAFLUTAN nasıl kullanılır?**

SAFLUTAN'ı her zaman doktorunuzun söylediği şekilde kullanınız. Emin değilseniz doktorunuz veya eczacınız ile kontrol ediniz.

#### **Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:**

Önerilen doz etkilenen göze/gözlere günde bir kez, akşamları 1 damla SAFLUTAN'dır. Doktorunuzun size söylediği miktarda damladan daha fazlasını gözünüze damlatmayınız veya ilacı söylenenden daha sık kullanmayınız. Bu tip uygulama SAFLUTAN'ın daha az etkili olmasına yol açabilir.

SAFLUTAN'ı her iki gözünüze sadece doktorunuz size böyle yapmanızı söylediye damlatınız.

Sadece göz damlası olarak kullanım içindir. İlacı ağızdan almayınız.

#### **Uygulama yolu ve metodu:**

Göze uygulanır.

Yeni bir folyoyu açmadan önce:


Folyo zarar görmüşse tek dozluk damlalıkları kullanmayınız. Folyoyu kesikli çizgi hizasından açınız. Folyoyu açtığınız tarihi folyonun üzerinde tarih yazmak için boş bırakılan yere yazınız.

#### **SAFLUTAN'ı her kullandığınızda:**

1. Ellerinizi yıkayınız.
2. Folyodan damlalık demetini çıkarınız.
3. Demetten bir tane tek dozluk damlalığı ayırınız.
4. Geri kalan demeti tekrar folyoya koyunuz ve folyoyu kapatmak için kenarından katlayınız.
5. Solüsyonun tek dozluk damlalığının alt kısmında bulunduğundan emin olunuz.



6. Damlalığı açmak için uç kısmı bükerek koparınız.




7. Başınızı arkaya eğiniz.
8. Damlalığın ucunu gözünüze yaklaştırınız.



9. Alt göz kapağınızı aşağı çekip yukarı bakınız.
10. Damlalığı hafifçe sıkıp bir damlanın alt göz kapağınız ile gözünüz arasına düşmesini sağlayınız.



11. Bir an için gözünüzü kapatınız ve gözünüzün iç tarafına parmağınızla yaklaşık bir dakika bastırınız. Bu, göz damlasının göz yaşı kanalından dışarı akmasını önleyecektir.
12. Gözünüzün etrafındaki fazla çözeltiyi silerek uzaklaştırınız.



**Damlayı gözünüze isabet ettiremezseniz, tekrar deneyiniz.**

**Doktorunuz size ilacı her iki gözünüze damlatmanızı söylediye, 7'den 12'ye kadarki basamakları diğere gözünüzde tekrarlayınız.**

Tek dozluk damlalıkdaki ilaç miktarı her iki gözünüz için yeterlidir. Açılmış damlalığın içinde kalan artık çözeltiyi kullanımdan hemen sonra atınız.

**Gözünüze başka ilaçlar uyguluyorsanız, SAFLUTAN ile diğere ilacı uygulama zamanları arasında en az 5 dakika olmasına dikkat ediniz.**

#### **Değişik yaş grupları:**

##### **Çocuklarda kullanımı:**

Güvenlilik ve etkililik verileri bulunmadığından, 18 yaşından küçük çocuklarda ve adolesanlarda SAFLUTAN kullanımı önerilmez.

##### **Yaşlılarda kullanımı:**

Yaşlı hastalarda doz ayarlaması gerekmez.

##### **Özel kullanım durumları:**

##### **Böbrek/Karaciğer yetmezliği:**

Geçmişte veya mevcut durumda böbrek ve karaciğer problemlerinizi varsa doktorunuza bildiriniz.

*Eğer SAFLUTAN'ın etkisinin çok güçlü veya çok zayıf olduğuna dair izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.*

**Kullanmanız gerekenden daha fazla SAFLUTAN kullandıysanız:**

SAFLUTAN'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Size herhangi bir zarar vermeyecektir. Sonraki dozu almanız gereken normal zamanda damlatınız.

İlaç yanlılıkla yutulursa, lütfen tavsiye için bir hekime başvurunuz.

**SAFLUTAN'ı kullanmayı unutursanız:**

Bir dozu atlarsanız mümkün olan en kısa sürede damlatınız ve düzenli dozaj takviminize geri dönün.

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz damlatmayınız.*

**SAFLUTAN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler**

Doktorunuza danışmadan SAFLUTAN kullanmayı bırakmayınız. SAFLUTAN'ı kullanmayı bıraktıysanız, göz basıncınız tekrar yükselecektir. Bu, gözünüzde kalıcı hasara yol açabilir. Eğer ilaç ile ilgili ilave sorularınız olursa doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

**4. Olası yan etkiler nelerdir?**

Tüm ilaçlar gibi SAFLUTAN'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Çok yaygın:	10 hastanın en az 1'inde görülebilir.
Yaygın:	10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinde veya birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan:	100 hastanın birinden az, fakat 1,000 hastanın birinde veya birinden fazla görülebilir.
Seyrek:	1,000 hastanın birinden az fakat 10,000 hastanın birinde veya birinden fazla görülebilir.
Çok seyrek :	10,000 hastanın birinden az görülebilir.

**Sinir sistemi bozuklukları:**

Yaygın:  
Baş ağrısı.

**Göz bozuklukları:**

Çok yaygın:  
Göz kızarıklığı.

Yaygın:

Gözde kaşıntı, göz tahrişi, göz ağrısı, göz kuruluğu, ışığa karşı hassasiyet, bulanık görme, kirpik uzunluğunda, kalınlığında ve sayısında değişiklikler, kirpiklerde renk değişikliği, gözde yabancı madde hissi, gözlerde sulanma, gözde akıntı, göz kapaklarında şişlik, göz kapaklarında kızarıklık, gözlerin etrafındaki derinin renginde değişiklik, iris renginde değişiklik (kalıcı olabilir), gözün detayları görme becerisinde azalma.

Yaygın olmayan:

Gözlerde yorgunluk, gözde rahatsızlık hissi, gözde anormal his, göz yüzeyindeki zarlarda şişme, göz kapaklarında iltihaplanma, göz yüzeyindeki zarlarda foliküller, göz yüzeyinde

alerjik enflamasyon veya küçük, leke tarzında iltihaplanma bölgeleri, göz içinde iltihaplanma belirtileri, göz yüzeyindeki zarlarda pigmentasyon.

**Deri ve deri altı doku hastalıkları:**

Yaygın olmayan: Göz kapaklarında sıradışı tüylenme.

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

**5. SAFLUTAN'ın saklanması**

*SAFLUTAN'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.*

Açılmamış folyo ambalajları 2°C – 8°C arasındaki sıcaklıklarda (buzdolabında) saklayınız.

Açılmış bir folyonun içerisindeki kullanılmamış damlalıkların folyo ilk kez açıldıktan 28 gün sonra atılması gerektiğinden, göz damlalarını kullanmaya başlayıncaya kadar folyoyu açmayınız.

Renk değişikliği olması veya içinde yabancı maddeler bulunması durumunda ürünü kullanmayınız.

Folyo ambalaj açtıktan sonra:

- Tek dozluk damlalıkları orijinal folyo ambalajda saklayınız.
- 25 °C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
- Kullanılmamış tek dozluk damlalıkları folyoyu ilk açtığınız tarihten 28 gün sonra atınız.
- Açılan tek dozluk damlalığı kullandıktan hemen sonra içinde kalmış çözeltiyle birlikte atınız.

**Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.**

*Ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra SAFLUTAN'ı kullanmayınız.*

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz SAFLUTAN'ı kullanmayınız.

**Ruhsat Sahibi:** Merck Sharp Dohme İlaçları Ltd. Şti.  
Esentepe - İSTANBUL

**Üretim Yeri:** Laboratoire Unither Coutances,  
Cedex-Fransa

*Bu kullanma talimatı en son 05/10/2012 tarihinde onaylanmıştır.*